

第四十六册

婦人崩漏門 婦人帶下門

婦人諸乳疾門 婦人前陰諸疾門

婦人夢與鬼交門 婦人交腸門

通俗圖書刊行社刊行

會文堂新記書局發行

圖書集成醫部全錄

欽定古今圖書集成醫部全錄第四十六冊目錄

卷三百九十五彙考三百九十五

婦人崩漏門一

黃帝素問

○陰陽別論一 一 ○六元正紀大論一

張機金匱要略

○漏下一一

王叔和脈經

○崩漏脈法一二

陳自明婦人良方

○暴崩下血一二

嚴用和濟生方

○總論證治一三



6513134



201100

萬全婦人祕科……………一〇

○崩漏論一〇 ○治有三法一〇

張介賓景岳全書……………一一

○論證一二 ○論治一二

陳士鐸石室祕錄……………一三

○血崩治法一三

方一……………一三

○小牛角鯁散一三 ○雲母芎藭散一四 ○禹餘糧圓一四 ○慎火草散一四 ○增損

禹餘糧圓一五 ○又方一五 ○又方一五 ○九方一五 ○九方一五 ○當歸湯一六

○又方一六 ○又方一六 ○伏龍肝散一六 ○大牛角中仁散一六 ○又方一六

○生地黃湯一七 ○又方一七 ○丹參酒一七 ○牡丹皮湯一七 ○白堊圓一七 ○

又方一七 ○又方一六 ○芎藭湯一六 ○又方一六 ○又方一六 ○又方一六 ○

又方一六 ○又方一六 ○馬通湯一六 ○馬蹄屑湯一六 ○馬蹄圓一六 ○慎火草

散一六 ○蒲黃散一六 ○獨聖散一六 ○四君子湯一六 ○六君子湯一六 ○八珍

湯一六 ○加味逍遙散一三 ○歸脾湯一三 ○小柴胡湯一三 ○附子理中湯一三

○補中益氣湯一三 ○十全大補湯一三 ○八味丸一三 ○獨參湯一三 ○黃芪當歸

人參湯一三 ○龍腦雞蘇丸一三 ○黃芪膏子煎丸一三 ○黃芪膏熬法一三 ○易簡

芎歸湯一三 ○涼膈散一三 ○黃連解毒湯一三 ○酢附丸一三 ○芎歸膠艾湯一三



張從政儒門事親.....四

○血崩一四

李杲十書.....四

○經漏不止有三一四 ○治法一五

朱震亨心法.....五

○總論證治一五

戴思恭證治要訣.....六

○血崩證治一六

李梴醫學入門.....六

○總論證治一六 ○脈法一八

薛己醫案.....八

○血崩治法一八

徐春甫古今醫統.....八

○崩漏證治一八

王肯堂證治準繩.....九

○經驗簡要治崩中法一九 ○產寶分陰陽一九 ○黑藥通腎一九 ○論益胃升陽湯一〇

○治用升舉一〇 ○治用黃芩一〇

湯一三 ㊟加減四物湯一三 ㊟地黃丸一三 ㊟小薊湯一三 ㊟芎藭酒一三 ㊟奇效  
 四物湯一三 ㊟金華散一三 ㊟又方一三 ㊟立效散一三 ㊟牡蠣散一三 ㊟柏黃散  
 一三 ㊟丁香膠艾湯一三 ㊟又方一三 ㊟芎藭湯一三 ㊟斷下湯一三 ㊟又方一三  
 ㊟熟附丸一三 ㊟神應散一三 ㊟鹿茸丸一三 ㊟赤龍丹一三 ㊟紫金散一三 ㊟  
 白芷煖宮丸一三 ㊟琥珀散一三 ㊟荊芥散一三 ㊟開鬱四物湯一三 ㊟烏金散一三 ㊟  
 ㊟又方一三 ㊟無比散一三 ㊟伏龍肝散一三 ㊟地榆散一三 ㊟鹿茸散一三 ㊟  
 柏葉散一三 ㊟補宮丸一三 ㊟鎮宮丸一三 ㊟梅飲子一三 ㊟又方一三 ㊟十灰丸  
 一四 ㊟十灰散一四 ㊟又方一四 ㊟香礬散一四 ㊟如聖散一四

單方.....四〇

鍼灸.....四五

醫案.....四六

## 卷三百九十七彙考三百九十七

婦人帶下門一.....五一

黃帝素問.....五一

○骨空論一五二

張機金匱要略.....五一

- ㊟百子附歸丸一三
- ㊟四製香附丸一三
- ㊟黑附丸一三
- ㊟內灸散一三
- ㊟補陰丸一三
- ㊟大烏雞丸一三
- ㊟小烏雞丸一四
- ㊟芩心丸一四
- ㊟四物坎離丸一四
- ㊟固經丸一四
- ㊟升陽調經湯一四
- ㊟升陽舉經湯一四
- ㊟五積散一五
- ㊟不換金正氣散一五
- ㊟升陽除濕湯一五
- ㊟橘歸丸一五
- ㊟黑神散一五
- ㊟女金丹一五
- ㊟二宜丸一五
- ㊟補中益氣湯一五
- ㊟平補鎮心丹一五
- ㊟白芷散一五
- ㊟甯神膏一五
- ㊟滋陰甯神湯一五
- ㊟大溫經湯一五
- ㊟烏藥湯一五
- ㊟桂枝湯一七
- ㊟理中湯一七
- ㊟益母膏一七
- ㊟二聖湯一七
- ㊟黑龍丸一七

# 卷三百九十六彙考三百九十六

## 婦人崩漏門一

### 方二.....元

- ㊟斷源散一元
- ㊟荆芥四物湯一元
- ㊟子芩丸一元
- ㊟當歸龍骨丸一元
- ㊟獨行散一元
- ㊟白礬丸一三
- ㊟又方一三
- ㊟震靈丹一三
- ㊟三灰散一三
- ㊟全生活血湯一三
- ㊟七灰散一三
- ㊟加減十全大補湯一三
- ㊟五灰散一三
- ㊟解毒四物湯一三
- ㊟楊氏家藏黑金散一三
- ㊟萬靈膏藥一三
- ㊟藴黃散一三
- ㊟固經丸一三
- ㊟旋覆花湯一三
- ㊟半夏丸一三
- ㊟備金散一三
- ㊟縮砂散一三
- ㊟涼血地黃湯一三
- ㊟當歸芍藥湯一三
- ㊟柏子仁湯一三
- ㊟益胃升陽湯一三
- ㊟柴胡調經湯一三
- ㊟調經升陽除濕湯一三

戴思恭證治要訣.....五

○總論證治一五

李梴醫學入門.....六〇

○總論證治一六〇 ○脈法一六一

薛己醫案.....六二

○論證一六二

王肯堂證治準繩.....六三

○論證一六三 ○論潔古治法一六三 ○燥濕法一六三 ○枯涸宜潤一六三 ○補虛法一六三

○酸漿草辨一六三 ○敗膿所致一六三

吳崑醫方考.....六三

○用白芷黃荆實瓦壘子論一六三 ○用葵花論一六四 ○用千金白馬毛散論一六四

萬全廣嗣紀要.....六四

○帶下皆身中之血一六四

婦人祕科.....六五

○論治一六五 ○必用之藥一六五 ○白帶與白淫白濁不同一六五

張介賓景岳全書.....六五

○論證一六五 ○治法一六六

○帶下病脈證—五二

王叔和脈經.....五三

○脈證—五三

孫思邈千金方.....五三

○赤白帶下崩中漏下—五三

陳自明婦人良方.....五四

○帶下有五—五四

嚴用和濟生方.....五四

○論治—五四

劉完素六書.....五五

○論證—五五

張從政儒門事親.....五五

○赤白錯分寒熱解—五五

李杲十書.....五七

○酒衰當歸丸論—五七

○固真丸論—五七

○補經固真湯論—五七

朱震亨心法.....五八

○總論證治—五八

①小烏雞丸一七 ②芩朮芍藥丸一七 ③琥珀硃砂丸一七 ④益母膏一七 ⑤四君子  
 湯一七 ⑥四物湯一七 ⑦桂枝湯一七 ⑧理中湯一七 ⑨升陽燥濕湯一七 ⑩升陽  
 調經湯一七 ⑪半夏丸一七 ⑫胃風湯一七 ⑬補經固真湯一七 ⑭四妙固真丹一七  
 ⑮清白散一七 ⑯解帶散一七 ⑰八妙丸一七 ⑱固經丸一七 ⑲玉仙散一七 ⑳  
 朝元散一七 ㉑四神丸一七 ㉒二氣丹一七 ㉓又方一七 ㉔下熏藥一七 ㉕導痰丸  
 一七 ㉖萬靈膏藥一七 ㉗七味白朮散一七 ㉘人參黃芪湯一七 ㉙六味丸一七 ㉚  
 加味逍遙散一七 ㉛補宮丸一七 ㉜三補丸一七 ㉝四物加芩連湯一七 ㉞加味六君  
 子湯一七 ㉟震靈丹一七 ㊱和劑固陽丸一七 ㊲人參順氣散一七 ㊳加減人參黃芪  
 湯一七 ㊴樗皮丸一七 ㊵又方一七 ㊶固腸丸一七 ㊷又方一七 ㊸牡蠣散一七 ㊹補  
 乳香散一七 ㊺伏龍肝散一七 ㊻馬蹄丸一七 ㊼白芷散一七 ㊽牡蠣散一七 ㊾補  
 宮丸一七 ㊿白礬丸一七 ①補真潤腸湯一七 ②又方一七 ③又方一七 ④又方一  
 七 ⑤白藪丸一七 ⑥當歸煎一七 ⑦茯苓散一七 ⑧卷柏丸一七 ⑨艾煎丸一七  
 ⑩沉香牡丹丸一七 ⑪紫桂丸一七 ⑫固真丸一七 ⑬茅花散一七 ⑭苦棟丸一七  
 ⑮地榆膏一七 ⑯豆花散一七 ⑰調經補真湯一七 ⑱本事地黃丸一七 ⑲桂附湯一  
 七 ⑳香附六合湯一七 ㉑又方一七 ㉒二豆散一七 ㉓鶴頂丸一七 ㉔白堊丸一七  
 ㉕養氣活血丹一七 ㉖茱萸浴湯一七 ㉗坐藥龍鹽骨一七 ㉘勝陰丹一七 ㉙回陽  
 丹一七 ㉚酒煮當歸丸一七 ㉛溫經湯一七 ㉜益母散一七 ㉝香礬散一七 ㉞璚瑠  
 丸一七 ㉟白芍藥散一七 ㊱神仙聚寶丹一七 ㊲又方一七 ㊳麒麟竭湯一七 ㊴白  
 芷丸一七 ㊵當歸附子湯一七 ㊶又方一七

方一.....六

- ①白石脂圓一六
- ②小牛角鯁散一六
- ③龍骨散一七
- ④又方一六
- ⑤又方一六
- ⑥又方一七
- ⑦白馬蹄圓一六
- ⑧白馬蹄散一六
- ⑨雲母芎藭散一六
- ⑩慎火草散一六
- ⑪禹餘糧圓一充
- ⑫又方一充
- ⑬伏龍肝湯一充
- ⑭又方一充
- ⑮又方一充
- ⑯又方一充
- ⑰又方一充
- ⑱芎藭湯一充
- ⑲小柴胡湯一七
- ⑳補中益氣湯一七
- ㉑六君子湯一七
- ㉒歸脾湯一七
- ㉓八珍湯一七
- ㉔龍膽瀉肝湯一七
- ㉕妙香散一七
- ㉖四七湯一七
- ㉗丁香膠艾湯一七
- ㉘延胡苦楝湯一七
- ㉙神聖復氣湯一七
- ㉚搐鼻香一七
- ㉛又方一七
- ㉜衛生湯一七
- ㉝十棗湯一七
- ㉞瓜蒂散一七
- ㉟獨聖散一七
- ㊱導水丸一七
- ㊲禹功散一七
- ㊳無憂散一七
- ㊴五苓散一七
- ㊵葶藶木香散一七
- ㊶玉燭散一七
- ㊷三花神佑丸一七
- ㊸小胃丹一七
- ㊹五積散一七
- ㊺平胃散一七
- ㊻二陳湯一七
- ㊼黃芪建中湯一七
- ㊽大延胡索散一七
- ㊾蠡斯丸一七
- ㊿芩藥檮皮丸一七
- ㊽芩藥檮皮丸一七
- ㊾側柏檮皮丸一七
- ㊿蒼藥檮皮丸一七

卷三百九十八彙考三百九十八

婦人帶下門二.....七

方二.....七



①病因——五

李梴醫學入門……

①總論——五 ②論證治法——五

薛己醫案……

①癰巖治法——六

陳實功外科正宗……

①總論——七

張介賓景岳全書……

①乳病證治——八

方……

①加味歸脾湯——八 ②加味道遙散——九 ③甘桔湯——九 ④解毒湯——九 ⑤不換

金正氣散——九 ⑥益元散——九 ⑦補中益氣湯——九 ⑧四君子湯——九 ⑨八物湯

——九 ⑩十全大補湯——九 ⑪復元通聖散——二〇 ⑫歸脾湯——二〇 ⑬護心散——二〇

⑭一醉膏——二〇 ⑮古芷貝散——二〇 ⑯清肝解鬱湯——二〇 ⑰內托升麻湯——二〇 ⑱

托裏消毒散——二〇 ⑲內托十宣散——二二 ⑳湧泉散——二二 ㉑又方——二二 ㉒益氣養榮

湯——二二 ㉓冰蠲散——二二 ㉔生肌玉紅膏——二三 ㉕連翹金貝煎——二三 ㉖通和湯——

二三 ㉗丹溪方——二三 ㉘神效苦蕒散——二三 ㉙張氏橘皮湯——二三 ㉚勝金丹——二三

㉛獨勝散——二三 ㉜皂角散——二三 ㉝丹溪方——二三 ㉞又方——二三 ㉟又方——二三 ㊱

一五 一六 一七 一八 一八

單方.....九三

鍼灸.....九六

醫案.....九七

### 卷三百九十九彙考二百九十九

婦人諸乳疾門.....一〇一

寶漢卿瘡瘍全書.....一〇一

⊙乳病證治一〇一

陳自明婦人良方.....一〇一

⊙乳病證治一〇二

張從政儒門事親.....一〇三

⊙治法一〇四

朱震亨格致餘論.....一〇四

⊙乳鞭論一〇四

樓英醫學綱目.....一〇五

陳自明婦人良方.....一三〇

○陰病方論一一三〇

薛己醫案.....一三一

○陰病證治一一三一

李梴醫學入門.....一三一

○陰病證治一一三一 ○脈法一一三一

張三錫醫學準繩六要.....一三三

○陰病總論一一三三 ○證治一一三三

王肯堂證治準繩.....一三三

○陰病證治一一三三

陳實功外科正宗.....一三四

○總論一一三四

陳士鐸石室祕錄.....一三五

○治法一一三五

方.....一三五

○補中益氣湯一一三五 ○龍膽瀉肝湯一一三五 ○四物湯一一三五 ○逍遙散一一三五 ○歸脾

湯一一三五 ○古硫鯉丸一一三五 ○雄黃銳散一一三五 ○銀杏散一一三五 ○清肝滲濕湯一

東垣方一三三 ㊟牛蒡子湯一三四 ㊟橘葉散一三四 ㊟清肝解鬱湯一三四 ㊟鹿角散一

二四 ㊟回乳四物湯一三四 ㊟如意金黃散一三四 ㊟下乳天漿散一三五 ㊟木香餅一

二五 ㊟加味四物湯一三五 ㊟鯽魚湯一三五 ㊟鍾乳湯一三五 ㊟又方一三六 ㊟又方

一三六 ㊟漏蘆湯一三六 ㊟漏蘆散一三六 ㊟單行石膏湯一三六 ㊟麥門冬散一三六

㊟又方一三六 ㊟又方一三六 ㊟單行鬼箭湯一三七 ㊟甘草散一三七 ㊟竹皮大丸一

二七 ㊟玉露散一三七 ㊟豬蹄粥一三七 ㊟十六味流氣飲一三七

單方.....一八

鍼灸.....二二

醫案.....二二

### 卷四百彙考四百

婦人前陰諸疾門.....二九

張機金匱要略.....二九

○前陰諸證一三五

王叔和脈經.....三九

○脈證一三五

○論證脈——一五

方賢奇效良方.....一五

○總論證治——一五

張介賓景岳全書.....一五

○論證治——一五

方.....一五

○茯神散——一五 ○桃仁丸——一五 ○辟瘟丹——一五 ○殺鬼雄黃散——一五 ○別離散——

一五 ○朱砂散——一五 ○又方——一五 ○太乙精神丹——一五 ○六一泥法——一五 ○蘇

合香丸——一五 ○妙香散——一五

單方.....一五

鍼灸.....一五

醫案.....一五

婦人交腸門.....一五

樓英醫學綱目.....一五

○交腸論證治——一五

方.....一五

- 一三 ⑤涼榮瀉火湯—一三七 ⑥塌癢湯—一三七 ⑦雄黃藜蘆散—一三七 ⑧芎歸湯—一三七
- ⑨內疎黃連湯—一三七 ⑩透膿散—一三七 ⑪八珍湯—一三七 ⑫加減八味丸—一三七 ⑬小柴胡湯—一三七 ⑭消風散—一三七 ⑮蘆薈丸—一三七 ⑯加味逍遙散—一三七 ⑰三茱丸—一三七
- ⑱一捻金丸—一三七 ⑲黃芩散—一三七 ⑳丹溪方—一三七 ㉑潔古方—一三七 ㉒當歸湯—一四〇
- ㉓藿香養胃湯—一四〇 ㉔又方—一四〇 ㉕又方—一四〇 ㉖又方—一四〇 ㉗肘後方—一四〇
- ㉘黃芩湯—一四〇 ㉙雄黃散—一四一 ㉚補心湯—一四一 ㉛又方—一四一 ㉜又方—一四一 ㉝又方—一四一
- ㉞當歸散—一四二 ㉟又方—一四二 ㊱菖蒲散—一四二 ㊲又方—一四二 ㊳又方—一四二 ㊴塌腫湯—一四二
- ㊵洗揚散—一四三 ㊶疳濕散—一四三 ㊷蛇牀子散—一四三 ㊸狼牙湯—一四三 ㊹麻黃湯—一四三
- ㊺白礬散—一四三 ㊻大黃散—一四三 ㊼廣濟方—一四三 ㊽千金方—一四三 ㊾珍珠散—一四三
- ㊿海螵蛸散—一四三 ㉀單行太和湯—一四三 ㉁洗心散—一四三 ㉂膏髮煎—一四三
- ㉃集驗方—一四四 ㉄桑白皮湯—一四四 ㉅來復丹—一四四 ㉆五加皮浸酒方—一四四 ㉇又方—一四四
- ㉈又方—一四四 ㉉溫中坐藥蛇牀子散—一四五 ㊀八味丸—一四五

單方

鍼灸

醫案

婦人夢與鬼交門

陳自明婦人良方

# 欽定古今圖書集成醫部全錄

## 醫部彙考三百九十五

### 婦人崩漏門一

#### 黃帝素問

○陰陽別論

陰虛陽搏謂之崩。

註陰虛陽盛則迫血妄行。

○六元正紀大論

少陽司天之政，初之氣風勝乃搖，候乃大溫，其病血崩。

#### 漢張機金匱要略

○漏下

寸口脈弦而大，弦則爲減，大則爲芤，減則爲寒，芤則爲虛，寒虛相搏，此名曰革，婦人則半產漏下，旋覆花湯主之。



- 五苓散——一五
- 補中益氣湯——一五
- 四物湯——一五

醫案.....一五

血不歸經，用歸脾加柴梔丹皮。若悲傷胞絡而血下崩，用四君加柴梔升麻。故東垣云：「凡下血證，須用四君子以收功。」厥有旨哉！若大吐血，毋以脈論，當急用獨參湯救之。若潮熱，效嗽脈數，乃元氣虛弱假熱之脈，尤當用人參溫補。此等證候，無不由脾胃先損，故脈洪大，察其有胃氣能受補，則可救。苟用寒涼止血之藥，復傷脾胃，反不能攝血歸源，是速其危也。

婦人崩中漏下之證，按其寸口脈弦而大，弦則爲緊，大則爲芤，緊則爲寒，芤則爲虛，虛寒相搏，其名爲革。婦人半產漏下，赤白不止，脈小虛滑者生，脈大緊實數者死。又脈急疾者死，遲者生。又云：尺寸脈虛者漏血，脈浮者俱不治。

註前證闡內經微旨，濟無窮天札，須固胃爲善。蓋胃爲五臟之本源，人身之根蒂也。

婦人血崩而心痛，甚名曰殺血心痛，由心脾血虛也。若小產去血過多而心痛甚者亦然。用鰾魚骨炒爲末，酢湯調下，失笑散亦效。

註前證若陰血耗散，用鰾魚丸收斂之。若瘀血不散，用失笑散行散之。若心血虛弱，用芎歸湯補養之。若鬱結傷血，用歸脾湯調補之。

## 嚴用和濟生方

### ○總論證治

崩漏之疾本乎一證，輕者謂之漏下，甚者謂之崩中。且平居婦人經脈調適，衝任二脈互相滋養，陰陽二氣不相偏勝，則月事以時下。儻若將理失宜，喜怒不節，疲極過度，大傷於肝。蓋肝爲血之府庫，喜怒勞役，一或傷之，肝不能藏血於宮，宮不能傳血於海，所以崩中漏下。漏下者，淋瀝不斷是也。崩中者，忽然暴下，乃漏證之甚者也。其狀或如豬肝，或成五色，與血俱下，又或如泔如涕，如爛瓜汁，又或如豆羹汁，如藍靛色，至有黑如乾血相雜，亦有純下瘀血者。此皆衝任虛損，喜怒勞役之過，致傷於肝而然也。又久不止，面黃肌瘦，虛煩口乾，臍腹冷痛，吐逆不食，四肢虛困，甚

### 晉王叔和脈經

#### ○崩漏脈法

師曰：婦人有漏下者，有中生後因續下血都不絕者，有妊娠下血者，假令妊娠，腹中痛為胞漏，一云阻。膠艾湯主之。婦人妊娠經斷三月而得漏下，下血四十日不止，胎欲動在於臍上，此而妊娠六月動者，前三月經水利時胎也。下血者，後斷三月，亦所以下血不止者，其癥不去故也。當下其癥，宜桂枝茯苓圓。

問曰：「五崩何等類？」師曰：「白崩者形如涕，赤崩者形如絳津，黃崩者形如爛瓜，青崩者形如藍色，黑崩者形如衄血也。」

診婦人漏血，下赤白，日下血數升，脈急疾者死，遲者生。

婦人帶下脈浮，惡寒漏下者，不治。

### 宋陳自明婦人良方

#### ○暴崩下血

婦人衝任二脈為經脈之海，外循經絡，內榮臟腑，若陰陽和平，經下依時，若勞傷不能約制，則忽然暴下，甚則昏悶。若寸脈微遲，為寒在上焦，則吐血衄血，尺脈微遲，為寒在下焦，則崩血便血。大抵數小為順，洪大為逆，大法當調補脾胃為主。

註按經云：「陰虛陽搏謂之崩。」又云：「陽絡傷則血外溢，陰絡傷則血內溢。」又云：「脾統血，肝藏血。」治法前證因脾胃虧損不能攝血歸源，用六君加芎歸柴胡。若肝經之火而血下行，用奇效四物湯，或四物加柴梔芩朮。若肝經風熱而血妄行，用加味逍遙散，或小柴胡梔芩丹皮。若怒動肝火而血沸騰，亦用前藥。若脾經鬱結而

血也。故本篇曰：「大經空虛發則肌癢，傳爲脈痿。」此之謂也。

### ①治法

女子漏下惡血，月事不調，或暴崩不止，多下水漿之物，皆由飲食不節，或勞傷形體，或素有心氣不足，因飲食勞倦，致令心火乘脾，其人必怠惰嗜臥，四肢不收，困倦乏力，無氣以動，氣短上衝，逆急上衝，其脈緩而弦急，按之洪大，皆中之下得之，脾土受邪也。脾主滋榮周身者也。心主血，血主脈，二者受邪，病皆在脈。脈者血之府也。脈者人之神也。心不主令，包絡代之，故曰心之脈主屬心系。心系者，包絡命門之脈也。主月事，因脾胃虛而心包乘之，故漏下月事不調。况脾胃爲血氣陰陽之根蒂，當除濕去熱，益風氣上伸，以勝其濕，用升陽除濕湯，卽內經火鬱則發之之義也。然此藥乃從權之法，用風勝濕，爲胃下陷而氣迫於下，以救其血之暴崩也。若血惡住後，必須黃芪、人參、炙甘草、當歸之類，數服以補之，於補氣升陽湯中，加以和血便是。若經血惡物下之不絕，尤宜究其根源，治其本經，只益脾胃，退心火之亢，乃治其根蒂。若遇夏月白帶下，脫漏不止，宜用此湯，一服立止。

婦人血崩，是腎水陰虛，不能鎮守包絡相火，故血走而崩也。涼血地黃湯主之。崩漏太多，昏冒不省人事，瞑目無所知識，蓋因血暴亡也。血去則精神無所養，暴損氣血，豈能久活？今當補而升舉之，以助其陽，則目張神不昏迷矣。今立一方，補血養血，生血益陽，以補手足厥陰之不足，曰全生補血湯。

## 朱震亨心法

### ①總論證治

血崩東垣有治法，但不言熱，其主在寒。學者宜尋思之。急則治其標，用白芷湯調百草霜末，甚者用櫻櫚灰。後用四物湯加炒乾薑調理。因勞者用參芪帶升補藥。因寒者用乾薑因熱者用黃芩崩過多者，先用五靈脂末一服，當分寒熱。蓋五靈脂能行能止，紫色成塊者熱也。以四物湯加黃連之類。

則爲脹爲腫，診其脈，寸口脈弦而大，弦則爲減，大則爲芤，減則爲寒，芤則爲虛，寒虛相搏，其名爲革，婦人則主半產漏下。又尺寸脈虛者，漏血，漏血脈浮者不可治。治之之法，調養衝任，鎮注血海，血海溫和，歸於有用，內養百脈，外爲月事，自無崩中漏下之患矣。

### 元張從政儒門事親

#### ○血崩

婦人年及四十以上，或悲哀太甚，內經曰：「悲哀太甚則心系急，心系急則肺布葉舉，而上焦不通，熱氣在中，故經血崩下。」心系者，血山也，如久不愈，則面黃肌瘦，慎不可與燥熱之藥治之，豈不聞血得熱而流散乎？先以黃連解毒湯，次以涼膈散四物湯等藥，治之而愈。四物湯是涼血者，乃婦人之仙藥也，量虛實加減，以意消息用之。

### 李杲十書

#### ○經漏不止有三

陰陽別論云：「陰虛陽搏謂之崩。」婦人脾胃虛損，致命門脈沉細而數疾，或沉弦而洪大有力，寸關脈亦然，皆由脾胃有虧，下陷於腎，與相火相合，濕熱下迫，經漏不止，其色紫黑，如夏月腐肉之臭，中有白帶者，脈必弦細，寒作於中，中有赤帶者，其脈洪數疾，其熱明矣。必腰痛或臍下痛，臨經欲行，先見寒熱往來，兩脅急縮，兼脾胃證出見，或四肢困熱心煩，不得眠臥，心下急，宜大補脾胃而升舉血氣，可一服而愈。或人故貴脫勢，人事疎少，或先富後貧，心氣不足，其火大熾旺於血脈之中，又致脾胃飲食失節，火乘其中，形質肌肉容顏似不病者，此心病者不形於診，故脾胃飲食不調，其證顯矣，而經水不時而下，或適來適斷，暴下不止，治當先勸諭令心不動，而以大補氣血之藥，舉養脾胃，微加鎮墜心火之藥，治其心，補陰瀉陽，經自止矣。痿論云：「悲哀太甚則胞絡絕，陽氣內動，發則心下崩，數溲。」

芪血虛者四物湯加膠艾炒乾薑久不止者百子附歸丸墨附丸虛寒臍腹冷痛者伏龍肝散一切虛證內灸散。虛火涼血地黃湯生地芩連湯補陰丸。久者當歸部骨丸大小烏雞丸。

膏梁厚味以致脾濕下流於腎與相火合爲濕熱迫經下漏其色紫黑腐臭宜解毒四物湯涼血地黃湯膠艾四物湯加黃芩或單芩心丸四物坎離丸固經丸。

飲食失節火乘脾胃下陷容顏似無病者外見脾氣困倦煩熱不臥等證經水不時暴至或適來適斷只宜舉養脾胃加以鎮墜心火之藥補陰瀉陽自止升陽調經湯升陽舉經湯。

子宮爲四氣相搏則血亦難停大槩風冷搏動者五積散去麻黃入酢煎服或不換金正氣散加川芎官桂或四物湯加荊芥寒冷所乘及年老久崩者伏龍肝散加附子鹿茸阿膠蒲黃糯米糊丸服。暑月單芩心丸或益元散加百草霜濕者升陽除濕湯。

悲哀甚則包絡絕包絡絕則陽氣內陷發則心下崩數洩血也宜備金散四製香附丸烏藥湯古橘歸丸憂鬱因先富後貧先順後逆心事不足鬱火旺於血脈之中宜四物湯加香附白朮各一錢地榆黃芪人參各五分升麻二分甚者加櫻櫚灰酒調服。

經曰『陰虛陽搏謂之崩。』言屬熱者多也崩乃經血錯亂不循故道淖溢妄行遽止便有積瘀凝成窠臼不止又恐昏運必先服五靈脂末一錢其性能行能止然後分虛熱用調和氣血之藥一二貼後再服單五靈脂散去故生新如更不止烏紗帽散十灰散古黑神散單夏枯草膏有火者固經丸虛者女金丹。

血崩止後宜四物湯加炒乾薑調之氣弱加參芪有鬱加香附挾火加芩連少許更服二宜丸四物湯以還舊血免致孤陽防其再發如脾胃氣弱者補中益氣湯心神不安者甯神膏滋陰甯神湯此疾有心血不足者有心火亢甚者若不早治變爲白濁白淫血枯發熱不可治矣。

日夜流津如清米泔或如膠者謂之白崩與白淫大同多憂思過度所致誠難治療宜平補鎮心丹。

婦人血崩，用香附白芷丸服。氣虛血虛者，皆以四物湯加參芪。若漏下乃熱而虛，四物加黃連。夫婦人崩中者，由臟腑傷損，衝任二脈血氣俱虛故也。二脈爲經脈之海，血氣之行，外循經絡，內榮臟腑，若氣血調適，經下依時，若勞動過極，臟腑俱傷，衝任之氣虛，不能約制其經血，故忽然而下，謂之崩中。暴下治宜當大補氣血之藥，舉養脾胃，微加鎮墜心火之藥，治其心，補陰瀉陽，經自止矣。東垣之言，洵不容易。

### 明戴思恭證治要訣

#### ○血崩證治

崩有血熱而成者，有氣虛而成者。血大至曰崩中，或清或濁，或純下瘀血，或腐勢不可止，證狀非一，所感亦異。甚則頭目昏運，四肢厥冷，並宜膠艾湯、嘔震靈丹，佐以三灰散，或以童子小便煎理中湯，或以沉香降氣湯，加入百草霜、米飲調下。血崩甚而腹痛，人多疑惡血未盡，又見血色瘀黑，愈信惡血之說，不敢止截。大凡血之爲患，欲出未出之際，停在腹內，卽成瘀色難盡，以瘀爲惡，又焉知瘀之不爲虛冷乎？若必待見瘀血爲虛冷而後截之，恐併與人無之矣。此腹痛更有說血積而腹痛，血通而痛止，崩而腹痛，血住則止，止宜芎歸湯，加乾薑熟附一錢，止其血而痛自定，仍以毛蟹殼燒存性，米飲下，亦有以早黃麻根燒灰爲末，米飲下。

### 李梴醫學入門

#### ○總論證治

凡非時血行，淋瀝不已，謂之漏下，忽然暴下，若山崩然，謂之崩中。有五色以應五臟，二者之由，虛與熱而已。蓋血虛則滯，血熱則流故也。治法多端，隨證制宜，詳列於左：



也。中年已上人及高年，髮婦多是憂慮過度，氣血俱虛，此爲難治，必須大補氣血，養脾胃，固血，庶候十之二三，斯疾若不早治，則如頽圮之厦，斜倒傾欹，勢難支撐，而使之正，又如苗槁而後灌溉，何可使之秀耶？一血崩證有因虛，有因熱，虛則下陷，熱則流通，視其緩急，分標本而治之。緩用四物湯，加條芩、附子，急以立效散神效丸之屬。

一血臟虛冷，崩中下血，宜四物湯加阿膠、黃芩、參芪，東垣謂崩帶下久，有屬於寒，不可一途而論。

### 王肯堂證治準繩

#### ①經驗簡要治崩中法

冷者脈緊細，手足寒，紅而淡黑，或五色，當歸建中加白龍骨、血竭、附子，下紫石英丸，震靈丹灸火。

熱者脈洪，四肢溫，心煩口苦，燥血沸而成，用黃芩湯、荊芥散，或清心蓮子飲，加竹瀝、生地黃汁，甚者生地黃汁磨京墨、百草霜冷服。

虛者，膠艾湯加麥門冬、鹿茸、龍骨、酸棗仁，或養榮湯加龍骨、血竭、送震靈丹。

實者，腹中痛，養附丸，四物湯加香附子。

心虛者，恍惚多夢，健忘舌強，小便多，面紅盜汗，柏子仁湯、酸棗仁湯，加龍骨、京墨、百草霜，吞靈砂丹，又靈砂、當歸、蓮肉、龍骨、棗肉丸，參湯送下。

崩中作麝香，當歸香者，心氣已散，急服靈砂龍骨等。

#### ②產寶分陰陽

受熱而赤，謂之陽崩，受冷而白，謂之陰崩。

#### ③黑藥通腎

凡崩中或用升提，如升陽調經湯，或用收澀，如伏龍肝散，白芷散。然暫止而終不止者，蓋衛司開闔而為榮血之主，脾胃為血海水液之會，衛氣與胃氣俱虛，則血液無所約制，是以古方有用桂枝湯加附子以固衛氣者，有用四君子湯加草果、丁香、木香以燥水健脾者，或用理中湯加陳皮、半夏，或單半夏丸用芎歸煎湯下，或補中益氣湯，平胃散，皆補衛厚脾，使氣血自循故道，而不專於收澀以劫奪之也。

③脈法

脈微弱為少氣，女子主崩中漏下，致面色焦枯。

心脈獨沉，主氣鬱下流崩漏去紅。

腎脈浮芤，腎虛也，女人則經漏。

後部彈，手陰躄脈也，主裏急陰疝崩漏。

薛己醫按

①血崩治法

崩之為患，或因脾胃虛損，不能攝血歸源，或因肝經有火，血得熱而下行，或因肝經有風，血得風而妄行，或因怒動肝火，血熱而沸騰，或因脾經鬱結，血傷而不歸經，或因悲哀太過，胞絡傷而下崩。治療之法，脾胃虛陷者，補中益氣湯。

徐春甫古今醫統

①崩漏證治

之更宜早服地黃丸。夕服參朮大補丸以平爲期。

### 景岳全書

臣張介賓著

#### ○論證

崩漏不止，經亂之甚者也。蓋亂則或前或後，漏則不時妄行，由漏而淋，由淋而崩，總因血病，而但以其微甚耳。陰陽別論曰：「陰虛陽搏謂之崩。」百病始生篇曰：「陽絡傷則血外溢，陰絡傷則血內溢。」故凡陽搏必屬陰虛，絡傷必致血溢，知斯二者，而崩淋之義及治療之法，思過半矣。惟是陰虛之說，則但傷營氣，無非陰虛，而五臟之陰，皆能受病，故神傷則血無所主，病在心也；氣傷則血無所從，病在肺也；意傷則不能統血，攝血病在脾也；魄傷則不能畜血，藏血病在肝也；志傷則不能固閉真陰，病在腎也。所以五臟皆有陰虛，五臟皆有陽搏，故病陰虛者，單以臟氣受傷，血因之而失守也；病陽搏者，兼以火居陰分，血得熱而妄行也。凡治此之法，宜審臟氣，宜察陰陽，無火者，求其臟而培之，補之，有火者，察其經而清之，養之，此不易之良法也。然有火者，不得不清，但元氣既虛，極多假熱，設或不明真假，而誤用寒涼，必復傷脾胃，生氣日見殆矣。先賢有云：「凡下血證，須用四君子輩以收功。」又云：「若大吐血後，毋以脈診當急用獨參湯救之。」厥旨深矣。故凡見血脫等證，必當用甘藥先補脾胃，以益發生之氣，蓋甘能生血，甘能養營，但使脾胃氣強，則陽生陰長，而血自歸經矣。故曰脾統血。

#### ○論治

治崩淋經漏之法，若陰虛血熱妄行者，宜保陰煎，加減一陰煎。若火盛迫血妄行而無虛證者，宜徙薪飲，黃芩散，加續斷丹參。若血熱兼滑者，宜保陰煎，槐榆散，生地黃湯。若肝經怒火動血者，加味四物湯。若肝經怒火動血逆氣未散者，化肝煎，或保陰煎，加減主之。若血有滯逆而妄行者，四物湯，丹參散。若營氣不足，血不能調而妄行者，五福飲，四物湯，四君子湯，八珍湯，擇宜用之。若脾氣虛陷，不能收攝而脫血者，壽脾煎，歸脾湯，四君子，加芎歸，再甚者，舉元

凡治崩中，多用燒灰黑藥。經云：『北方黑色，入通於腎，』皆通腎經之藥也。夫血者，心之色也，血見黑即止者，由腎水制心火故也。

④論益胃升陽湯

血脫益氣，古人之法也，先補胃氣以助生長，故曰陽生陰長，諸甘藥爲之先務，舉世皆以爲補氣，殊不知甘能生血，此陽生陰長之理也。

⑤治用升舉

凡血崩脈沉弦而洪，或沉細而數，或崩而又兼久瀉者，皆胃氣下陷也，故舉之升之，其病自愈。

⑥治用黃芩

崩中藥，多是用止血藥及補血藥，惟黃芩爲末，用霹靂酒下一法，乃是治陽乘陰，所謂治天暑地熱經水沸溢者。

萬全婦人祕科

①崩漏論

女子未及二七天癸之期，而男子強與之合，或於月事適來未斷之時，而男子縱慾不已，衝任內傷，血海不固，由斯二者，爲崩爲漏。

婦人崩中之病，皆因中氣虛不能收斂其血，加以積熱在裏，迫血妄行，故令經血暴下而成崩，崩久不止，遂成下漏。

②治有三法

初止血，次清熱，後補其虛，未有不愈者也。

凡婦人女子，初得崩中暴下之病者，宜用止血之劑，乃急則治其標也。四物湯調十灰散治之，以血止爲度。血止即

婦人於四旬外，經期先斷之年，多有漸見阻隔，經期不至者。當此之際，最宜防察。若果氣血和平，素無他疾，此固漸止而然，無足慮也。若素多憂鬱，不調之患，而見此過期阻隔，便有崩決之兆。若隔之淺者，其崩尚輕，隔之久者，其崩必甚。此因隔而崩者也。當預服四物八珍之類，以調之，否則恐其鬱久而決，則爲患滋大也。若其既崩之後，則當辨其有火無火。有火者，因火逼血，宜保陰煎主之。無火者，因隔而決，或其有滯，當去其故而養其新，宜調經飲先以理之，然後各因其宜，可養則養，用小營煎可固則固，用固陰煎之類主之。

### 石室祕錄

臣陳士鐸著

#### ○血崩治法

血崩之後，口舌燥裂，不能飲食者死。蓋亡血自然無血以生精，精涸則津亦涸，必然之勢也。欲使口舌之乾者重潤，必須使精血之竭者重生，補精之方，六味丸最妙。然而六味丸單補腎中之精，而不能上補口舌之津也。雖補腎於下，亦能通津於上，然終覺緩不濟急。今定一方，上下兼補，名上下相資湯。熟地、麥冬各一兩，山茱萸、牛膝、沙參、當歸、葳蕤各五錢，人參、元參各三錢，北五味二錢，車前子一錢，水煎服。此方補腎爲君，而兼用補肺之藥，子母相資，上下兼潤，精生而液亦生，血生而津亦生矣。安在垂死之證，不可慶再生耶？

血崩不止，一時昏運，或有不知人而死者，此病多起於貪慾。若治之不得法，日用止澀之藥，未有不輕變重而重變死者。方用安崩湯治之。人參、黃芪、白朮各一兩，三七根末三錢，水煎調三七根末服之，一劑卽止崩，可返危爲安也。蓋崩血之後，惟氣獨存，不補氣而單補血，緩不濟事。今亟固其欲絕之氣，佐之三七以澀其血，氣固而血自不脫也。

### 方一

#### ○小牛角觶散

千金方下同

治帶下五崩：一曰熱病下血，二曰寒熱下血，三曰經脈未斷爲房事則血

煎。若脾腎虛寒兼嘔兼泄而畏寒者，理陰煎。五君子煎，理中湯。若陽氣大虛脫陷者，四維散。若脾腎陰氣不固者，固陰煎。五陰煎，秘元煎。若肝膽氣虛不能藏血者，必多驚恐畏怯，宜五福飲。七福飲，八珍湯。兼陽虛者，仍加薑桂。若去血過多，血脫氣竭者，當速用獨參湯，提握其氣以防脫絕。或用當歸補血湯。若崩淋既久，血滑不禁，宜澀宜固者，龍骨散，如聖散。七灰散之類，同人參兼用之。

凡血淋治法大約如前，但其穢臭脈滑者多火，宜從清涼。若腥臭清寒脈細者多寒，必須溫補。其或久病則精去無窮，尾閥易竭，非大加培補不可，惟固陰煎及十全大補湯之類爲宜。

崩淋之病有暴崩者，有久崩者，其來驟其治亦易。久崩者其患深，其治亦難。且凡血因崩去，勢必漸少，少而不止，病則爲淋。此等證候，未有不由憂思鬱怒，先損脾胃，次及衝任而然者。崩淋既久，真陰日虧，多致寒熱欬嗽，脈見弦數，或豁大等證，此乃元氣虧損，陰虛假熱之脈，尤當用參地歸朮甘溫之屬，以峻培本源，庶可望生。但得胃氣未敗，受補可救。若不能受補，而日事清涼，以苟延目前，則終非吉兆也。

崩淋病治有五臟之分，然有可分者，有不可分者。可分者，如心肺居於膈上，二陽臟也。肝脾腎居於膈下，三陰臟也。治陽者宜治其氣，治陰者宜治其精，此可分之謂也。然五臟相移，精氣相錯，此又其不可分者也。卽如病本於心，君火受傷，必移困於脾土，故治脾卽所以治心也。病本於肺，治節失職，必殘及於腎水，故治腎卽所以治肺也。脾爲中州之官，水穀所司，餉道不資，必五路俱病，不究其母，則必非治脾良策。肝爲將軍之官，鬱怒是病，勝則伐脾，敗則自困，不知強弱，則攻補不無倒施，不獨此也。且五臟五氣無不相涉，故五臟中皆有神氣，皆有肺氣，皆有胃氣，皆有肝氣，皆有腎氣，而其中之或此或彼，爲利爲害，各有互相倚伏之妙，故必悟臟氣之大本，其強弱何在，死生之大權，其緩急何在，精氣之大要，其消長何在，攻補之大法，其先後何在，斯足稱慧然之明哲。若謂心以棗仁，遠志，肺以桔梗，麥冬，脾以白朮，甘草，肝以青皮，芍藥，腎以獨活，元參之類，是不過膚毛之見，又安知性命之道也。諸證皆然，不止崩

⑤增損禹餘糧圓 治女人勞損因成崩中狀如月經來去多不可禁止積日不斷五臟空虛失色黃瘦崩竭暫止少日復發不耐動搖小勞輒劇治法且宜與湯未宜與此丸也發時服湯減退即與此丸若是疾久可以長與此圓。

禹餘糧，龍骨，人參，桂心，紫石英，烏頭，桑寄生，杜仲，五味子，遠志各二兩。澤瀉，當歸，石斛，茯苓，乾薑各三兩。牡蠣煅，甘草，蜀椒各一兩。右為末，蜜丸，梧子大空心酒下十九，漸加至二十九，日三服。

⑥又方 治女人白崩及痔漏。

槐耳，白朮，艾葉，蒲黃，白芷各二兩。黃芪，人參，續斷，當歸，禹餘糧，乾地黃，橘皮，茯苓，蝟皮各三兩。牛角鯁四兩，豬後懸蹄二十箇，白馬蹄四兩酒浸一宿熬。右十七味為末，蜜丸，每日空心酒下二十九，日二加之。

⑦又方 治女人忽暴崩中，去血不斷，或如鵝鴨肝。

小薊根六兩，當歸，阿膠，續斷，青竹茹，芎藭各三兩。生地黃八兩，釜月下土絹囊裏，地榆各四兩。馬通一升。右十味咬咀，以水八升，和馬通汁煮取三升，分三服，不止頻服三四劑，未全止，續服後丸。如赤帶用赤馬通。如白帶用白馬通。

⑧丸方 服前藥未全止，即服此丸。

乾地黃一兩半，續斷，甘草，地榆，鹿茸，小薊根，丹參各三十銖。芎藭，阿膠炒珠，當歸，赤石脂各一兩半。柏子仁一兩，龜甲，秦牛角鯁各三兩，剉熬令黑。右為末，蜜丸，梧子大空心以酒服十九，日再服，稍加至三十九。

⑨又方 治女人崩中去赤白。



漏，四日經來，舉重傷任脈，下血，五日產後，臟開經利，五賁之病，外實內虛。

牛角鯁一枚燒令赤，鹿茸，禹餘糧，當歸，乾薑，續斷，各二兩。阿膠三兩，赤小豆二升，鰾魚骨，龍骨，各一兩。右十味，治下篩，空腹以酒服，方寸匕，日三。一方無鹿茸，鰾魚骨。

①雲母芎藭散 治五崩身瘦，欬逆煩滿，少氣心下痛，面生瘡，腰痛不可俛仰，陰中腫，如有瘡，狀毛中，

癢時痛，與子臟相通，小便不利，常拘急，頭眩頸項急痛，手足熱，氣逆衝急，心煩不得臥，腹中急痛，食不下，吞酸噎苦，上下腸鳴，漏下赤白，青黃黑汁，大臭如膠，汚衣狀，皆是內傷所致。中寒即下白，中熱即下赤，多飲即下黑，多食即下黃，多藥即下青，或喜或怒，心中常恐，或憂勞使發動，大惡風寒。

雲母，芎藭，代赭，東門邊木燒，各一兩。白殭蠶，鰾魚骨，白堊，蝟皮，各六銖。鼈甲，桂心，伏龍肝，

生鯉魚頭，各十八銖。右十二味，治下篩，酒服，方寸匕，日三夜一。一方有龍骨，乾薑，一方有龜甲，無鼈甲。

②禹餘糧圓 治崩中赤白不絕，困篤。

禹餘糧五兩，白馬蹄十兩，龍骨三兩，鹿茸二兩，鰾魚骨一兩。右五味為末，蜜丸，梧子大，以酒服二十丸，日再，以知為度。

④慎火草散 治崩中漏下赤白，青黑，腐臭不可近，令人面黑無顏色，皮骨相連，月經失度，往來無常，

小腹弦急，或苦絞痛，上至心，兩脅腫脹，食不生肌膚，令人偏枯，氣息乏少，腰脊痛連脅，不能久立，每嗜臥困懶。

慎火草，白石脂，禹餘糧，鼈甲，乾薑，細辛，當歸，川芎藭，金釵石斛，白芍藥，牡蠣煨，各二兩。

熟艾，桂心，各一兩。黃連，薔薇根皮，熟地，各四兩。右十六味，治下篩，空腹酒服，方寸匕，日三，稍加至二匕。若寒多者，加附子椒各一兩。若熱多者，加知母，黃芩各一兩。若白多者，加乾薑，白石脂各二兩。若赤多者，

肥羊肉二斤，乾薑，當歸各三兩。生地二升。右咬咀以水二斗，煮羊肉取一斗三升，下地黃汁及諸藥，煮取三升，分四服，即斷尤宜羸瘦人服之。

⑤ 生地黃湯 治崩中漏下，日去數升。生地黃一斤，細莘三兩。右二味咬咀，以水一斗，煮取六升，服七合，久服佳。

⑥ 又方 治崩中下血，羸瘦少氣，調中補虛止血。澤蘭，蜀椒各二兩六銖，藁本，柏子仁，山茱萸，厚朴各十八銖。蕪荑半兩，乾地黃，牡蠣各一兩半。

代赭，桂心，防風，細莘，乾薑各一兩。甘草，當歸，芎藭各一兩十八銖。右十七味，治下篩，空心溫酒服，方寸匕，日三。一方加白芷，龍骨各十八銖，人參一兩十八銖，為二十味。

⑦ 丹參酒 治崩中去血及產餘疾。丹參，艾葉，地黃，忍冬，地榆各五斤。右剉熟，春以水漬三宿，出滓，煮取汁，以黍米一斛，炊飯釀酒，酒熟，榨之，初服四合，後稍稍添之。

⑧ 牡丹皮湯 治崩中血盛。牡丹皮，乾地黃，斛脈各三兩。禹餘糧，艾葉，柏葉，龍骨，厚朴，白芷，伏龍肝，青竹茹，芎藭，地榆各二兩。阿膠一兩，芍藥四兩。右咬咀，以水一斗五升，煮取五升，分五服，相去如人行十里，久再服。

⑨ 白堊圓 治女人三十六疾，胞中病漏下不絕。邯鄲白堊，禹餘糧，白芷，白石脂，乾薑，龍骨，桂心，瞿麥，大黃，石葦，白薇，細莘，芍藥，甘草，黃連，附子，當歸，茯苓，鍾乳，蜀椒，黃芩各半兩。牡蠣，鷓鴣骨各十八銖。右為末，蜜丸，梧子大，空心酒服五丸，日再服，不知加至十九。

⑩ 又方 治女人漏下，或癢或劇，常漏不止，身體瘦，飲食減少，或赤或白，或黃，使人無子。

白馬蹄五兩，蒲黃，鹿茸，禹餘糧，小薊根，白馬鬃毛，白芷，續斷各四兩。人參，黃芪，地黃，柏子仁，鷓鴣骨，茯苓，當歸各三兩。艾葉，菴蓉，伏龍肝各一兩。右十八味爲末，蜜丸如梧子大，空心飲服二十九日，再加至四十九。

⑥當歸湯 治崩中去血虛羸。

當歸，芎藭，黃芩，芍藥，甘草各二兩。生竹茹二升。右咬咀，以水一斗，煮竹茹取六升，去滓內諸藥，煎取三升半，分三服，忌勞動，噎禁百日房事。

①又方 治崩中下血極多，或月經來過多，及過期不來。

吳茱萸，當歸各三兩。芎藭，人參，芍藥，牡丹，桂心，阿膠，生薑，甘草各一兩。半夏八兩，麥門冬一升。右咬咀，以水一斗，煮取三升，分爲三服。

②又方 治女人白崩。

芎藭，桂心，阿膠，赤石脂，小薊根各二兩。乾地黃四兩。伏龍肝如雞子大七枚。右咬咀，以酒六升，水四升，合煮取三升，去滓，內膠令烊盡，分三服，日三。一方無伏龍肝。

③伏龍肝散 治崩中去赤白，或如豆汁。

伏龍肝如彈子七枚，生薑五兩，生地四升，甘草，艾葉，赤石脂，桂心各二兩。右七味咬咀，以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一。一方生地黃五兩。

④大牛角中仁散 治積冷崩中去血不止，腰背痛，四肢沉重虛極。

牛角仁一枚燒，續斷，乾地黃，桑耳，白朮，赤石脂，礬石，乾薑，附子炮去皮臍，龍骨，當歸各三兩。蒲黃，防風，禹餘糧各二兩。人參一兩。右十五味，治下篩，以溫酒未食服方寸匕，日三，不知稍加。

⑤又方 治崩中去血實時不止，大有起死之力。

赤馬蹄汁一升取新馬屎絞取乾者水浸絞取 生艾葉 阿膠各二兩 當歸 乾薑各二兩 好墨半兩 右  
咬咀以水八升酒二升煮取三升去滓內馬通汁及膠微火煎取二升分再服相去如人行十里久

⑤馬蹄屑湯 治白漏不絕。

白馬蹄，赤石脂各五兩。禹餘糧，鰾鱧骨，龍骨，牡蠣各四兩。白殭蠶一兩，附子，乾地黄，當歸各  
三錢。甘草二兩。右咬咀以水二斗煮取九升分六服日三。

⑥馬蹄圓 治白漏不絕。

白馬蹄，禹餘糧各四兩。龍骨三兩，鰾鱧骨，白殭蠶，赤石脂各二兩。右爲末，蜜丸梧子大酒服十九，不  
知加至三十九。

⑦慎火草散 治女人漏下。

慎火草十兩熬黃，當歸，鹿茸，阿膠各四兩。龍骨半兩。右爲末，先食用酒服方寸匕，日三。

⑧蒲黃散 治漏下不止。

蒲黃半升，鹿茸，當歸各二兩。右治下篩，酒服五分匕，日三。不知，稍加至方寸匕。

⑨獨聖散 婦人良方下 治肝經有風血崩。

防風去蘆。右爲末，每服二錢，空心食前，酒煮白麪清飲調下，更以麪作糊酒投之，極驗。

⑩四君子湯 氣血俱虛之證，用此加減。

人參，白朮，茯苓各二錢，甘草炙一錢。右薑棗水煎服。

⑪六君子湯 治同上。

人參，白朮，茯苓各二錢，甘草炙八分，陳皮，半夏各一錢。右薑棗水煎服。

⑫八珍湯 治氣血俱虛。

牡蠣，伏龍肝，赤石脂，白龍骨，桂心，鰾鱧骨，禹餘糧，各等分。右治下篩，空心酒服方寸匕，日二服。一方無白龍骨以粥飲服。如白帶者，加牡蠣、龍骨、鰾鱧骨。如赤多者，加赤石脂、禹餘糧。如黃多者，加伏龍肝、桂心。

鹿茸，阿膠，各三兩。鰾鱧骨，當歸，各二兩。蒲黃一兩。右治下篩，空心酒服方寸匕，日三夜再。

⑤又方 芎藭湯 治帶下漏血不止。

川芎，乾地黃，黃芪炙，白芍藥，吳茱萸，甘草，各二兩。當歸，乾薑，各三兩。右咬咀，以水一斗，煮取三升，分三服。若月經後因有赤白不止者，除地黃、吳茱萸，加杜仲、人參各二兩。

⑥又方 治漏下去黑。

乾漆，麻黃，細辛，桂心，各一兩。甘草半兩。右治下篩，以指撮著米飲中服之。

⑦又方 治漏下去黃。

黃連，大黃，桂心，各半兩。黃芩，乾地黃，蟾蟲，各六銖。右治下篩，空心酒服方寸匕，日三。

⑧又方 治漏下去赤。

白朮二兩，白薇半兩，黃蘗二兩半。右治下篩，空心酒服方寸匕，日三。

⑨又方 治漏下去青。

大黃，黃芩，白薇，各半兩。桂心，牡蠣，各六銖。右治下篩，空心酒服方寸匕，日三。

⑩又方 治漏下去白。

鹿茸一兩，白蘇十八銖，狗脊半兩。右為末，空心米飲服方寸匕，日三。

白蘇十八銖，狗脊半兩。右為末，空心米飲服方寸匕，日三。

厚者。右爲末，蜜丸，梧子大，每服七八十九，滾湯下。

⑤獨參湯 治元氣虛弱惡寒發熱等證。

人參二兩或三四兩，炮薑五錢，右作一劑水煎，徐徐服，蓋人參性滯，故薑佐之。如不應，急加炮附子。

⑥黃芪當歸人參湯

東垣下同

治經水暴崩不止，掌中寒脈沉細而緩，間而沉數，九竅有不利，四肢無力，上喘氣短促，口鼻氣皆不調，皆由平日心氣不足，飲食不節得之。

黃連一分，生地黃三分，炒神麴，橘皮，桂枝，各五分。草豆蔻仁六分，麻黃不去節，黃芪炒，人參各

一錢。杏仁五箇，另研如泥，當歸身一錢五分。右咬咀作二服，水二大盞半，煎麻黃令沸，去沫，煎至二盞，入諸

藥同煎至一盞，於巳午之間，食消盡服之一服立止。

⑦龍腦雞蘇丸 治血帶五淋血崩等疾。

薄荷一斤，麥門冬去心一兩，甘草一兩半，生乾地黃六兩，黃芪，新蒲黃，阿膠炒，黃連，人參，木通，各一兩。柴胡二兩，同木通沸湯，浸一日夜，絞取汁。右爲細末，好蜜二斤，先煉一二沸，然後下生地黃末，不住

手攪，時加木通柴胡汁，浸熬成膏，勿令火緊，焦了然後將衆藥末和丸如豌豆大，每服二十九，白湯下。一方以車前子湯下便妙。

⑧黃芪膏子煎丸 治同上。

人參，白朮，各一兩半。柴胡，黃芩，各一兩。白芷，知母，甘草炙，各半兩。鼈甲一箇，半手大者酥炙。右爲細末，用黃芪膏子九桐子大，每服三五十九，百沸湯下，空心服。

⑨黃芪膏熬法

黃芪半斤。右爲粗末，水二斗，熬一斗，去滓再熬，令不住攪成膏，至半斤入白蜜一兩，錫一兩再熬，令蜜錫熟，得膏

人參，白朮，茯苓，各二錢。甘草炙，芍藥炒，川芎，當歸酒拌，各一錢。熟地三錢自製。右水煎服。

⑤加味逍遙散 治婦人肝脾虛血崩，用此加減。

甘草炙，當歸炒，白芍藥酒炒，白朮土炒，茯苓，各一錢。柴胡，丹皮，山梔炒，各五分。右水煎服。

⑥歸脾湯 治脾經失血少寐，發熱盜汗，或思慮傷脾，不能攝血，以致妄行，或憂思傷脾，血虛發熱，或

肢體作痛，大便不調，或經候不准，晡熱內熱。

人參，白朮炒，黃芪炒，白茯苓，酸棗仁炒，龍眼肉，當歸身，遠志，各一錢。甘草炙，木香，各五分。

右薑棗水煎服。

⑦小柴胡湯 治肝膽經證，寒熱往來，潮熱晡熱，身熱默默不欲飲食，或怒，火口苦耳聾，欬嗽發熱，脅

下作痛，甚者轉側不便，兩脅痞悶，或瀉痢欬嗽，或吐酸食苦水，皆用此藥主之。

柴胡二錢，黃芩炒一錢，人參，半夏，各七分。甘草炙五分。右薑水煎服。

⑧附子理中湯 治陽氣大虛血崩諸證。

人參，白朮土炒，乾薑炮，甘草炙各等分。附子炮隨宜。右每服五七錢，或一兩，水煎服。

⑨捕中益氣湯 治元氣虛損，或因剋伐惡寒發熱，倦怠少食，或不能消散生肌，或兼飲食勞倦，煩熱

作渴。

黃芪炒，人參，白朮炒，炙草，當歸各一錢。陳皮五分，柴胡，升麻，各三分。右薑棗水煎，空心午前服。

⑩十全大補湯 治氣血大虛。

人參，白朮，茯苓，各二錢。甘草炙，芍藥炒，川芎，當歸各一錢。熟地三錢，黃芪炙，肉桂各隨宜。

右煎服。

⑤墨附丸 治血虛崩久不止。

四製香附一斤，白茯苓，當歸，人參，川芎，熟地，徽墨火煨紅酢，各一兩。木香五錢，淨蘇艾四兩，用酢一碗，煮香附與艾二味至乾，石臼搗爛，捏成餅子，新瓦焙乾。右為末，酢糊丸，梧子大，每七八十九酒下。

⑥內灸散 治血崩虛憊，腹脅疼痛，氣逆嘔吐，冷氣凝積，塊硬刺痛等證。

藿香葉，丁香皮，茴香，肉桂，熟地，各兩半。甘草，當歸，白朮，山藥，白芷，各八兩。陳皮四兩，藜本，乾薑，川芎，黃芪，白芍，木香，各一兩。右為末，溫酒調服三錢，或薑艾煎服亦可。

⑦補陰丸 治虛火血崩。

熟地五兩，黃蘗，知母，龜板，各三兩。瑣陽，天門冬，枸杞子，白芍，各二兩。五味子一兩，炒黑乾薑三錢，寒月加五錢。右為末，豬脊髓和蜜丸，梧子大，每七八十九，空心鹽湯下。寒月溫酒下。一方以肉桂易黑薑引諸藥入腎，為從治法也。

⑧大烏雞丸 治血崩久虛，不能成胎。

四製香附一兩，熟地四兩，生地，當歸，白芍，人參，各三兩。川芎，龜甲，各三兩半。白朮，黃芪，牛膝，柴胡，牡丹皮，知母，貝母，各二兩。茯苓二兩半，秦艽一兩半。川黃連，地骨皮，乾薑，延胡索，各一兩。白毛烏骨雄雞一隻，閉死，去毛腸淨，用艾葉青蒿各四兩，裝一半在雞腹內，將雞并餘艾蒿同入罈內，以童便和水浸過雞二寸許，煮爛取出，去骨焙乾。右為末，和勻，雞汁打糊丸，梧子大，每五六十丸，溫酒或米飲下，忌煎炒芻菜。如有筋骨疼痛，去肉用骨。如月水先期，加黃芩黃連，地骨皮。如月水後期，加參朮黃芪。如白帶加二朮香附升麻白芷柴胡。其雞如得白絲毛烏骨崇冠者尤妙。須另於一處，以黃芪炒末為丸，喂之，不可近雌雞。



十兩，放冷丸藥。

⑤易簡芎歸湯 一名古芎歸湯，治崩中去血。

芎藭，當歸，各等分。右咬咀水煎熱服。若崩中漏下，失血不止，加香附子炒。每兩入甘草一錢，沸湯點服。若有白帶者，加芍藥半兩，乾薑等分，米飲調下。

⑥涼膈散 治血熱暴崩。

連翹四兩，大黃，甘草，黃芩，薄荷，朴硝，山梔，各一兩。右粗末，每服三五錢，水一盞，入蜜竹葉，煎三五沸，去滓溫服，無時。

⑦黃連解毒湯 治同上。

黃連，黃蘗，黃芩，大梔子，各等分。右剉為麻豆大，每服五錢，水二盞，煎至八分，去滓溫服。

⑧酢附丸 治崩漏帶下，積聚癥瘕，臍腹疔痛。

香附子不拘多少，擦去毛，用好酢煮，出焙乾。右酢煮糊為丸，如桐子大，每服三十九，米飲送下。

⑨芎歸膠艾湯 一方用香附子白芷為丸。一名膠艾四物湯，治婦人陷經漏下。

川芎，阿膠，甘草，各二兩。芍藥四兩，艾葉，當歸，各三兩。熟地隨宜。右七味以水五升，清酒三升，合煮取三升，去滓內膠，令消盡，溫服一升，日三服。不差更作。一方加乾薑一兩。

⑩百子附歸丸 入門下同 養血順氣，調經安胎，崩漏日久不止，胎前產後，及月事參差有餘不足諸證，悉治。

四製香附十二兩，阿膠，艾葉，四物湯，各二兩。右為末，用石榴陳久者一枚，連皮搗碎煎，水打糊丸，梧子大，每百丸，空心淡酢湯下。

羌活，藜蘆，防風各二錢。白朮，當歸，黃芪，柴胡各三錢。桃仁十枚。右分作四貼，空心水煎服。如夏月不用肉桂。

⑤五種散 風冷血崩減用之。

白芷，川芎，芍藥，甘草，茯苓，當歸，肉桂各三分。陳皮，麻黃各六分。厚朴，乾薑各四分。桔梗一分半。枳殼炒五分。半夏二分。蒼朮七分半。右煎服。

⑥不換金正氣散 治風冷血崩。

厚朴，陳皮，藿香，半夏，蒼朮各一錢。甘草五分。右薑三片，棗二枚，水煎溫服。

⑦升陽除濕湯 治濕盛血崩。

蒼朮一分，升麻，柴胡，防風，神麴，澤瀉，豬苓各五分。陳皮，甘草，麥芽各三分。右薑棗煎服。

⑧橘歸丸 治血崩不止。

橘皮四兩，當歸三兩。右爲末，蜜丸梧子大，每五十九丸溫酒下。一方加延胡索。

⑨黑神散 治婦人崩漏。

百草霜，白芷各等分。右爲末，每二錢，水煎，入童便米酢少許調服。

⑩女金丹 治崩中淋瀝及赤白帶下。

白芍，當歸，川芎，人參，白朮，茯苓，藜蘆，白芷，白薇，桂心，延胡索，牡丹皮，赤石脂各一兩。

俱用酒浸三日夜曬乾。沒藥，甘草各五錢。香附一斤酢浸。右爲末，蜜丸梧子大，每五十九丸溫酒下。

⑪二宜丸 血崩後調養用此加減。

當歸，生地黃各等分用酒蒸七次。右和煉蜜搗丸梧子大，每七十九丸，空心酒下。

⊗小烏雞丸 治同上。

吳萸，良薑，白薑，當歸，芍藥，延胡索，破故紙，川椒，陳皮，青皮，劉寄奴，生地，莪朮，川芎，各一兩。荷葉灰四兩，北艾二兩，烏雞肉。右爲末，用烏雞肉煮爛爲丸，梧子大豆淋酒調綿灰下五十九。

如腹痛血黑色者，加炒黃連。如有痰濕，加南星蒼朮香附。如赤帶，茶清下。如腸風，陳米飲調百草霜下。如

心痛，菖蒲酒下。如漏胎下血，烏梅酒下。如耳聾，臘茶清下。如腰痛，當歸酒下。如頭風，薄荷煎湯下。如

血風眼黑，甘草煎湯下。如生瘡，生地黃煎湯下。如身體疼痛，黃芪末調酒下。如氣塊血塊作痛，與葱白湯間

服。如胎前產後白痢，乾薑煎湯下，赤痢，甘草煎湯下，一切百病，酢湯下。

⊗芩心丸 治脾濕下流於腎，與相火合爲濕熱，迫經下漏，紫黑腐臭。

條芩二兩，用酢浸七日，炙乾，又浸又炙，如此者七次。右爲末，酢糊丸，梧子大，每七十九，溫酒下。

⊗四物坎離丸 治同上。

生地一兩半，熟地同酒浸搗膏，當歸二兩，芍藥一兩半，酒炒，知母，黃蘗各一兩，酒浸炒，側柏葉，槐

子，各一兩同炒。連薊六錢。右爲末，蜜丸，梧子大，用磁盤盛之，以綿紙糊口，涼地下放七日，去火毒，曬乾收之。每

三四十丸至五六十丸，白湯或酒下。

⊗固經丸 治同上。

黃芩，白芍，龜板，各一兩，椿根皮七錢，黃蘗三錢，香附二錢半。右爲末，酒糊丸，梧子大，每五十九，酒下。

⊗升陽調經湯 治飲食勞倦，暴崩不止，或下水漿，怠惰嗜臥，四肢困倦，及夏月帶下，脫漏等證。

獨活五分，蔓荊子七分，當歸，防風，甘草，升麻，藜蘆各一錢，柴胡，羌活，蒼朮，黃芪各錢半。

右空心水煎服，以飯壓之。

右空心水煎服，以飯壓之。

桂枝三錢，甘草一錢，白芍三錢，右薑棗煎服。

⑤理中湯 古方治血崩，間用此加減以燥水健脾。

甘草一錢半，人參、白朮、乾薑各二錢，右薑棗煎服。

⑥益母膏 治漏血。

益母草，端午日採紫花方莖者，連根洗淨。右於石臼內搗爛，以布濾取濃汁，入砂鍋內文武火熬成膏，如砂糖色為度，磁罐收貯。每服一匙，棗湯調下。一方用益母草陰乾，忌鐵為末，蜜丸彈子大，每服一丸，棗湯下。

⑦二聖湯 醫鑑下同 治血崩如神。

何首烏切五錢，甘草三錢。右用黃酒一椀煎至八分，取出入刺刺芽汁一盞，同服立效。

⑧黑龍丸 專治血崩及經水過多不止者，尤效。

黑驢糞燒存性。右為末，用麪糊為丸，每服七十九，空心黃酒送下。

⑤補中益氣湯 治崩漏後脾胃虛弱。 羌活一錢， 防風， 藁本各七分， 甘草五分， 黃連， 黃芩各三分， 人參五分， 黃芪七分， 右煎服。

⑥平補鎮心丹 治婦人白崩。 茯苓， 茯神去木， 五味子， 車前子， 肉桂， 麥門冬各一兩二錢半， 遠志， 山藥， 天門冬， 熟地各二兩半， 酸棗仁二錢半， 龍齒二兩半， 人參， 朱砂各五錢， 右為末蜜丸梧子大每三十九丸米飲下。

⑦白芷散 治崩中帶下。 白芷一兩， 海螵蛸煨二箇， 胎髮燒灰一箇， 右為末， 每二錢酒調服。 一方用白芷六兩， 以石灰半斤， 淹三宿， 洗去灰， 將白芷炒焦， 入椒目四兩， 或加茜根少許為末， 粥丸服， 治崩中白帶。

⑧甯神膏 治血崩後心神不安。 乳香， 辰砂水飛各五錢， 酸棗仁， 人參， 茯苓各一兩， 琥珀七錢半， 右為末， 燈心棗子煎湯調服一錢， 或蜜丸彈子大， 薄荷煎湯化服一丸。

⑨滋陰甯神湯 治同前。 當歸， 川芎， 白芍， 熟地， 人參， 茯神， 白朮， 遠志各一錢， 酸棗仁， 甘草各五分， 黃連酒炒四分， 右煎服。 如有痰， 加南星一錢。

⑩大溫經湯 治崩中去血過多， 及月事不調。 阿膠， 芍藥， 川芎， 當歸， 人參， 牡丹皮， 肉桂， 吳萸， 甘草各二分， 半夏二分半， 麥門冬五分， 右薑煎服。

⑪烏藥湯 治陽氣內動， 發則心下崩， 數澀血。

# 欽定古今圖書集成醫部全錄

## 醫部彙考三百九十六

### 婦人崩漏門二

#### 方二

㊟斷源散 醫鑑下同

治血崩如泉流不止。

棉花子銅器炒盡烟。

右爲末，每服二錢，空心黃酒調下。

㊟荊芥四物湯

治崩漏初起不問虛實服之立止。

荊芥，

條芩，當歸，川芎，

白芍，生地，

香附。

右剉水煎溫服。如不止，加防風升麻蒲黃炒白朮。一方加地

榆良驗。一方加艾葉炒阿膠炒，去香附荊芥。

㊟子芩丸

治婦人四十九歲已後，天癸當住，每月却行，或過多不止，漸成崩漏。

條芩四兩，

酢浸紙裏煨七次。當歸二兩酒洗。

右爲末，酢糊爲丸如梧桐子大，每服五七十九，空心霹靂酒下，日

進三服。一方加香附酢製二兩尤妙。

㊟當歸龍骨丸

治月事失常，經水過多不止，及帶下淋漓，無問新久，赤白諸證，并產後惡物不止。

龍骨，

黃蘗各一兩，

當歸，

白芍，

白茯苓，

槐子，

艾葉炒，

黃連各五錢，

木香二錢半。

右爲末水丸梧

圖書集成醫部全錄 卷三百九十五 彙考三百九十五 婦人崩漏門一

二八

③加減十全大補湯 治血崩氣血虛者  
十全大補去桂 炮黑乾薑 阿膠珠分兩隨宜 右煎服。

④五灰散同春 治一切失血及血崩。

蓮蓬殼，黃絹，亂髮，百草霜，櫻欄皮，各燒存性等分。梔子炒黑，蒲黃炒，松煙墨，血竭。右共爲細末，每三錢，以生藕汁生蘿蔔汁調服之。或蜜丸米飲下五十九丸，亦可。

⑤解毒四物湯入門 一名溫清飲，治崩漏而黃腹痛。

黃芩，黃連，黃蘗，梔子，生乾地黃，當歸，白芍藥，川芎，各一錢。右剉作一貼，水煎服。此方乃黃連解毒湯與四物湯合劑也。

⑥楊氏家藏黑金散 治婦人血氣虛損，經候不調，崩中漏下。

鯉魚皮一兩，黃牛角腮，櫻欄皮，破故紙，亂髮各一兩，鱈魚骨，乾薑炮，熟地黃，當歸洗焙，木賊各半兩。右剉拌入磁瓶內，鹽泥固濟候乾，炭火五斤煨通赤，烟盡埋土內令冷，取研細，每三錢入麝香少許，米飲空心調下。

⑦萬靈膏藥醫寶 治元氣虛弱，女人赤白帶下，子宮虛冷，血山崩等證，貼丹田，一百二十手。

香油四斤，白芷，赤芍，大黃，黃連，白芍，兩頭尖，草烏，元參，川芎，生地，川椒，胎髮頭生男者，穿山甲，熟地，杏仁，槐角，黃蘗去粗皮，各一兩。木鼈子五十箇去殼，歸尾二兩，黃香十二兩，化開傾米泔內九次。黃丹二斤，飛過焙乾，蓖麻子一百二十粒去殼，巴豆一百二十箇去殼。右各咀片，入油內浸，春五日，夏三日，秋七日，冬十日，取傾鍋內，熬枯黑色，濾去渣，將淨油入鍋，文武火熬，滴水成珠，方細退火，徐徐下黃丹，以槐柳桃杏楮各二枝，不住手攪，再下黃香，去火少冷，又下細藥攪勻，將好瓶貯之，放水內浸一七出火氣，



子大，每七八十九，米湯送下。一方加黃芩白朮各五錢，累效。

⑤獨行散 一名五靈脂散，一名抽刀散，治腹痛經漏不止。

五靈脂半生半炒。右為末，童便下二錢。

⑥白礬丸 治久崩不止，用此澀之。

白礬，黃狗頭骨燒灰各四兩。香附二兩。右為末，粥丸桐子大，每服三十九，空心白湯下。

⑦又方 治暴崩下血。

蠶沙炒，阿膠各一兩。伏龍肝半兩。右為末，溫酒調下，空心二三錢，以止為度。

⑧震靈丹 一名紫金丹，治婦人氣血不足，崩漏虛損，帶下虛冷，胎臟無子。

硃砂飛一兩，滴乳香另研，五靈脂去沙石，沒藥去沙石各二兩，紫石英，再餘糧火煨，酢淬不計遍數，手

撚得碎為度。代赭石炮製同上。赤石脂。以上四味各四兩，並作小塊，小鍋內鹽泥固濟，候乾用炭十斤煨通

紅火盡為度，入地理出火毒二宿。右共為細末，以糯米粉煮糊為丸，如雞頭實大，曬乾出火。每一丸空心酢湯下。

如有孕不可服。

⑨三灰散 治血崩。

乾側柏略焙五錢。桐子炭再燒作灰二錢。椶櫚燒存性，勿令化作白灰三錢。右為末，分作二服，空心糯米飲

調下。

⑩全生活血湯 東垣 治血崩太多，昏冒瞑目，無所知覺。

白芍藥，升麻各一錢。防風，羌活，獨活，柴胡，歸身，葛根，甘草各七分。蔓荊子，細莘各三分。

紅花一分，藜本，川芎各五分。生地黃，熟地黃各四分。右剉作一貼，水煎服。

不止身熱悶亂，惡見飲食，亦不思食，沉困懶倦，四肢無力，大便時瀉，後復因心氣不足，其經脈再下，不止，惟覺氣下脫，其元氣逆上，全無，惟覺心腹中氣不行，氣短則不能言，是無力以言，非懶語也。此藥主之。

黃芪一兩半，白朮、蒼朮泔浸去皮，歸身、白芍各五錢。甘草炙，生地各三分。熟地、陳皮去白各五分。柴胡二分。右十味爲粗末，作二服，水煎去滓，熱服，空心一服之後漸減，次日諸證悉去，頓喜飲食。所以者何？蓋氣通而聞飲食之香故也。

⑤ 柏子仁湯 治婦人憂思過度，勞傷心經，不能藏血，遂至崩中下血不止。

柏子仁炒，香附炒去毛，鹿茸燎去毛，酒蒸焙，芎藭，茯神去木，當歸各一錢半。阿膠炒珠，小草各一錢。續斷二錢，甘草炙半錢。

⑥ 益胃升陽湯 治血崩，用此生血納穀。

黃芪、黃芩各二錢。人參、神麴炒各錢半。升麻、柴胡各五分。白朮三錢。當歸身酒浸，甘草炙，陳皮各一錢。右爲粗末，每服三錢或五錢，食添再加之。食減三錢內更減之，不可多服。每服二錢，水煎去滓，熱服，不拘時候。如腹痛，每服加白芍藥二分，中原本缺三字。如渴口乾，加乾葛二分。如嗽，去人參。一方用生地。如服此不止，却服後方柴胡調經湯，大舉大升之。

⑦ 柴胡調經湯 治經水不止，鮮血，項筋急，腦痛，脊骨強痛，不思飲食。

羌活、獨活、藁本、升麻各五分。蒼朮一錢。柴胡根七分。葛根、當歸身、甘草炙各三分。紅花少許。右咬咀，作一服，水煎去滓，稍熱，空心服，微汗立止。

⑧ 調經升陽除濕湯 一名升陽除濕湯，治女子漏下惡血，月事不調，或暴崩不止，多下水漿之物，怠

用時放滾水內頓化，攤開細藥列後。珍珠五錢，阿魏，丁香，沉香，各一兩。麝香，血竭，兒茶，乳香，沒藥，各三兩。琥珀三錢。右各為末，入前膏內。

③ 繭黃散 治婦人血崩

繭黃，蠶蛻紙並燒存性，晚蠶沙，白殭蠶並炒，各等分。麝香少許。右為末，每服二錢，用米飲送下，日三服，甚效。

④ 固經丸 治陰崩不止

艾葉酢炒，鹿角霜，伏龍肝，乾薑，各等分。右為末，鎔鹿角膠和藥，乘熱丸，食後淡酢湯下五十九。

⑤ 旋覆花湯 治半產漏下，脈弦而大

旋覆花三兩，葱十四莖，新絳少許。右三味，以水三升，煮取一升，頓服之。

⑥ 半夏丸 直指方 治下血吐血，崩中帶下，痰喘急滿，虛腫亦消，宿痰百病。

圓白半夏刮淨，搥匾薑汁調飛，白麪作餅包，炙黃色，去麪取半夏。右作末，米糊為丸，菉豆大，每服十九，溫熱水下。又云芎歸湯沉香降氣湯各半煎送下，止血之要藥。

⑦ 備金散 治婦人血崩不止

香附四兩炒，當歸尾一兩二錢，五靈脂二兩炒。右為細末，每服五錢，酢湯調，空心服，立效。

⑧ 縮砂散 治血崩

縮砂仁不拘多少，於新瓦上炒香。右為細末，米飲調下三錢。

⑨ 涼血地黃湯 治婦人血崩不止，腎水陰虛，不能鎮守，包絡相火，故血走而崩也。

生地黃，當歸尾各五分，黃連，黃蘗，知母，蘗本，川芎，升麻各二分，紅花少許，柴胡，防風，羌

延胡索，瞿麥穗，當歸，乾薑，丹皮，各一兩。石膏二兩，桂心，威靈仙，各七錢半。蒲黃半兩，右爲細末，每服三錢，水一盞半，空心溫服，日二。

③又方 治崩中下血不止，小腹痛。

芍藥一兩炒黃，柏葉六兩微炒。右用水一升，煮取六合，入酒五合，煎取七合，空心，分爲二服。一方爲細末，酒調二錢。一方有鹿角膠等分，酒調，治白帶臍腹痛。

③立效散東垣 治血崩。

當歸，蓮花葉，白繇子，紅花，各一兩。右剉紙包鹽泥固濟，火煨存性爲末，入麝香少許，每二錢，溫酒調下空心。

③牡蠣散準繩下同 治月水不止，衆藥不愈者。

牡蠣火煨研細，用酢調成丸，再煨過通紅，候冷研細，出火毒。右用酢調艾末，熬成膏，和丸如梧子大，每服五十九，酢艾湯下。

③柏黃散 療經血不止。

黃芩一兩二錢半，側柏葉，蒲黃，各一兩。伏龍肝二兩。右咬咀，水二升，煮取八合，分爲二服。

③丁香膠艾湯 治崩漏不止，蓋心氣不足，勞役及飲食不節，所得經脈少時，其脈兩尺俱弦緊而洪，按之無力，其證自覺臍下如冰，求厚衣被以禦其寒，白帶白滑之物雖多，間下如屋漏水，下時有鮮血不多，右尺脈時微洪，屋漏水多暴下者，是急弦脈爲寒多，而洪脈時見乃熱少，合而言之，急弦者，北方寒水多也，洪脈時出者，命門包絡之火也，黑物多，赤物少，合成屋漏水之狀也。

川芎，丁香，各四分。熟地黃，白芍藥，各三分。阿膠炒六分，當歸身一錢二分，生艾葉一錢。右爲細末，

嗜臥四肢不收，因倦乏力，氣短上衝，其脈緩而弦，急按之洪大，皆中指下得之。從權服此藥，愈後宜補氣和血。

柴胡，防風，甘草炙，蘘本，升麻各一錢，羌活，蒼朮，黃芪各一錢半，蔓荊子七分，獨活，當歸酒

浸各五分。右咬咀，水五大盞，煎至一大盞，去滓稍熱服，空心服藥，畢待少時以早膳壓之，可一服而已。

⑤加減四物湯 治室女二七天癸至，亦有當時未至而後至者，亦有卒然暴下淋瀝不止，有若崩漏者，失血過多，變生諸證，悉宜服之。

川芎，熟地黃，當歸酒焙，白芍藥各一兩，香附子炒一兩半。右咬咀，每服四錢，水一盞半，生薑五片，煎至七分，去滓，食前溫服。如血色鮮而不止者，去熟地黃，加生地黃煎服。

⑥地黃丸 治足三陰虧損，經行數日不止，或兼帶下無子。

熟地黃，山茱萸肉，蕪荑仁，白芍藥微炒，代赭石各一兩，乾薑炮，白殭蠶炒，厚朴薑製各三錢。右為末，蜜丸桐子大，每服五十九丸，空心溫酒下，日三服。

⑦小薊湯 治崩漏不止，色明如水，得溫則煩悶者，此陽傷於陰，令人下血，當補其陰。脈數疾小者順，大者逆。

小薊莖葉研取汁，生地黃研取汁，各一盞。白朮半兩，剉。右三件，入水一盞，煎減一半，去滓溫服。

⑧芎藭酒 治崩中晝夜不止，醫者不能治。

芎藭一兩，生地黃汁一盞。右用酒五盞，煮芎藭一盞，去滓下地黃汁，再煎二三沸，分為三服。

⑨奇效四物湯 治有熱久患血崩。

全當歸，白芍藥，川芎，熟地黃洗焙，艾葉，阿膠蛤粉炒珠，黃芩去黑者各半兩。右剉碎，每服四錢，水

⑤鹿茸丸 治經後過多，其色瘀黑，甚者崩下，吸吸少氣，臍腹冷極，則汗出如雨，尺脈微小，由衝任虛衰，為風冷客乘，胞中氣不能固，更宜灸關元穴。

鹿茸去毛酥炙，赤石脂製，禹餘糧製，各一兩。艾葉，柏葉，附子炮，各半兩。熟地黃，當歸，續斷，各二兩。右為細末，酒糊和丸，梧子大，每服三十九，空心溫酒下。一方煉蜜丸亦可。一方無艾葉。

⑥赤龍丹 治崩中不止。

禹餘糧炒，鶴鰓骨，鹿茸，龍骨，石燕煨，阿膠，當歸，乾薑，各等分。右為末，酒酢糊和丸，每服五十九，溫酒下。

⑦紫金散 治月水過多，崩漏帶下，淋瀝不斷，腰腹重痛，一切五色帶疾。

禹餘糧煨赤酢淬七次，細研水飛，搗乾，秤三兩。白芍藥，川芎，熟地，附子，當歸，赤石脂，龍骨並煨，各一兩，別研。乾薑炮，肉桂，各半兩。右為細末，每服二錢，入麝香少許，米飲空心調下。

⑧白芷煖宮丸 煖血海，實衝任，治子宮虛弱，風寒客滯，斷緒不成孕育，及數墮胎，或帶下赤白，漏下五色，虛弦少氣，胃腹滿痛，心下煩悸，自汗下血過多。

禹餘糧製一兩，乾薑炮，芍藥，川椒製，白芷，阿膠蛤粉炒，艾葉製，川芎，各七錢半。右為細末，蜜和丸，梧子大，每服四十九，米飲溫酒酢湯任下。

⑨琥珀散 一名烏紗帽散，治暴崩不止。

烏紗帽，即漆紗頭巾，赤芍藥，香附子，枯荷葉，男子髮皂，菟水，洗，當歸，櫻欄燒焦，存性，各等分。右除櫻欄外，其餘並用粗片，新瓦上煨成黑灰，存性，共為細末，每服五錢，空心童便調下，如人行十里，再一服，七八服即止。

若產後血去多，加米酢京墨麝香少許。

作一服，水二盞，煎至五沸，去滓入膠艾，再上火煎至一大盞，空心宿食消盡，帶熱服，三服效。

㊟又方 治血崩

熟艾如雞子大，阿膠半兩，乾薑一錢。右為粗末，用水五盞，先煎艾葉薑至二盞半，入膠消溫，分二服，空心服。

㊟芎藭湯 一名芎藭溫中湯，治帶下漏血不止，及風虛冷熱，勞損衝任，月水不調，崩中暴下，腰重裏

急，淋漓不斷，及產後失血過多，虛羸腹痛，或妊娠胎動不安，下血連日，小便頻數，肢體煩倦，頭運目暗，不欲飲食。

芎藭，黃芪炙，白芍藥，乾地黃，吳茱萸，甘草，各二兩。當歸，乾薑，各一兩。右咬咀，以水一斗，煮取三升，分三服。若月經後，因有赤白不止者，除地黃茱萸，加杜仲人參各二兩。

㊟斷下湯 治衝任氣虛，崩中漏下，經脈不調，每遇月候將來，臍腹腰脚先痛，漸減飲食，四肢乏力，及

帶下三十六疾，悉能療之。

人參去蘆，熟地黃洗焙，艾葉酢炒，各一兩。鷓鴣骨燒灰，當歸酒洗，各二兩。乾薑炮半兩，川芎七錢。阿膠蛤粉炒成珠七錢半。右咬咀，每服五錢，水一盞半，煎至七分，去渣，食前溫服。

㊟又方 治崩漏

四物湯一兩，人參二錢，吳茱萸一錢。右剉碎，每服半兩，薑棗煎服，食前五六服。寒熱腹痛皆退，崩漏未止，續服後熟附丸。

㊟熟附丸 治崩漏

熟附子，木賊，龍骨煨，赤石脂煨，各半兩。川芎，當歸，各一兩。右為細末，酢糊為丸如梧子大，每服五六十九食前米飲下。

寒濕 按龍肝爲去濕止血之聖藥，先賢治崩用旋覆花半夏，治膈間濕痰而崩止者，亦此意。

⑤鹿茸散 治崩中漏下不止，虛損羸瘦。

鹿茸二兩，去毛塗酥炙微黃。白龍骨，熟地黄，鼈甲酥炙令黃去裙，鰾魚骨炙黃，白芍藥，白石脂，續斷各一兩。肉蓯蓉一兩半，酒浸一宿，刮去皺皮炙乾。右爲細末，每服二錢，食前粥飲調下。

⑥柏葉散 治婦人崩中漏下，不問年月遠近，漸至黃瘦，四肢無力，腹內疼痛，不思飲食。

柏葉，續斷，川芎，生地黄，當歸，龜甲，鼈甲各一兩半。禹餘糧二兩半，阿膠，牡蠣，地榆，赤石脂，艾葉，鹿茸各一兩。右爲細末，每服二錢，食前粥飲調下。一方有丹參，加鹿茸，煉蜜和丸如梧子大，每服三四十丸，空心用溫酒送下，或酢湯亦可。

⑦補宮丸 治婦人諸虛不足，久不妊娠，骨熱形瘦，崩中帶下。

白薇，牡蠣，白芍藥，鹿角霜，山藥，茯苓，白朮，鰾魚骨，白芷各等分。右爲細末，麪糊和丸如梧子大，每服五十九丸，空心用米飲送下。

⑧鎮宮丸 治婦人崩漏不止，或下五色，或赤白不定，或如豆汁，或狀如豚肝，或下瘀血，臍腹脹痛，頭

暈眼花，久而不止，令人黃瘦，口乾，胃煩不食。

代赭石火煨酢淬，紫石英，禹餘糧製並同上，香附酢煮各二兩。陽起石火煨細研，蒲黃炒，鹿茸燎去毛酢蒸焙，阿膠剉碎蛤粉炒成珠，茯神，當歸酒浸，芎藭各一兩。血竭半兩研。右爲細末，用艾煎酢汁，煮糯米粉糊丸如梧子大，每服七十九丸，空心米飲下。

⑨梅飲子 治婦人血崩。

鹽白梅燒灰存性。右爲末，空心米飲調下。



⑤荊芥散 治婦人崩中不止。

好麻油點燈，多著燈心，就上燒荊芥焦色。右為細末，每服三錢，童便調下。

⑥開鬱四物湯 正傳 治崩漏多因心氣所使而下，故貴奪勢，先富後貧皆是也。

香附米炒，當歸身，白芍藥酒炒，熟地黃，白朮各一錢。川芎，黃芪，蒲黃炒，地榆，人參各五錢。升麻三分。右剉作一貼煎服。

⑦烏金散 準繩下同 治血崩不止。

棕櫚燒存性一兩。龍骨煨過二錢。右為細末，研勻，每三錢，空心好酒調服，二服立止。

⑧又方 治患崩中不止，結作血片如雞肝色碎爛。

芎藭十二分，阿膠，青竹茹各八分。續斷，地榆，小薊根各三分。當歸六分，生地黃，伏龍肝各十一分。右用水九盞，煮取三盞，去渣，分三服。

⑨無比散 治婦人血崩。

蠶砂一兩炒，伏龍肝半兩。右同為末，溫酒調，空心服二三錢，以止為度。一方有阿膠一兩。

⑩伏龍肝散 治氣血勞傷，衝任脈虛。經云：「非時忽然崩下，或如豆汁，或成血片，或五色相雜，或赤

白相兼，臍腹冷痛，經久未止，令人黃瘦口乾，飲食減少，四肢無力，虛煩驚悸。」

伏龍肝，赤石脂各一兩。芎藭三兩，甘草，肉桂各半兩。熟地，艾葉微炒各二兩。當歸，乾薑各七錢半。麥門冬去心一兩半。右為粗末，每服四錢，棗一枚，水煎服。

⑪地榆散 治婦人崩中漏下不止。

地榆到，蒲黃，白芍藥，白茯苓，柏葉微炒，蟹爪微炒，熟地黃，鹿角膠搗碎炒令黃燥。漏蘆各一兩。

又方治崩中卒下血好墨磨酢服之。本草

又方。百草霜二錢，狗膽汁攪勻，分作二服，當歸酒下。經驗方。

又方。青礬二兩，輕粉一錢爲末，水丸梧子大，每服三四十九，食後薑湯下。本草下同。

赤白漏下，礬石火煉服之良。

婦人血崩，代赭石火煨酢淬七次爲末，白湯服。普濟方。

又方。用貫衆半兩，煎酒服之，立止。集簡方。

婦人漏下赤白不止，令人黃瘦，地榆三兩，米酢一升，煮十餘沸，去滓，食前稍熱服一合。聖惠

婦人血崩三七研末，同淡白酒調一二錢，服三服可愈，加五分，入四物湯亦可。集簡方。

又方。黃芩爲細末，每服一錢，霹靂酒下，以秤錘燒赤，淬酒中。許學士云：「崩中多用止血及補血藥，此方乃治陽

乘於陰，所謂天暑地熱，經水沸溢者也。本事方。

又方。金絲草、海桐皮、砂仁、花椒、蠶退、紙、舊錦灰等分爲末，煮酒，空心服。本草。

婦人漏下絕子，當歸煮汁飲之。本經。

崩中下血，晝夜不止，芎藭一兩爲末，清酒一大瓊，煎取五分，徐徐進之。千金。

又方。香附子、赤芍藥等分爲末，每服二錢，鹽一捻，水一瓊，煎七分，溫服，日二服，十服見效。良方。

又方。益智子炒碾細，米飲入鹽服一錢。產寶方。

下血血崩，或五色漏帶，香附子去毛炒焦爲末，極熱酒服二錢，立愈昏迷。甚者三錢，米飲下，亦可加櫻灰。本事方。

漏血欲死，雞蘇煮汁一升服之。梅師方。

血崩不止，夏枯草爲末，每服方寸匕，米飲調下。聖惠。

①又方 治崩不定，淋淫經年者。

白礬銕汁一兩，沒藥一錢，硃砂，黃丹各五分。右件將白礬銕開成汁，下餘藥細末一處，攪勻就成，丸如彈

子大，每用一丸新綿裹內陰中立效。

②十灰丸 治崩中下血不止。

錦，黃絹，馬尾，艾葉，藕節，蓮房，油髮，赤松皮，櫻欄，蒲黃，並煨成灰存性各等分。右研勻，用酢

③十灰散 治下血不止。

錦片，木賊，櫻欄，柏葉，鯉魚鱗，鯽魚鱗，艾葉，乾漆，血餘，當歸，並火煨存性各等分。麝香少許。

右研勻，每服二錢，空心溫酒調服。

④又方 治血崩屢效。

當歸，白芍藥，乾薑，櫻欄各等分。右各煨存性，研為細末，酢調，以有節朱筋，左攪四十九轉，食前服。

⑤香礬散 治血崩。

香附子不拘多少，極酸酢浸一宿，炒焦為灰存性。右每一兩入白礬末二錢，米飲調服，空心神效。一方用荷葉湯尤妙。

⑥如聖散 治血山崩。

櫻欄，烏梅肉各一兩。乾薑一兩五錢，並燒存性。右為細末，每服三錢，烏梅酒調下，空心食前服。久患，不過三服愈。

血崩不止，老絲瓜燒灰，櫻櫚燒灰，等分鹽酒或鹽湯下。良方。

崩中下血，不問年月遠近，用槐米燒存性為末，每服方寸匕，溫酒下。產寶方。

崩中不止，諸藥不效，用慙杏仁上黃皮燒存性為末，每服三錢，空心熱酒服。保壽堂方。

血崩不止，烏梅肉七枚燒存性，研末米飲服之，日三。本草。

崩中漏下不止者，核桃燒存性，研細酒服，方寸匕，日三。千金。

又方。核桃肉十五枚，燈上燒存性，研作一服，空心溫酒調下，神效。本草。

崩中帶下，椒目炒研細，每溫酒服一錢。鉤元。

血崩不止，不拘冷熱，用蓮蓬殼荊芥穗各燒灰存性，等分為末，每服二錢，米飲下。

又方。荷葉燒研半兩，蒲黃黃芩各一兩為末，每空心酒服三錢。本草。

又方。葶藶一歲一箇燒存性，研末酒服之。李氏方。

婦人漏血不止，槐花燒存性，研每服二三錢，食前溫酒下。聖惠。

血崩不止，槐花三兩，黃芩二兩為末，每服半兩，酒一盞，銅秤錘一枚，桑柴火燒紅，淬入酒內調服，忌口。乾坤謠。

下血血崩，槐花一兩，櫻灰五錢，鹽一錢，煎減半服。摘元方。

婦人崩中，晝夜不止，丁香二兩，酒二升，煎一升，分服。梅師方。

崩中赤白，不問遠近，取槐枝燒灰，食前，酒下方寸匕，日三服。本草下同。

崩中帶下，訶黎勒和蠟燒烟熏之，及煎湯熏洗。

婦人血崩，唐棣皮即扶也半斤，牡丹皮四兩，升麻牡蠣煨各一兩，每用一兩，酒二鍾，煎一鍾，食前服。續簡方。

又方。蠶沙為末，酒服三五錢。事親。

又方。大小薊根一升，酒一斗，漬五宿，任飲。亦可酒煎服。或生搗汁溫服。本草。

又方。大薊根絞汁服半升，立瘥。

又方。木莓根四兩，酒一椀，煎七分，空心溫服。乾坤生意。

崩中及痢下，日夜數十起，欲死者，懸鉤根、薔薇根、柿根、菝葜各一斛，剉入釜中，水淹上四五寸，煮減三之一，去滓取

汁，煎至可丸，丸梧子大，每溫酒下十九，日三服。千金翼。

崩中漏下，用石葦爲末，每服三錢，溫酒服甚效。

婦人血崩，草血竭嫩者蒸熟，以油鹽薑淹食之，飲酒一二盃送下。或陰乾爲末，薑酒調服一二錢，一服卽止。生於磚

縫井砌間，少在地上也。得效方。

又方。石花細茶焙爲末，舊漆碟燒存性各一匙，以碗盛酒放鍋內煮一滾，乃入藥末露一宿，侵晨連藥再煮一滾，溫

服。崩中不止者，麻根水煮服之良。本草下同。

崩中赤白帶下，用藁頭回草一把，酒水各半瓊，童便半碗，新紅花一捻，煎七分，臥時溫服。日近者一服，久則三服愈，

其效如神。

血崩不止，白朮豆花焙乾爲末，每服二錢，空心炒米煮飲，入鹽少許調下，卽效。真方。

又方。陳年蒸餅燒存性，米飲服三錢。本草下同。

又方。以鐵器燒赤，浸酒飲之，卽霹靂酒也。

又方。用湖雞腿根一兩，搗碎，酒二盞，煎一盞服。集簡方。

傷中崩赤，醜翻菜杵汁，拌酒煎沸，空心服一盞。千金。

婦人血崩蠶繭養汁飲。

崩中不止蠶故紙一張煎炒焦，槐子炒黃各等分爲末，酒服立愈。

又方。用蠶沙四兩，砂鍋炒半黃色，入無灰酒一壺，煮沸澄去沙，每溫服一盞即愈。本草。

漏血不止，水蛭炒爲末，酒服一錢，日二服，惡血消即愈。千金。

赤白崩中，舊壺瓢炒存性，蓮房煨存性等分，研末，每服二錢，熱水調服。三服，有汗爲度即止。甚者五服止。最妙忌房事發物生冷。海上方。

### 鍼灸

甲乙經曰：崩中腹上下痛，郄中主之。

婦人漏下，若血閉不通，逆氣脹血海主之。

女子漏血，太衝主之。

婦人漏血，腹脹滿不得息，小便黃陰谷主之。

千金方曰：漏血小腹脹滿如阻，體寒熱，腹偏腫，刺陰谷入四分，灸三壯。穴在膝內輔骨後大筋之下，小筋之上，屈膝乃得之。

漏下若血閉不通，逆氣脹，刺血海入五分，灸五壯。穴在膝臑上內廉白肉際二寸中。

女子不字，陰暴出，經漏刺然谷入三分，灸三壯。穴在足內踝前起大骨下陷中。

女子不字，陰暴出，淋漏，月水不來，而多悶，心下痛，水原照海二穴主之。

女人胞後下血不可禁止，灸關元兩旁相去三寸。

崩中漏下，常炙豬腎食之。張文仲方。

女人漏血，亂髮洗淨燒研，空心溫酒服一錢。婦人良方。

赤白崩中，魚鱗膠三尺焙黃研末，同雞子煎餅，好酒食。本草。

又方，舊敗蒲席燒灰，酒服二錢。勝金方。

血崩不止，漆器灰、櫻灰各一錢，柏葉煎湯下。本草下同。

婦人漏下，甄權曰：鼈甲酢炙研末，清酒服方寸匕，日二。

又方，用乾薑、鼈甲、訶黎勒皮等分爲末，糊丸，空心下三十九日再。

又方，好綿及婦人頭髮共燒存性，百草霜等分爲末，每服三錢，溫酒下，或加櫻灰。

又方，用舊綿絮去灰土一斤，新蠶絲一斤，陳蓮房十箇，舊炊單一枚，各燒存性，各取一錢，空心熱酒下，日三服，不過

五日愈。乾坤祕鑑。

又方，老母猪屎燒灰，酒服二錢。李樓方。

崩中漏下，赤白不止，氣虛竭，用龜甲、牡蠣各三兩爲末，酒服方寸匕，日三。千金下同。

又方，桑耳一兩半，鹿茸十八銖，酢五升，浸炙燥，再浸，酢盡爲度，治下篩服方寸匕，日三。

又方，地榆、知母等分，各指大長一寸者，咬咀，以酢一升，東向竈中治極濃，去滓服之。

婦人血崩不止，凌霄花爲末，每酒服二錢，後服四物湯。丹溪。

又方，櫻欄皮燒存性，空心淡酒服三錢。

又方，櫻欄皮燒存性，白礬煨各等分，淡酒服三錢。

又方，水養麻子根服之效。

崩中漏下五色，更人熊子膠、鹿房末，三指撮，溫酒服之神效。張文仲方。

劑。大劑者黃連解毒湯是也。次以香附子二兩炒，白芍藥二兩焙，當歸一兩焙，三味同爲細末，水調下。又服檳榔九，不數日而安。

西園公治一婦人年六十二歲，血崩不止，投黃連解毒湯，四貼後，服涼膈散合四物，六貼即愈。此婦因悲哀太過，則心系急，肺布葉舉，而上焦不通，熱氣在中，血走而崩，故效。

李杲十書曰：丁未仲冬，郭大方來，說其妻經水暴崩不止，先曾損身失血，自後一次縮一二日而始來，今次則不止。其人心窄，性急多驚，以余料之，必因心氣不足，飲食不節得之。大方曰：無也，乃到彼診得，掌中寒，脈沉細而緩，間而沉數，九竅微有不利，四肢無力。上喘氣短，促口鼻氣皆不調，果有心氣不足，脾胃虛弱之證。胃脘當心而痛，左脅下縮急有積，當臍有動氣，腹中鳴，下氣，大便難，虛證極多，不能盡錄。宜先治其本，餘證可以皆去。安心定志，鎮墜其經，調和脾胃，大益元氣，補其血脈，令養其神，以大熱之劑，去其冬寒，凝在皮膚內，少加去命門相火之藥，不令四肢痿弱，黃連一分，生地三分，炒神麴、橘皮、桂枝各五分，草豆蔻仁六分，黃芪人參、麻黃不去節，各一錢，當歸身一錢五分，杏仁五箇，另研如泥，共咬咀，作二服，水二大盞半，煎麻黃令沸去沫，煎至二盞，入諸藥，同煎至一大盞，於巳午之間，食消盡服之，一服立止，其胃脘痛，乃胃上有客寒，與太熱藥，草豆蔻丸一十五丸，白湯下，其痛立止，再與肝之積藥，除其積之根源而愈。

一婦人經候凝結，黑血成塊，左廂有血痕，水泄不止，穀有時不化，後血塊暴下，并水俱作，是前後二陰有形血脫，竭於下既久，經候猶不調，水泄日見三兩行，食罷煩心，飲食減少，甚至瘦弱。東垣老人曰：「夫聖人治病，必本四時升降浮沉之理，權變之宜，必先歲氣，無伐天和，無勝無虛，遣人天殃，無致邪，無失正，絕人長命。」故仲景云：「陽盛陰虛，下之則愈，汗之則死。陰盛陽虛，汗之即愈，下之則死。」大抵聖人立法，且如升陽或發散之劑，是助春夏之陽氣，令其上升，乃瀉秋冬收藏殞殺寒涼之氣，此病是也，當用此法治之，升降浮沉之至理也。天地之氣以升降浮沉，乃



女人漏下赤白，月經不調，灸交信三十壯，穴在內踝上五寸。

女人漏下赤白及血，灸足太陰五十壯，穴在足太陰經內踝上三寸，名三陰交。

女人漏下赤白，灸營池四穴三十壯，穴在內踝前後兩邊池中脈上，一名陰陽。

女人漏下赤白，四肢酸削，灸漏陰三十壯，穴在內踝下五分，微動腳脈上。

女人漏下赤白，泄注，灸陰陽隨年壯三報，穴在足拇趾下，屈裏表頭白肉際。

女人疝及小腹腫，溇泄癰遺尿，陰痛面塵黑，目下眇痛，漏血，刺太衝入三分，灸三壯，穴在足大趾本節後二寸中動

脈。

李杲十書曰：胞門不閉，漏下惡血不禁，刺氣門，入五分，穴在關元旁三寸。

醫學綱目曰：婦人經脈妄行，崩血，取中極三分補之，又取三陰交五分。

證治準繩曰：經血過多不止併崩中，取三陰交行間二穴，各針訖灸之，又取通理，刺二分，灸二七壯，穴在足小指上

二寸。

又法：血崩併漏下，刺中極補之，取子宮二寸半。

又法：敗血不止，取三陰交百勞風門中極腎俞膏肓曲池絕骨。

女子漏下惡血，月事不調，或暴崩不止，多下水漿之物，灸足太陰脾經中血海穴二七壯或三七壯，立已。經水過多，

其色瘀黑，甚者崩下，吸吸少氣，臍腹冷極，則汗出如雨，尺脈微小，灸關元百壯，穴在臍下正中三寸。

### 醫案

儒門事親曰：孟官人母年五十餘歲，血崩一載，僉曰澤蘭丸黑神散保安丸白薇散補之，不效。戴人見之曰：「天癸已盡，本不當下血，蓋血得熱而流散，非寒也。夫女子血崩多因大悲哭，悲甚則肺葉布，心系爲之急，血不禁而下崩。」

一婦人因怒崩血久不已，面青黃而或赤，此肝木制脾土而血虛，用小柴胡合四物清肝火生肝血，又用歸脾補中二湯益脾氣生肝血而瘥。此證若因肝經風熱而血不甯者，防風爲丸，以兼證之藥煎送。或肝經火動而血不甯者，炒條芩爲丸，以兼證之藥煎送。若瘀血爲患，用五靈脂爲末，燒鐵器焯酒調服，無不效者。

一婦人飲食後，因怒忽患血崩，四肢逆冷，抽掙口噤，如發瘧然，吐痰如湧，灌以二陳柴胡山梔枳殼，吐出酸味，神思稍醒。藥止次日，進薄粥少許，但乳脅脹痛，寒熱欲嘔，四肢倦怠，余以爲悉屬肝火熾盛，致脾氣不能運化，先用六君柴胡山梔釣藤鉤諸證頓退。惟四肢不遂，血崩如初，或又以爲肝火未息，欲投清肝涼血之劑，余以爲肝脾氣血俱弱，先用補中益氣湯培其脾土，而血氣歸經，又用四物參朮柴胡養肝和筋而四肢便利。

一婦人久患血崩，肢體消瘦，飲食到口，則聞腥臊，口出清液，每食少許，腹中作脹，此血枯之證，肺肝脾胃虧損之患，用八珍湯鷓鴣骨丸兼服兩月而經行，百餘劑而安。

一婦人血崩兼心痛三年矣，諸藥不應，每痛甚，虛證悉具，面色痿黃。余曰：「心主血，蓋因去血過多，心無所養，以致作痛，宜用十全大補湯參朮倍之。」三十餘劑稍愈，百餘劑全愈。

一婦人年六十有四，鬱怒頭痛寒熱，春間乳內時痛，服流氣飲之類益甚，不時有血如經行，又因大驚恐，飲食不進，夜寐不甯，此因高年去血過多，至春無以生發，肝木血虛火燥，所以至晚陰旺則發。經云：「肝藏魂，魂無附，故不能寐。」先以逍遙散加酒炒黑龍膽草一錢，山梔一錢五分，二劑腫痛頓退，又二劑而全消。再用歸脾湯加炒梔貝母，諸證悉愈。

表弟方健甫內五十歲，辛丑患血崩，諸藥罔效，壬寅八月，身熱體痛，頭運涕出，吐痰少食，衆作火治，展轉發熱，絕粒數日。余診之曰：「脾胃久虛，過服寒藥，中病未已，寒病復起。」遂用八味丸料一服，翌早隨索粥數匙，再服食倍，熱減痛止，乃服八味丸而愈。癸卯秋，因勞役憂怒，甲辰夏，病復作，胃飽發熱，脊痛腰疼，神氣怫鬱，或作內傷，或作中暑。

從四時，如始病不可逆之，故經云：『順天則昌，逆天則亡。』可不畏哉！夫人之身，亦有四時，天地之氣，不可止認在外，人體亦同天地也。今經漏不止，是前陰之氣血已脫下矣。水泄又數年，是後陰之氣血下陷以脫矣。後陰者，主有形之物也。前陰者，精氣之戶下竭，是病人周身之氣血，常行秋冬之令，陰主殺，此等收藏之病是也。陽生陰長，春夏是也，在人之身，令氣升浮者，穀氣上行是也。既病人周身血氣皆不生，長穀氣又不勝其肌肉消少，是兩儀之氣俱將絕矣。既下元二陰俱脫，氣血將竭，假令當時熱證，今下焦久脫，化爲寒矣。此病久沉久降，寒濕大勝，當急救之。瀉寒以熱，除濕以燥，大升大舉，以助生長，補養氣血不致偏竭，聖人立治之法，既濕氣大勝，以所勝治之，助甲風木上升是也。故經云：『風勝濕。』是以所勝平之也。當先調和胃氣，次用白朮之類，以燥其濕而滋元氣，如其不止，後用風藥以勝濕，此便是大升大舉，以助春夏二濕之久陷下之至治也。

宣德侯經歷家人病崩漏，醫莫能效，切脈之後，且以紙疏其證，至四十餘種，爲製調經升陽除濕湯療之，明日而十減其八，前後五六日良愈。

醫學正傳曰：一老婦人年五十三歲，血崩久不止，諸藥不效，余以橡斗蒼耳草根二物燒存性，用四物湯加白芷茅花乾薑煎湯調服。

薛氏醫按曰：大尹王天成之內，久患崩，自服四物涼血之劑，或作或輟，因怒發熱，其血不止，服前藥不應，乃主降火，更加脅腹大痛，手足俱冷。余曰：『此脾胃虛寒所致。』先用附子理中湯體熱痛止，又用濟生歸脾補中益氣二湯，血崩頓愈。若泥痛無補法，則誤矣。

錦衣楊永興之內患崩證，過服寒涼之劑，其證益甚，更加肚腹痞悶，飲食不入，發熱煩躁，脈洪大而虛。余曰：『此脾經氣血虛而發躁也。當急用八珍湯加炮薑以補溫之，緩則不救。』不信，乃服止血降火之劑，虛證蜂起，始信余言，緩不及治矣。

一婦人面黃或赤，覺腰間或臍下作痛，四肢困倦，煩熱不安，經行先發寒熱，兩肋如束，血湧如崩，此脾胃虧損，元氣

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考三百九十七

婦人帶下門一

黃帝素問

○骨空論

任脈為病，女子帶下瘦聚。

註任脈循於腹，故其病在腹。

漢張機金匱要略

○帶下病脈證

婦人之病，因虛積冷結氣為證，經水斷絕，至有歷年血寒，積結胞門，寒傷經絡，凝堅在上，嘔吐涎唾，久成肺癰，形體損分，在中盤結，繞臍寒疝，或兩脅疼痛與臟相連，或結熱中，痛在關元，脈數無瘡，肌若魚鱗，時著男子，非止女身，在下未多，經候不勻，令陰掣痛，少腹惡寒，或引腰脊下根氣衝，氣衝急痛，膝脛疼煩，奄忽眩冒，狀如厥癩，或有憂慘，悲傷多嘔，此皆帶下，非有鬼神，久則羸瘦，脈虛多寒，三十六病，千變萬端，審脈陰陽虛實，緊弦行其針藥，治危得安，其

崩血便血，煩渴引飲，粒米不進，昏憤時作，脈洪大，按之微弱，此無根之火，內虛寒而外假熱也。以十全大補加附子一劑，隨食粥三四匙，崩血漸減，日服八味丸，始得全愈。

一婦人性急，每怒非太陽耳項喉齒胃乳作痛，則胃滿吞酸吐瀉少食，經漏不止，此皆肝火之證。肝自病則外證見，土受剋則內證作。若自病見，用四物加白朮茯苓柴胡炒梔炒龍膽，若內證作，用四君子加柴胡芍藥神麴吳茱萸炒過黃連，諸證漸愈。惟月經漏下不止，是血分有熱，脾氣尚虛，以逍遙散倍用白朮茯苓陳皮，又以補中益氣加酒炒芍藥兼服而調。

證治準繩曰：一婦人年逾四十，形色蒼紫，忽病血崩，醫用涼血或用止澀，俱罔效。汪石山診之，六脈皆沉濡而緩，按之無力，曰：「此氣病，非血病也。當用甘溫之劑，健脾理胃，使胃氣上騰，血循經絡，則無復崩矣。」遂用補中益氣湯，多加參芪兼服參苓白朮散果愈。

一老婦人血崩不止，流瀉不絕，滿牀皆血，起牀不得者三月矣。腹滿如孕，余作虛挾痰積汚血治之。用四物四兩，參朮各一兩，甘草半兩，以治虛，香附三兩，半夏一兩半，茯苓陳皮枳實縮砂延胡各一兩，以破痰積汚血，分二十貼，每貼煎加乾荷葉側柏葉湯，再煎服之，服盡良愈，今再不發，神效。

一婦人年五十以上，經斷七年，忽然經行，遂成崩漏，發熱腹痛兩月不差。余診其脈虛細疾數，余曰：「此乃陰虛所致，宜服熟附丸。」後果愈。

王御醫直夜，有一宮女血如山崩，其時暑月，藥筒中只有大順散兩貼，以冷水調服，旋即奏效。以此知醫者要在權變也。

診婦人漏血下赤白，日下血數升，脈急疾者死，遲者生。  
診婦人漏下赤白不止，脈小虛滑者生，大緊實數者死。  
婦人帶下，脈浮惡寒漏下者不治。

### 唐孫思邈千金方

○赤白帶下崩中漏下

諸方說三十六疾者，十二癥九痛七害五傷三痼不通是也。何謂十二癥？是所下之物，一曰狀如膏，二曰如黑血，三曰如紫汁，四曰如赤肉，五曰如膿痂，六曰如豆汁，七曰如葵羹，八曰如凝血，九曰如清血，血似水，十曰如米泔，十一曰如月浣，乍前乍却，十二曰經度不應期也。何謂九痛？一曰陰中傷痛，二曰陰中淋瀝痛，三曰小便卽痛，四曰寒冷痛，五曰經來卽腹中痛，六曰氣滿痛，七曰汗出陰中如有蟲嚙痛，八曰脅下分痛，九曰腰膝痛。何謂七害？一曰竅孔痛不利，二曰中寒熱痛，三曰小腹急堅痛，四曰臍不仁，五曰子門不端引背痛，六曰月浣乍多乍少，七曰害吐，何謂五傷？一曰兩脅支滿痛，二曰心痛引脅，三曰氣結不通，四曰邪思洩利，五曰前後痼寒。何謂三痼？一曰羸瘦不生肌膚，二曰絕產乳，三曰經水閉塞。病有異同，方亦不一。

按產寶方云：帶下三十六疾者，是十二癥九痛七害五傷三固，謂之三十六疾也。十二癥者，是所下之物一者如膏，二者如青血，三如紫汁，四如赤皮，五如膿痂，六如豆汁，七如葵羹，八如凝血，九如清血，十如米泔，十一如月浣，十二如經度不應期也。九痛者，一陰中痛，二陰中淋痛，三小便痛，四寒冷痛，五月來時腹痛，六氣滿來時足痛，七汗出陰中如蟲嚙痛，八脅下皮痛，九腰痛。七害者，一害食，二害氣，三害冷，四害勞，五害房，六害妊，七害睡。五傷者，一竅孔痛，二寒冷痛，三小腹痛，四臍不仁，五子門不正，引背痛。三固者，月水閉塞不通，其餘二者文缺不載，而于

雖同病，脈各異源，詳加辨記，勿謂不然。

問曰：「婦人年五十，所病下利，數十日不止，暮即發熱，少腹裏急，腹滿，手掌煩熱，唇口乾燥，何也？」師曰：「此病屬帶下。何以故？曾經半產，瘀血在少腹不去。何以知之？其證唇口乾燥，故知之。當以溫經湯主之。」

### 晉王叔和脈經

#### ○脈證

大風邪入少陰，女子漏白下赤。

師曰：「婦人帶下六極之病，脈浮則爲腸鳴腹滿，緊則爲腹中痛，數則爲陰中癢痛，則生瘡，弦則陰疼掣痛。」師曰：「帶下有三门：一曰胞門，二曰龍門，三曰玉門。已產屬胞門，未產屬龍門，未嫁女屬玉門。」

問曰：「未出門，女有三病，何謂也？」師曰：「一病者，經水初下，陰中熱，或有當風，或有扇者；二病者，或有以寒水洗之；三病者，或見丹下，驚怖得病，屬帶下。」

師曰：「婦人帶下九實中事，假令得鼠乳之病，劇易當劇，有期當庚辛爲期，餘皆倣此。」

問曰：「有一婦人年五十，所病但苦背痛，時時腹中痛，少食多厭喜，臌脹，其脈陽微，關尺小緊，形脈不相應，願知所說。」師曰：「當問病者飲食何如。假令病者言我不欲飲食，聞穀氣臭者，病爲在上焦。假令病者言我少多爲欲飲食，不食亦可，病爲在中焦。假令病者言我自飲食如故，病爲在下焦。爲病屬帶下，當以帶下治之。」

問曰：「婦人病如癩疾，鬱冒，一日二十餘發，師脈之，反言帶下，皆如師言，其脈何類，何以別之？」師曰：「寸口脈濡而緊，濡則陽氣微，緊則榮中寒，陽微衛氣虛，血竭凝寒，陰陽不和，邪氣舍於榮衛，疾一作候，起年少時，經水來以合

多乘微少才謂三氣有風百病不生。或乘任方而氣任生。或血不化。或成白帶。或血不化。或成紅。遂成赤帶。寒熱交併，則赤白俱下。有室女或室後虛損，而有此疾者，皆令孕育不成，以致絕嗣。凡有是證，速宜治之，久而不治，令人面黧黯色，肌肉瘦瘠，腹脅脹滿，攻刺疼痛，甚至足脛枯細，多苦逆冷，尪羸不能食矣。診其脈，右手尺脈浮，浮爲陽陽絕者無子，苦足冷帶下也。

## 金劉完素六書

### ○論證

赤者熱入小腸，白者熱入大腸，原其本皆濕熱結於脈，故津液湧溢，是爲赤白帶下，本不痛結，緣五經脈虛，結熱屈滯於帶，故女子臍下痛而綿綿陰器中時下也。故經曰：「任脈爲病，男子內結七疝，女子帶下瘕聚。」王注曰：「任脈自胞上過，帶脈貫於臍上，故男子內結七疝，女子帶下。」帶脈起於季脅章門，如束帶狀，今濕熱冤結不散，故爲病也。經曰：「脾傳之腎，病名曰瘕疝，小腹冤熱而痛出白，一名曰蠱，所以爲帶下冤結也。冤屈也。屈滯而病熱不散，先以十棗湯下之後，服苦楝丸，大延胡散調下之，熱去濕除，病自愈也。」

## 元張從政儒門事親

### ○赤白錯分寒熱解

精選聖惠方二十三卷論婦人赤白帶下云：「婦人帶下者，由勞神過度，損動經血，致令身虛受於風冷，風冷入於脬絡，傳其血之所成也。」巢氏內篇四十四卷論任脈爲經之海，其任之爲病，女子則爲帶下，手太陽爲小腸之經也，手少陰爲心之經也，心爲臟主於裏，小腸爲腑，主於表，二經之血在於婦人，上爲乳汁，下爲月水，衝任之所統也。



金所說三十六種疾，皆由于臟冷熱勞損，而下起於陰內也。

### 宋陳自明婦人良方

○帶下有五

婦人帶下，其名有五，因經行產後，風邪入胞門，傳於臟腑而致之。若傷足厥陰肝經，色如青泥，傷手少陰心經，色如紅津，傷手太陰肺經，形如鼻涕，傷足太陰脾經，黃如爛瓜，傷足少陰腎經，黑如衄血。人有帶脈橫於腰間，如束帶之狀，病生於此，故名爲帶。

註按徐用誠先生云：「前證白屬氣而赤屬血。」東垣先生云：「血崩久則亡陽。」故白滑之物下流，未必全拘於帶脈，亦有濕痰流注下焦，或腎肝陰淫之濕勝，或因驚恐而木乘土位，濁液下流，或思慕爲筋痿。戴人以六脈滑大有力，用宣導之法，此瀉其實也。東垣以脈微細沉緊，或洪大而虛，用補陽調經，乃兼責其虛也。丹溪用海石南星椿根皮之類，乃治其濕痰也。竊謂前證皆當壯脾胃，升陽氣爲主，佐以各經見證之藥。色青者屬肝，用小柴胡加山梔防風，濕熱壅滯，小便赤澀，用龍膽瀉肝湯。肝血不足，或燥熱風熱，用六味丸。色赤者屬心，用小柴胡加黃連山梔當歸，思慮過傷，用妙香散等藥。色白者屬肺，用補中益氣加山梔。色黃者屬脾，用六君子加山梔柴胡，不應用歸脾湯。色黑者屬腎，用六味丸。氣血俱虛，八珍湯。陽氣下陷，補中益氣湯。濕痰下注，前湯加茯苓半夏蒼朮黃蘗，氣虛痰飲，下注，四七湯送六味丸，不可拘肥人多痰，瘦人多火，而以燥濕瀉火之藥輕治之也。

### 嚴用和濟生方

○論治

熱口乾眩暈時嘔酸水余知其實有寒痰在胃中以瓜蒂散吐訖冷痰二三升皆酸水也間如黃涎狀如爛膠次以漿粥養其胃氣又次用道水禹功二方以瀉其下然後以淡劑滲洩之藥利其水道不數日而愈余嘗悟內經中所云「上有病下取之下有病上取之」又「上者下之下者上之」然有此法亦不可偏執更宜詳其虛實而用之故知精選聖惠方帶下風寒之言與巢氏論中赤熱白寒之說正與難素相違予非敢妄論先賢恐後學不明未免從之而行也如其寡學之人不察病人脈息不究病人經脈妄斷寒熱信用羣方暴熱之藥一旦有失雖悔何追嗚呼人命一失其復能生乎赤白痢與赤白帶下皆不死人內經惟腸澼便血血溫身熱者死赤白帶下白液白物蠱病腎消皆不能死人有死者藥之誤也。

夫婦人赤白帶下或出白物如脂可服導水丸禹功散或單用無憂散量虛實加減瀉訖次用桂苓丸五苓散葶藶木香散同治濕法治瀉法治之或用獨聖散上涌亦可也室女同。

### 李杲十書

#### 一 酒煮當歸丸論

婦人白帶下注癩疝脚氣腰已下如在冰雪中以火焙炕重重厚綿衣蓋其上猶寒冷不任寒之極也面白如枯魚之象肌肉如刀割削瘦峻之速也小便不止與白帶長流而不禁固自不知覺面白目青藍如菜色眈眈無所見身重如山行步欹側不能安地腿膝枯細大便難秘口不能言無力之極食不下心下痞煩懊懣不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知此上中下三陽真氣俱虛欲竭噦嘔不止胃虛之極也脈沉厥緊而澀按之空虛若脈洪大而瀼按之無力猶爲中寒之證况按之空虛者乎按之不鼓是爲陰寒乃氣血俱虛之極也宜酒煮當歸丸大補大溫。

#### ○固真丸論

衝任之脈，既起於胞內，陰陽過度則傷脬絡，故風邪乘虛而入於脬中，損衝任之經，傷太陽少陽之血，致令脬絡之間，穢與血相兼帶而下，冷則多白，熱則多赤，二家之說皆非也。夫治病當先識經絡，靈樞十二經中，有是動之病，有所生之病，大經有十二奇經，有八脈言十二經之外，復有此八道經脈也。十二經與八道經脈，通身往來經絡共二十道，上下流走相貫，周環晝夜不息，與天同度。自手太陰肺經起，行陽二十五度，行陰亦二十五度，復會於手太陰肺經也。然此二十道經絡，上下周流者，止一十九道耳。惟帶脈起少腹側季脅之端，乃章門穴是也。環身一周，無上下之源，絡脬而過，如束帶之於身。難經曰：「帶之爲病，溶溶如坐水中，衝任者，是經脈之海也，循腹脅，夾臍旁，傳流於氣衝，屬於帶脈，絡於督脈。督脈者，起於關元穴，任脈者，女子主養胎孕之所，督脈乃是督領婦人經脈之海也。衝任督三脈，同起而異行，一源而三岐，皆絡帶脈，衝任督三脈皆統於竅戶，巡陰器，行廷孔，溺孔之端，衝任督三脈以帶脈束之，因餘經上下往來，遺熱於帶脈之間，熱者血也，血積多日不流，火則從金之化，金曰從革而爲白，乘少腹間，冤熱白物，滑溢隨漉而下，綿綿不絕，多不痛也。或有痛者，則壅礙因壅而成痛也。內經曰：「少腹冤熱，洩出白液。」冤者，屈滯也，病非本經爲他經冤抑而成此疾也。冤一作客，客猶寄也。遺客熱於少腹，久不去，從金化而爲白。設若赤白痢，赤者新積也，從心火，白者舊積也，從肺金，故赤白痢不可曲分寒熱，止可分新舊而治之。假如癰痛始赤，血次潰白膿，又豈爲寒者哉？而病者未爲信也。此金之劉河間常言之矣，皆云寒多則白，以乾薑赤石脂桃花丸治痢，雖愈後必生血疾，如白帶下病，徑以白芍藥乾薑白帶雖愈，則小洩必不利，治瀉痢與治帶下，皆不可驟用峻熱之藥，燥之燥之，則內水涸，內水涸則必煩渴，煩渴則小便不利，小便不利則足腫而浮，漸至不治。內經曰：「思想無窮，所願不得，意淫於外，入房太甚，發爲筋痿，淫衍白物如精之狀，男子因洩而下，女子綿綿而下。」左傳曰：「少男感長女，風落山之象，是爲惑蠱之疾。」其文三蟲同皿曰蠱，乃是思慕色慾，內生侵蝕，蝕甚不可便用燥熱之藥攻之，漸至形削羸瘦，脈大者必死而不救，且赤白痢者是邪熱傳於大腸下廣腸，出赤白也。帶下者傳於小腸入脬經，

瘦人白帶少，如有者多熱，以炒黃蘗滑石椿皮川芎海石青黛之類作丸子服，無海石蛤粉亦可。赤白帶下，或十棗湯，或神佑丸，或玉燭散，皆可服。實者可行，虛者不可峻攻，此羅先生法也。

血虛者，加減四物湯。

氣虛者，參朮陳皮間與之。

濕勝者，用固腸丸。

相火動者，於諸藥中少加黃蘗。

滑者，加龍骨赤石脂。

滯者，加葵花。白帶用白葵花，赤帶用赤葵花。

性躁者，加黃連。

痰氣帶下者，蒼朮香附滑石蛤粉半夏茯苓丸服。寒月少加乾薑。臨機應變，必須斷厚味。

治結痰白帶心下悶，先以小胃丹半饑半飽津液下數丸，候鬱積開，却宜服補藥。

赤白帶者，皆因七情內傷，或下元虛憊，感非一端。叔和云：「崩中日久爲白帶，漏下多時骨髓枯。」蓋崩久血少亡

陽，故白滑之物下流不止。東垣言之詳矣，不可不知。

帶下與夢遺，同法治之。

## 明戴思恭證治要訣

### ○總論證治

赤白帶下，皆因七情內傷，或下元虛冷，感非一端。大率下白帶多間有下赤者，並宜順氣散吞震靈丹，仍佐艾附圓，

婦人白帶久下不止，臍腹冷痛，陰中亦然，目中溜火，視物眴眴然無所見，齒皆惡熱，飲且痛，須得黃連細末擦之乃止。惟喜乾食，大惡湯飲，此病皆寒濕乘其胞內，故喜乾而惡濕。肝經陰火上溢走於標，故上壅而目中溜火，腎水侵肝而上溢，致目眴眴而無所見。齒惡熱飲者，是陽明經中伏火也。治法當大瀉寒濕，以丸藥治之。故曰：寒在下焦，治宜緩，大忌湯散，以酒製白石脂白龍骨以枯其濕，炮乾薑大熱辛瀉寒水以黃蘗之大寒爲因用，又爲鄉導。故云：古者雖有重罪，不絕人之後，又爲之伏其所主，先其所因之意，又瀉齒中惡熱飲也，以柴胡爲本經之使，以芍藥五分導之，恐辛熱之藥太甚，損其肝經，故微瀉之，以當歸身之辛溫大和其血脈，名曰固真丸，用藥之法備矣。

③補經固真湯論

婦人心胞尺脈微，其白帶下流不止者，何按叔和云：「崩中日久，爲白帶漏下，多時骨髓枯。」蓋血崩久，則血少復亡其陽，故白滑之物，下流不止。是本經血海將枯，津液復亡，枯乾不能滋養筋骨，以本部行經藥爲引用，爲使以大辛甘油膩之藥，潤其枯燥而滋益津液，以大辛熱之氣味藥，補其陽道，生其血脈，以苦寒之藥泄其肺而救上熱傷氣，以人參補之，以微苦溫之藥爲佐而益元氣，名曰補經固真湯，此證之要藥也。

朱震亨心法

①總論證治

帶下赤屬血，白屬氣。

主治燥濕爲先。

漏與帶俱是胃中痰積流下，滲入膀胱，無人知此，只宜升提，甚者上必用吐以提其氣，下用二陳湯，加蒼朮白朮，仍用九子。一本作五雙子。

石脂性燥加黃連腹痛加乾薑

因月水淋瀝不已，或崩中暴下，或產後去血過多，以致陰虧陽竭，榮氣不升，經脈凝泣，衛氣下陷，精氣累滯於下焦，蘊積而成白滑，如涕下流，腥臭者黃芪建中湯，去桂加當歸，水煎吞苦楝丸。久不止臍腹引陰冷痛者，東垣固真丸。虛中有火者，補經固真湯，大烏雞丸常用。氣虛四君子湯，血虛四物湯，有火加黃蘗，有寒加桂附。

始因亡血復亡其陽，陽氣虛極，帶下腥臭，多悲不樂，附桂湯。腹痛陰冷者，四物湯加桂附。常用酒煮當歸丸，小烏雞丸，參斯丸，琥珀調經丸。

風邪入於胞門，或中經脈，流傳臟腑，若傷肝經，青如泥色，傷心經，赤如紅津，傷肺經，形如白涕，傷脾經，黃如爛瓜，傷腎經，黑如衄血，宜胃風湯，或五積散去麻黃主之。通用單地榆散。

室女經水初下，一時驚悸，或浴以冷水，或當風取涼，故經水止而卽患帶下，宜琥珀硃砂丸。

孕婦帶下，全是濕熱，宜芩朮樗皮丸。

平時陰陽過多，及產後亡血下虛，風邪乘虛入於胞絡，宜煖宮丸加薑附吳萸，或黃芪建中湯去桂加當歸，水煎吞苦楝丸。

凡帶下或用升提，如升陽調經湯，或用收澀，如伏龍肝散白芷散，然暫止而終不止者，蓋衛司開闔而爲榮血之主，脾胃爲血海水液之會，衛氣與胃氣俱虛，則血液無所約制，故古方有用桂枝湯加附子以固衛氣者，四君子湯加草果丁香木香以燥水健脾者，或用理中湯加陳皮半夏，或單半夏丸用芎歸煎湯下，或補中益氣湯平胃散皆補衛厚脾，使氣血自循故轍，而不專於收澀以劫奪之也。

㊟脈法

又有白淫一證，如白精之狀，不可誤作白帶，過服熱藥。

或米飲調沙參末。

帶下不止，成疔羸者，四物湯加煨牡蠣粉半錢，吞固真圓，多服取效。

有帶疾愈後一二月或再發，半年一發，先血而後下，帶來不可遏，停蓄未幾，又復傾瀉，此名漏帶，最難治者也。

下截之血，小腹主之。有因血虛而虛熱陷入小腸，致小便澀痛，色白如泔，或成沙粒，不可作淋治，用冷劑宜以四物湯五苓散各半貼和煎。

## 李梴醫學入門

### ○總論證治

經曰：「小腹冤熱，洩出白液。」冤者，濕熱凝滯結於五臟，自胞上而過帶脈，出於大小腸之分，淋瀝以下，故曰帶下。赤屬血，白屬氣，其證頭昏目眩，口苦舌乾，咽嗑腫燥，大便或閉或澀，小便澀滯熱證也。如赤白痢濁一般，但不痛耳。間有痛者，濕熱拂鬱，甚則肚腹引痛，婦人服食燥熱，性行乖戾，以致肝旺脾虧，而生濕熱，熱則流通，古人有用導水丸下之，繼以淡劑滲之，或苦棟丸大元胡索散調之。如臍腹痛者，暫以辛溫開導，如大溫經湯補經固真湯龜蘗薑梴丸是也。

瘦人多熱，脈數外證潮煩，乃陰虛火盛也。芩蘗樗皮丸帶不止者，用地骨皮一兩，生地五兩，酒十盞，煎至三盞，分三次服。或白芷散單益母丸白帶兼痛風者，二陳湯加蒼蘗南星牛膝川芎兼頭風鼻涕者，蒼蘗辛芎散兼七情者，側蘗樗皮丸。

肥人多濕，身黃脈緩，陰戶如冰，或痛白帶，升陽燥濕湯，四炒固真丹。

濕痰流下，滲入膀胱，宜二陳湯加二朮升麻柴胡，或蒼蘗樗皮丸。如結痰白帶，淋瀝不已者，先以小胃丹半饑半飽。

④ 枯涸宜潤

帶下久而枯涸者濡之。凡大補氣血，皆所以濡之，如以四物湯為末，煉蜜丸，梧子大，空心米飲下三四十九，以療年高婦人白帶，良驗，皆潤劑也。

⑤ 補虛法

凡脈微食少及久病曾經攻下者，俱作虛治，有熱用涼補，無熱用溫補。

⑥ 酸漿草辨

千金治赤白帶下用三葉酸漿草陰乾為末，酒服。按此草葉細如萍，叢生，莖端有三葉，俗名布谷飯。布谷者，鳩也，蓋鳩常食之，故又名鳩漿草。衍義誤入苦薺條。其子大如金柑，味酸可食，故亦名酸漿，非三葉也。酸漿小草布地而生，葉皆三瓣，惟開黃花，其莖葉皆酸者。

⑦ 敗膿所致

帶下并腸有敗膿，淋露不已，腥穢殊甚，遂至臍腹更增冷痛，此蓋敗膿血所致，卒無已期，治須排膿為先。白芷一兩，單葉紅蜀葵根二兩，白芍藥白礬各半兩，礬燒枯另研，餘同為末，以蠟為丸，如桐子大，空肚及飯前米飲下十九，或十五丸，候膿盡仍別以補藥佐之。

吳崑醫方考

① 用白芷黃荆實瓦壘子論

白帶者，胃中濕熱下注而成，猶之溺注於器，而生溺底塗耳。前古名醫有單用焦白芷而主者，有單用焦荆實而主者，有單用瓦壘粉而主者，蓋以白芷之性香而升舉，荆實之性辛而利氣，瓦壘之性燥而勝濕，炒而焦之，則火可以



帶下崩中，脈多浮動，虛遲者生，實數者重。腎脈浮遲，主患帶濁。

### 薛己醫按

#### ○論證

婦人帶下，或因六淫七情，或因醉飽房勞，或因膏粱厚味，或服燥劑所致，脾胃虧損，陽氣下陷，或濕痰下注蘊積而成，故言帶也。凡此皆當壯脾胃，升陽氣為主，佐以各經見證之藥。

### 王肯堂證治準繩

#### ○論證

婦人有白帶者，乃是第一等病，令人不能產育，宜急治之，此扁鵲之過邯鄲，聞貴婦人所以專為帶下醫也。帶下之證有三：未嫁之女，月經初下，止而即浴之以冷水，或熱而扇，或當風，此室女病帶下之由也。有家之婦，陰陽過多，即傷胞絡，風邪乘虛而入，胞經觸冷，遂使穢液與血水相連而下。產後帶下，由亡血失氣，傷動胞絡，門開而外風襲，肌體虛而冷風入，風與熱氣相連，故成液而下。冷則多白，熱則多赤，冷熱相交，則赤白俱下。

#### ○論潔古治法

帶下少腹冤結而痛者，先以十棗湯下之，次服苦楝丸，大元胡散調之，是先攻後補之法也，不可不知。結痰白帶，以小胃丹半錢，半飽津液下數丸，候鬱積行却，服白朮一兩，蒼朮半兩，紅白葵花二錢半，白芍藥七錢半，蒸餅為丸，空心煎四物湯下二十九以補之。

○論治

帶下之病，婦女多有之。赤者屬熱，兼虛兼火治之。白者屬濕，兼虛兼痰治之。年久不止者，以補脾胃為主兼升提。大抵瘦人多火，肥人多痰。

○必用之藥

赤帶用四物湯加芩連，再加升麻丹皮主之，兼服三補丸。

白帶用加味六君子湯主之，兼服蒼莎導痰丸。

帶久不止者，宜服十全大補湯，去地黃加陳皮半夏炒乾薑，更服參朮大補丸，以補脾胃之虛，及服補宮丸以固下元之脫。

○白帶與白淫白濁不同

婦人白帶與白淫白濁之病，證既不同，治亦有別。蓋白帶時常流出，清冷稠粘，此下元虛損證也，用上帶久不止之法治之，非如白濁隨小解而來，渾濁如泔者比也。

景岳全書

臣張介賓著

○論證

凡婦人淋帶雖分微甚，而實為同類，蓋帶其微而淋其甚者也。總由命門不固，而不固之病，其因有六：蓋一以心旌之搖之也，心旌搖則命門應，命門應則失其所守，此由於不遂者也；一以多慾之滑之也，情慾無度，縱肆不節，則精道滑而命門不禁，此由於太遂者也；一以房室之逆之也，凡男女相臨，遲速有異，此際權由男子而婦人情興多致

生土，土可以防水，煉而粉之，則燥可以勝濕，勝濕則無以下注而白帶止矣。此用三物之意也。

①用葵花論

凡人腰臍之間，有帶脈奇經八脈之一也。迴身一週，如束帶焉。下焦虛損，督任有虧，則中焦氣血乘虛而襲之，陷於帶脈之下，氣病爲白，血病爲赤，名曰赤白帶下也。東垣曰：「白葵花治白帶，紅葵花治赤帶。赤治血燥，白治氣燥。」此何言哉！崑謂葵花者，朝陽之萼也，稟草木之陰，涵天地之陽，故能潤燥而升陽，使營衛上行，不復陷於帶脈之下而爲帶下也。或問帶下一疾耳，此言氣血陷於帶脈之下爲帶下，前言胃中濕熱下注爲帶下，何相悖也？余曰：「婦人無病容，單下白者，責之濕熱下注。婦人久病，赤白並下，責之氣血下陷，多成瘵也。」又曰：「有言白者屬寒，赤者屬熱，其說何如？」余曰：「曾見寒者固有赤帶，熱者益多白帶，此白寒赤熱之言，不足徵矣。必若所言，則赤白並下者，是寒熱並有耶？見道之言不如此。」

②用千金白馬毛散論

氣陷於下焦則白帶，血陷於下焦則赤帶，以澀藥止之，則未盡之帶留而不出，以利藥下之，則既損其中又傷其下，皆非治也。白馬得乾之剛，毛得血之餘，血餘可以固血，乾剛可以利氣，固血則赤止，利氣則白愈。此用馬毛之意也。龜鼈牡蠣外剛而內柔，離之象也。去其柔而用其剛，故可以化癥，可以固氣，化癥則赤白之成帶者無復中留，固氣則營衛之行不復陷下，營不陷則無赤，衛不陷則無白矣。

萬全廣嗣紀要

①帶下皆身中之血

女子之血，謂之七損，上爲乳汁，下爲月經，交合浸淫之水，與夫漏濁崩中帶下之物，皆身之血也。

空心酒下十五丸，日再服。一方有黃蘗半兩。

①小牛角鯁散 治帶下五賁：一曰熱病下血，二曰寒熱下血，三曰經脈未斷為房事則血漏，四曰經來舉重，傷任脈下血，五曰產後臟開經利。五賁之病，外實內虛。

牛角鯁一枚燒令赤。鹿茸，禹餘糧，當歸，乾薑，續斷，各二兩。阿膠三兩，鰾鯽骨，龍骨，各一兩。赤小豆二升。右治下篩，空腹以酒服方寸匕，日三。一方無鹿茸鰾鯽骨。

②龍骨散 治赤白帶下。

龍骨三兩，黃蘗半夏，竈中黃土，桂心，乾薑，各二兩。石葦，滑石，各一兩。鰾鯽骨，代赭，各四兩。白殭蠶五枚。右治下篩，酒服方寸匕。如白多者加鰾鯽骨殭蠶各二兩。如赤多者，加代赭五兩。

③又方 治女人赤白帶下。

大黃蒸三斗米下，附子，茯苓，牡蠣，牡丹，桔梗，葶藶，各三兩。厚朴，芎藭，人參，當歸，蠹蟲，蜀椒，吳茱萸，柴胡，乾薑，桂心，各半兩。細辛二兩半。右十八味為末，蜜和丸如梧子大，每日空心酒服二丸，不知加之，以腹中溫為度。一方有麻子三兩，澤蘭十兩，無蜀椒葶藶。

④又方 治帶下百病。

大黃破如豆粒，熬令黑色。柴胡，朴硝，各一斤。川芎五兩，乾薑，蜀椒，各一升。茯苓如雞子大一枚。右為末，蜜丸梧子大，先食米飲服七丸，不止加至十九丸，以知為度。

⑤又方 治婦人及女子赤白帶下。

禹餘糧，當歸，川芎，各一兩半。赤石脂，白石脂，阿膠，龍骨，石葦，各一兩六銖。鰾鯽骨，黃蘗，白

中道而止，止則逆，逆則爲濁爲淋，此由於遂而不遂，乃女子之最多而最不肯言者也。以上三證，凡帶濁之由乎此者，十居八九，而三者之治，必得各清其源，庶可取效。然源未必清，而且旋觸旋發，藥餌之功，必不能與情竇爭勝，此帶濁之所以不易治也。此三者之外，則尚有濕熱下流者，有虛寒不固者，有脾腎虧陷而不能收攝者，當各因其證而治之。

○治法

一心旌搖，心火不靜而帶下者，先當清火，宜硃砂安神丸、清心蓮子飲、直指固精丸之類主之。

一無邪火，而但見心虛帶下者，宜祕元煎、人參丸、心虛白濁飲、扶菟丸之類。

一慾事過度，滑泄不固而帶下者，宜祕元煎、壽脾煎、固陰煎、蒼朮菟絲丸、濟生固精丸、鎖精丸、金鎖思仙丹之類主之。

一人事不暢，精道逆而爲濁爲帶者，初宜六味地黃湯，或威喜丸之屬以利之。久不止者，宜固陰煎、蒼朮菟絲丸之屬以固之。

一濕熱下流而爲帶濁，脈必滑數，色見紅赤，證有煩渴而多熱者，宜保陰煎、加味逍遙散，或經驗豬肚丸亦佳。若熱甚兼淋而赤者，宜龍膽瀉肝湯。

一元氣虛弱而帶下者，宜壽脾煎、固陰煎、菟絲煎、七福飲、十全大補湯、九龍丸之屬。

一陽氣虛寒，脈見微瀼，色白清冷，腹痛多寒者，宜加薑附，或用家韭子丸。

一脾腎氣虛下陷而多帶者，宜用壽脾煎、固陰煎、歸脾湯、補中益氣湯之屬。

①禹餘糧圓 治崩中赤白不絕，困篤。

禹餘糧五兩，白馬蹄十兩，鰾魚骨一兩，龍骨三兩，鹿茸二兩。右為末，蜜丸，梧子大，以酒服二十九日，再以知為度。

②又方 治女人崩中，去赤白。

白馬蹄五兩，蒲黃，鹿茸，禹餘糧，白芷，白馬鬃毛，小薊根，續斷，各五兩。人參，乾地黃，柏子仁，鰾骨，黃芪，茯苓，當歸，各三兩。艾葉，茯苓，伏龍肝，各二兩。右為末，蜜丸，如梧子大，空心飲服二十九日，再加至四十九。

③伏龍肝湯 治崩中去赤白，或如豆汁。

伏龍肝如彈子七枚，生薑五兩，生地黃四升，甘草，艾葉，赤石脂，桂心，各二兩。右咬咀，以水一斗，煮取三升，分四服，日三夜一。

④又方 治崩中漏下，赤白不止，氣虛竭。

龜甲，牡蠣，各三兩。右二味，治下篩，酒服方寸匕，日三。

⑤又方 治同上。

桑耳一兩半，鹿茸十八銖。右二味，以酢五斗漬炙，燥再漬，酢盡為度，治下篩，服方寸匕，日三。

⑥又方 治同上。

地榆，知母，各等分。右二味，用各指大長一尺者咬咀，以酢一升，東向竈中治極濃，去滓服之。

⑦芎藭湯 治帶下漏血不止。

蘇黃芩，續斷，桑耳，牡蠣各一兩。右爲末，蜜丸梧子大，空心米飲下十五丸，日再加至三十九丸爲度。一本有黃連，無黃芩。

⑦白馬蹄圓 治女人下焦寒冷，成帶下赤白濁。

白馬蹄，鼈甲，鯉魚甲，龜甲，蜀椒各一兩。慈石，甘草，杜仲，葶藶，當歸，續斷，川芎，禹餘糧，桑耳，附子各二兩。右十五味爲末，蜜丸梧子大以酒服十九，加至三十九，日三服。一本無鼈甲。

⑧白馬駝散 治婦人帶下。

白馬駝二兩，龜甲四兩，牡蠣一兩十八銖，鼈甲十八銖。右治下篩，空心酒下方寸匕，日三服，加至一匕半。如下白，取白馬者。如下赤，取赤馬者。

⑨雲母芎藭散 治五崩身瘦，欬逆，煩滿少氣，心下痛，面生瘡，腰痛不可俛仰，陰中腫如有瘡狀，毛中癢時痛，與子臟相通，小便不利，常拘急，頭眩，頸項急痛，手足熱，氣逆衝急，心煩不得臥，腹中急痛，食不下，吞酸噎苦，上下腸鳴，漏下赤白，青黃黑汁，大臭如膠，汚衣狀，皆是內傷所致，中寒即下白，中熱即下赤，多飲即下黑，多食即下黃，多藥即下青，或喜或怒，心中常恐，或憂勞便發動，大惡風寒。

雲母，芎藭，代赭，東門邊木燒各一兩。白殭蠶，鷓鴣骨，白堊，蝟皮各六銖。鼈甲，桂心，伏龍肝，生鯉魚頭各十八銖。右治下篩，酒服方寸匕，日三夜一。一方有龍骨，乾薑，一方用龜甲不用鼈甲。

⑩慎火草散 治崩中漏下赤白，青黑，腐臭不可近，令人面黑無顏色，皮骨相連，月經失度，往來無常，小腹弦急，或苦絞痛，上至心兩脅腫脹，食不生肌膚，令人偏枯，氣息乏少，腰背痛連脅，不能久立，每

嗜臥困懶。

慎火草，白石脂，鼈甲，乾薑，細辛，當歸，芎藭，石斛，芍藥，禹餘糧，牡蠣各二銖。黃連，乾地

香研二錢，木香煨二錢半。右爲末，每服二錢，溫酒調下。

④四七湯 治七情鬱結成痰，或如梅核，梗於喉間，或中脘停痰氣痞，或痰壅氣喘，或痰飲中脘，嘔逆惡心，亦治帶下有痰者。

半夏薑製一錢五分，紫蘇葉，厚朴薑製，茯苓各一錢。右薑棗水煎服。

⑤丁香膠艾湯 東垣下同 治崩漏不止，白帶白滑之物多，間如屋漏水下，時有鮮血，自覺臍下如冰，求衣被以禦其寒，右尺脈時微洪。

熟地黃，白芍藥各三分。川芎，丁香各四分。阿膠六分，生艾葉一錢，當歸一錢二分。右川芎爲細末，當歸酒洗剉，熟地黃丁香爲細末，艾亦剉，都作一服，水五大盞，先煎五味作一盞零二分，去粗入膠，再上火煎至一大盞，帶熱，空心服之。

⑥延胡苦楝湯 治臍下冷，撮痛陰冷大寒，白帶下。

黃蘗一分，延胡索，苦楝子各二分。附子炮，肉桂各三分。炙甘草五分，熟地黃一錢。右都作一服，水二大盞，煎至一盞，食前服。

⑦神聖復氣湯 治復氣乘冬足太陽寒氣足少陰腎水之旺，能令母實，手太陰肺實，反來侮土，火木受邪，腰背胛膈，閉塞疼痛，善噎，口中涎，目中泣，鼻中流濁涕不止，或如息肉不聞香臭，欬嗽痰沫，上熱如火，下寒如冰，頭作陣痛，目中流火，視物眈眈耳鳴耳聾，頭并口鼻，或惡風寒喜日陽夜臥不安，常覺痰塞膈咽不通，口失味兩脅縮急而痛，牙齒動搖不能嚼物，陰汗前陰冷，行步欹側，起居艱難，掌中寒，風痺麻木，小便數而晝多夜頻，而欠氣短喘喝，少氣不足以息，卒遺失無度，婦人白帶，陰戶



芎藭，乾地黃，黃芪炙，白芍藥，吳茱萸，甘草各二兩。當歸，乾薑各三兩。右咬咀，以水一斗煮取三升，分三服。若月經後因有赤白不止者，除地黃、吳茱萸，加杜仲、人參各二兩。

⑤小柴胡湯 治肝膽經證，寒熱往來，嘔熱潮熱，默默不欲飲食，或怒火口苦，耳聾欬嗽，發熱脅下作痛，甚者轉側不便，兩脅痞悶，或瀉利欬嗽，或吐酸食苦水，皆用此藥主之。治帶下，亦間用此加減。

柴胡二錢，黃芩炒一錢，人參，半夏各七分。甘草炙五分。右薑水煎服。

⑥補中益氣湯 醫按下同 治元氣虛損，或因剋伐惡寒發熱，倦怠少食，或不能消散生肌，或兼飲食勞倦，煩熱作渴，亦用此加減，治女人帶下。

黃芪炒，人參，白朮炒，甘草，當歸各一錢。陳皮五分，柴胡，升麻各三分。右薑棗煎，空心午後服。

⑦六君子湯 治氣虛有痰，補脾健胃，并治帶下，虛者用此加減。  
人參，白朮，茯苓各二錢。甘草炙一錢。陳皮，半夏，右薑棗水煎服。

⑧歸脾湯 治脾經失血，少寐發熱盜汗，或思慮傷脾，不能攝血，以致妄行，或憂思傷脾，血虛發熱，或肢體作痛，大便不調，或經候不准，帶下，嘔熱內熱。

人參，白朮炒，黃芪炙，白茯苓，龍眼肉，當歸，遠志去心，酸棗仁炒，各一錢。木香，甘草炙，各五分。右薑棗水煎服。

⑨八珍湯 治氣血俱虛及帶下虛者，用此加減。

人參，白朮，白茯苓各二錢。熟地黃三錢，甘草炙，當歸酒拌，芍藥炒，川芎各一錢。右煎服。

⑩龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱兩拘，腫痛或腹中疼痛，或小便澀滯等證，亦用此加減，治帶下。  
龍膽草酒拌炒黃，澤瀉各一錢。車前子炒，木通，生地黃酒拌，當歸酒拌，山梔仁炒，黃芩炒，甘草，

⑤獨聖散 治同上。

瓜蒂不拘多少。右爲細末，每服一錢或二錢，薑汁調服。如脅痛加全蠍。如頭痛加鬱金。

⑥導水丸 治同上。

大黃，黃芩各二兩。滑石，黑牽牛頭末各四兩。右爲細末，滴水丸梧子大，每服五十九，或加至百丸，臨臥溫

水下。

⑦禹功散 治同上。

黑牽牛頭末四兩，茴香一兩炒，或加木香一兩。右爲細末，以生薑自然汁調一二錢，臨臥服。

⑧無憂散 治同上。

黃芪，木通，桑白皮，陳皮各一兩。胡椒，白朮，木香各半兩。牽牛頭末四兩。右爲細末，每服三五錢，

以生薑自然汁調下，食後。

⑨五苓散 治同上。

官桂，澤瀉，豬苓，茯苓，白朮各半兩。右爲細末，每服二錢，熱湯或新水調下。

⑩葶藶木香散 治同上。

苦葶藶，茯苓，豬苓，官桂各一分。澤瀉，木通，甘草各半兩。滑石三錢，木香半錢。右爲細末，每服

三錢，生薑湯調，食前服。

⑪玉燭散 丹溪下同 治赤白帶下，隨宜酌用。

當歸，芍藥，川芎，熟地，芒硝，大黃，甘草，右咬咀，生薑三片煎服。

中大補，牽心而痛，驚黑失色，男子控舉牽心腹陰陰而痛，面如赭色，食少，大小便不調，心煩霍亂，逆氣裏急，而腹皮色白，後出餘氣，腹不能努，或腸鳴膝下筋急，肩胛大痛，此皆寒水來復，火土之讎也。

黑附子，乾薑炮各三分。當歸身六分。防風，榔李仁湯浸去皮尖另研如泥。人參各五分。半夏湯泡七次，川升麻各七分。白葵花，橘皮各五分。甘草，藁本各八分。柴胡，羌活，草豆蔻仁麩裏煨熟去皮，黃芪各一錢。生地黃二分酒洗。黃蘗酒浸。黃連酒浸。枳殼各三分。已上四味，預一日，另用新水浸。細

莘二分。川芎細末。蔓荊子各三分。已上三味，預一日用新水半大盞分作二處浸。右將白葵花已上十三味都作一服水五盞煎至二盞，入橘皮已上三味，再煎至一盞，又入生地已下七味，復上火煎至一大盞，去粗稍熱服。空心忌肉湯，宜食肉，不助經絡中火邪也。

⑤ 搐鼻香 治子宮久冷赤白帶下。

牡蠣煨，紫梢花，韶腦，母丁香，蛇牀子，黃狗頭骨煨，破故紙，桂心各等分。右為細末，煉蜜丸如雞頭大，臨事用一粒。

⑥ 又方 治婦人赤白帶下。

平胃散，黃芪炒分兩各隨宜。右調服。

⑦ 衛生湯 治脾養血亦用此加減，治帶下。

當歸，白芍藥各三兩。黃芪二兩。甘草一兩。右為粗末，每服半兩，水二盞煎至一盞，去滓溫服，空心。如虛者，加人參一兩。

⑧ 十棗湯 治帶下熱滯不散。

右為末，水一盞，煎十枚，劈開煮汁半棗，調藥末半棗，實者一錢七。

⑤ 蠡斯丸 治帶下腥臭多悲不樂

香附，白薇，半夏，茯苓，厚朴，杜仲，當歸，秦艽，各三兩。肉桂，乾薑，牛膝，防風，沙參，各二兩。二錢。細辛，人參，各四錢。右為末，蜜丸，梧子大，每服二十五丸，酒下。

⑥ 芩藥樗皮丸 治瘦人多熱致成帶下。黃藥，樗皮，滑石，川芎，海石，青黛，當歸，芍藥，各等分。右酢糊丸服。

⑦ 芩朮樗皮丸 治孕婦白帶。白朮，各三錢。黃藥錢半，樗皮，白芍，山茱萸，各二錢半。白芷，黃連，各二錢。右為末，酒糊丸，溫酒下。

⑧ 蒼藥辛芎散 治婦人上有頭風鼻涕下有白帶。蒼朮，辛芎，川芎，南星，滑石，半夏，牡蠣，黃芩酒炒。右水煎溫服。

⑨ 龜藥薑梔丸 治赤白帶下或時腹痛。龜板三兩，黃藥一兩，山梔子炒二錢半，乾薑炒一錢。右為末，酒糊丸，白湯下。

⑩ 側柏樗皮丸 治七情所傷脈數白帶下。側柏葉，黃藥酒蒸，黃連各五錢。香附，白朮，白芍，各一兩。白芷燒存性三錢。右為末，粥丸米飲下。

⑪ 蒼藥樗皮丸 治肥人濕痰致成白帶。蒼藥，樗皮丸，海石，半夏，南星，川芎，香附，蒼朮，乾薑，各等分。右為末，酢糊丸，梧子大，每五六十丸，白湯下。如暑月去薑加滑石。

白湯下。如暑月去薑加滑石。

③三花神佑丸 治赤白帶下，隨證酌用。

輕粉一錢，大黃一兩，牽牛二兩，芫花酥炒，甘遂，大戟各半兩。右爲末，滴水丸小豆大，初服五丸，每服加五丸，溫水下，無時，日三。

④小胃丹 治同上。

芫花酥拌勻，過一宿瓦器，不住手攪炒，令黑勿焦。甘遂麪裹，長流水浸半日，水洗曬乾，冬七，春秋五，夏一日。大戟長流水煮一時，水洗曬乾各半兩。大黃濕紙裹煨勿焦，切焙乾酒潤炒乾一兩半。黃蘗三兩焙炒。右爲末，粥丸麻子大，每服二三十丸，臨臥津液吞下，或白湯一口送下，取其膈上之濕痰熱積以意消息之，欲利則空心服。

⑤五積散 入門下同

半夏二分，白芷，川芎，芍藥，甘草，茯苓，當歸，桂各三分。陳皮，麻黃各六分。厚朴，乾薑各四分，桔梗一分半。蒼朮七分半，枳殼五分。右薑葱煎服。如調經入艾酥。如體薄有汗，去蒼朮麻黃。

⑥平胃散 婦人帶下，用此補衛厚脾。

蒼朮二錢，陳皮一錢四分，厚朴薑汁炙一錢。甘草八分。右薑棗，入鹽少許溫服。

⑦二陳湯 治肥人痰濕流下，致成白帶。

半夏一錢，陳皮二錢，茯苓八分，甘草四分。右生薑三片，水煎服。如血虛，合四物湯。如氣虛，合四君子

湯。

⑧黃芪建中湯 治白帶如涕沫，極腥臭。

黃芪，肉桂各七分。甘草一錢半，白芍三錢。右薑棗煎，去渣，入飴糖少許再煎，令饒，空心服。

醫部彙考三百九十八

婦人帶下門二

方二

⑤小烏雞丸 治帶下腥臭，腹痛陰冷。  
 吳茱萸，良薑，白薑，當歸，芍藥，延胡索，補骨脂，陳皮，川椒，青皮，劉寄奴，生地，菘朮，川芎，各一兩。荷葉灰四兩，北艾二兩，烏雞肉。右為末，用烏雞肉煮爛為丸，每五十九丸作一服。如單赤帶，茶清下。

⑥芩朮芍葵丸 治結痰白帶。

白朮二兩，黃芩五錢，紅白葵花二錢半，白芍七錢半。右為末，蒸餅丸，煎四物湯下。

⑦琥珀硃砂丸 治室女帶下。

琥珀，木香，當歸，沒藥各四錢，乳香一錢，麝香，硃砂各二分半。右為末，水丸如龍眼核大，每用一丸，溫酒磨服。

⑧益母膏 治產後赤白帶。

圖書集成醫部全錄 卷三百九十七 彙考三百九十七 婦人帶下門一

二六

⑤補經固真湯 一名補陽固真湯 治始病崩中日久白帶下流不止

柴胡，黃芩， 榔李仁， 甘草，各一錢。 人參， 乾薑，各二錢。 橘皮五分， 白葵花一朵。 右水煎溫服。如赤帶用紅葵花。一方用白葵花十六朵。

⑥四炒固真丹 治婦人崩帶下血，子宮血海虛冷等證。

蒼朮一斤，分作四分：一分用茴香青鹽各一兩炒；一分用川烏川棟各一兩炒；一分用川椒破故紙各一兩炒；一分用酒酢炒，俱以朮黃為度，去各炒藥。 右將各炒藥為末，煮藥酒酢，打糊丸梧子大，每服三十九，淡酢湯下。

⑦清白散 醫鑿下同 治白帶。

當歸， 川芎， 白芍炒， 生地酒洗過薑汁炒。 黃蘗鹽水炒， 貝母， 樗根白皮酒炒，各等分。 乾薑炒黑， 甘草，各減半。 右剉一劑，生薑煎服。如肥人多濕痰，加白朮半夏。如赤帶加酒芩荊芥，久下加熟地牡蠣。如氣虛加入參黃芪。如腰腿痛加鹿角膠，或只以二陳湯加蒼朮白朮。如血虛加芎歸。如升膀胱之濕，二陳加升

麻柴胡蒼朮白朮。

⑧解帶散 治婦人血氣不調，濕熱白帶，四肢倦怠，五心煩熱，痰鬱嘈雜。

歸身一錢半， 白芍酒炒， 白朮炒，各一錢二分。 蒼朮米泔浸炒， 茯苓， 香附酢炒， 丹皮酒洗， 陳皮去白，各一錢。 甘草炙四分， 延胡炒， 川芎，各八分。 右剉一劑，生薑煎，空心服。

⑨八炒丸 治經脈不調，濕氣白帶，腹痛胃弱。

香附便製， 丹皮， 川芎酒炒， 延胡炒，各二兩。 當歸身酒洗， 生地黃薑汁炒， 白茯苓，各二兩。 赤芍藥酒炒一兩半。 右為細末，酒糊為丸如菉豆大，每服五十九，空心滾水下。如腹痛酒下七十九。

⑩固經丸 治赤白帶下屬濕熱者。



益母草，端午日採紫花方莖者，連根洗淨。右於石臼內搗爛，以布濾取濃汁，入砂鍋內，文武火熬成膏如砂糖色為度，磁罐收貯。每服一匙，膠艾湯調下。一方陰乾為末，忌鐵蜜丸，彈子大，每服一九，膠艾湯下。

⑤四君子湯 婦人帶下，脾胃極弱者，用此加減。

人參一錢，白朮，茯苓，各二錢，甘草六分，生薑三片，棗子一枚。右水煎服，不拘時，如有汗，去生薑。

⑥四物湯 治血虛帶下，用此加減。

白芍，熟地，各二錢半。當歸，川芎，各二錢。右煎服。

⑦桂枝湯 古方治帶下，間用此加減以固衛氣。

桂枝，白芍，各三錢。甘草一錢。右薑棗煎服。

⑧理中湯 古方治帶下，間用此加減以燥水健脾。

甘草一錢半，人參，白朮，乾薑炮，各二錢。右薑棗煎服。

⑨升陽燥濕湯 治白帶下，陰戶痛，控心急，痛身黃，皮緩，身重如山，陰中如水。

柴胡一錢二分，防風，良薑，乾薑，榔杏仁，甘草，各一錢。陳皮，黃芩，各五分。白葵花七朵。右分作

二貼，水煎服。

⑩升陽調經湯 治夏月帶下，脫漏，及飲食勞倦，暴崩不止等證。

獨活五分，蔓荊子七分。當歸，防風，甘草，升麻，藁本，各一錢。柴胡，羌活，蒼朮，黃芪，各一錢半。

右空心水煎服，以飯壓之。

⑪半夏丸 古方治帶下，用此加減以燥水健脾。

半夏香油炒。右為末，粥丸梧子大，每服三五丸，薑湯下。

三柰，川烏，大椒各五分。全蠟三箇，柴胡，羌活各二錢，白礬枯三分，升麻二分，大蒜一破故紙與蒜同焙，各一錢。麝少許。右爲末，煉蜜丸彈子大，綿裹，留係在陰外，內陰中。

④導痰丸 元珠方 帶有痰者兼服此。

甘遂製，百藥煎各二兩。全蠟，殭蠶各一兩。大半夏六兩，分作三分：一分用白礬，一兩爲末浸水；一分用肥皂角爲末浸水；一分用巴豆肉一百粒爲末浸水。餘藥在下，半夏在上，浸至十日或半月，要常動水令二藥相透，次相合處揀去巴豆并皂角，將餘水以慢火養令水乾，取出半夏切，搗碎曬乾，或陰乾亦佳。右爲細末，薄糊丸如梧子大，每服十九或十五丸，亦量人虛實，白湯下。

⑤萬靈膏藥 醫貫 證貼丹出，破一百二十手，治元氣虛弱，女人赤白帶下，子宮虛冷，血山崩等。

香油四斤，白芷，赤芍，大黃，黃連，白芍，兩頭尖，草烏，元參，川芎，生地，川椒，胎髮頭生男者，穿山甲，熟地，杏仁，槐角，黃蘗各一兩。歸尾二兩，木鼈子五十箇去殼，黃香十二兩化開，傾米泔水九次，蓖麻子去殼，巴豆各一百二十粒去殼。以上各咀片入油內浸，春五日，夏三日，秋七日，冬十日，取傾鍋內，熬枯黑色，濾去渣，將淨油入鍋，文武火熬滴水成珠，方細退火，黃丹二斤飛過焙乾，徐徐下，以槐柳桃杏楮各二枝，不住手攪，再下黃香，去火少冷，又下後細藥攪勻，將好瓶貯之，放水內浸一七出火氣，用時放滾水內，頓化攪開細藥列後。阿魏，丁香，沉香各一兩。麝香二兩，血竭，孩兒茶，乳香，沒藥各三兩。珍珠製五錢，琥珀三錢。右各爲極細末，入前膏內。

⑥七味白朮散 醫按下同 治帶下中氣虛口乾或吐瀉等證，用此加減。

人參，白朮，木香，甘草，藿香，白茯苓，乾葛各一錢。右作一劑，水煎服。

⑦人參黃芪湯 治帶下氣血虛，并血下不止等證，用此加減。

白朮七錢，香附炒，黃蘗各一兩炒。龜甲炒，梔子各二兩炒。貝母，乾薑炒各二錢。苦參，山茱萸肉，樗根白皮酒炒各五錢。白芍七錢半。右為末，酒糊為丸如梧桐子大，每服八十九，空心滾水送下。

⑤玉仙散 治赤白帶下屬寒者。

乾薑炒，香附炒，白芍炒各一兩。甘草生五錢。右為末，每服三錢，空心黃酒送下。

⑥朝元散 治赤白帶下，腹臍冷痛，子宮虛寒。

白芷，陳皮，厚朴，枳殼，桔梗，川芎，白芍，當歸，茯苓，蒼朮，半夏，乾薑，官桂，香附，吳茱萸，小茴香，甘草。右剉一劑，生薑三片，棗一枚，水煎空心服。一方加乳香沒藥各二錢半，烏藥一兩，酒煎入米糖一斤，早晚隨量飲酒，大效。

⑦四神丸 治白帶。

香附米八兩，酒酢量便各浸二兩，浸三日炒。砂仁去殼炒，蒼朮米泔水浸透，牡蠣粉炒，椿根白皮各二兩，蜜水炒。右為末，黃米煑飯為丸，如梧子大，每服五六十丸，空心黃酒送下。

⑧三氣丹 治赤白帶下。

舶硫黃鎔化傾水中如此七次，硃砂，官桂，乾薑各一兩炮。大附子麪包煨去皮五錢。鹿茸二兩，酢炙，麝香一錢。右為末，酢糊為丸如梧子大，每服三十九，空心鹽湯送下。如虛勞發熱，先以四物湯四錢，小柴胡湯六錢，合和煎服，後用十全大補湯。

⑨又方 治婦人赤白帶下，上熱下寒，口出惡氣，咽乾牙痛，耳鳴，上下流注疼痛，發熱憎寒，口吐酸水。

嘈雜惡心，心腹氣痛，時下五色相雜，來而無度，面黃肌瘦，不思飲食。

當歸，川芎，赤芍，生地，陳皮，半夏薑炒，茯苓，蒼朮米泔浸炒，香附童便浸炒，柴胡，升麻，黃

和劑固陽丸 治帶下不止間用着血固血藥煎湯吞此

黑附子炮三兩，川烏頭炮二兩，白龍骨一兩，補骨脂，舶上茴香，川棟子各一兩七錢。右為末，酒糊丸。

如梧子大，每服五十九，空心溫酒送下。

④人參順氣散 婦人真方 證治要訣治赤白帶下用順氣散恐即此。

人參，川芎，桔梗，白朮，白芷，麻黃去節，陳皮，枳殼，烏藥，白薑炮，甘草炙各一錢。右水二鍾，煎至一鍾，或為細末，食前用甘草湯調服。

⑤加減人參黃芪湯 醫統 治帶下虛滑之證。

人參黃芪湯，芍藥酢炒，牡蠣粉，禹餘糧。右分兩隨宜水煎服。

⑥樗皮丸 準繩下同 治赤白帶有濕熱者。

芍藥五錢，良薑三錢燒灰，黃蘗二錢炒成炭，樗根皮一兩半。右為末，粥丸，每服三五十丸，空心米飲吞下。

⑦又方 治赤白帶因濕熱勝而下者。

滑石炒，蒼朮鹽炒，白芍各一兩，樗根皮炒，乾薑煨各二兩，地榆半兩，枳殼，甘草各三錢。右為末，用粥和丸，米飲下。

⑧又方 治帶下。

樗根皮二兩，神麴炒，蒼朮泔浸，青皮麴炒，黃蘗炒各一兩，芍藥兩半，滑石，枳殼各半兩。右為末，糊丸，桐子大，每服五十九，空心下。

⑨固腸丸 治濕氣下利，大便血，白帶，去脾胃陳積之後，用此以燥下濕。亦不會單用，看病作湯使。

樗根皮二兩，神麴炒，蒼朮泔浸，青皮麴炒，黃蘗炒各一兩，芍藥兩半，滑石，枳殼各半兩。右為末，糊丸，桐子大，每服五十九，空心下。

人參，黃芪炒，當歸，白朮炒，白芍炒，艾葉各一錢。阿膠炒二錢。右作一劑，水煎服。

⑤六味丸 一名地黃丸治帶下兼腎虛發熱作渴唾痰小便淋瀝頭運眼花咽燥唇裂齒不堅固腰

腿酸等證用此兼服。

熱地黃八兩，山萸，山藥各四兩。白茯苓，澤瀉，丹皮各三兩。右煉蜜丸梧子大，食前服。

⑥加味逍遙散 治帶下肝家有熱者用此加減。

甘草炙，當歸炒，芍藥酒炒，茯苓，白朮炒，柴胡各一錢。丹皮，山梔炒各五分。右水煎服。

⑦補宮丸萬氏下同 治帶下元虛脫者用此固之。

鹿角霜，白朮，白朮，白芍，白芷，龍骨煨，牡蠣煨童便淬，山藥炒，赤石脂煨各等分。乾薑炒減半。

右酢糊丸空心米飲下。

⑧三補丸 治赤帶兼服此丸。

黃芩，黃連，黃蘗各炒等分。右蜜丸白湯下。

⑨四物加芩連湯 帶下熱盛者用此。

四物湯，赤芍，黃芩炒，黃連炒各一錢。甘草生五分。右水煎服。

⑩加味六君子湯 治白帶。

陳皮，半夏泡，蒼朮泔水浸，人參各一錢。白朮一錢五分，白茯苓一錢二分，炙草七分，升麻，柴胡各

五分。右薑水煎服。

⑪震靈丹 一名紫金丹治婦人血氣不足崩漏虛損帶下虛冷胎臟無子。

滴乳香另研，五靈脂，沒藥並去砂石各二兩。朱砂飛一兩，禹餘糧火煨酢淬手撚得碎為度。紫石英，

代諸石如禹餘糧炮製，赤石脂以上四味並作小塊入鍋內鹽泥固濟候乾用炭十斤煨通紅火盡為度入地埋

鹿角霜，白茯苓，白芷，白朮，鱧鱠魚骨，白芍藥，牡蠣粉，白薇，山藥各等分。右爲末，糊丸梧子大，米飲下五十九。

⑤白礬丸 準繩下同 治婦人赤白帶下，久不瘥，肌瘦痿黃，及經年崩漏不止，諸藥不效，脈濡微，與前伏

龍肝散兼服即愈。

白礬四兩，附子二兩，黃狗頭骨四兩燒灰。右爲末，粥丸桐子大，每服三十九。

⑥補真潤腸湯 一名助陽湯，治白帶下，陰戶中痛，控心而急痛，面黃皮緩，身重如山，陰中如冰。

柴胡一錢二分，良薑二錢，白葵花七朵，防風，榔李仁，乾薑，甘草各一錢，陳皮，生黃芩各五分。右爲細末，只作一服，水二盞煎至一盞，去滓，食前熱服。按葵花榔李仁之滑以潤燥，蓋枯涸滯著者宜之。

⑦又方 丹溪下同 治白帶。

龜板炙，枳子各二兩，黃蘗一兩炒，香附子，山茱萸肉，苦參，樗根白皮，貝母各半兩。白芍藥七錢半，乾薑炒二錢半。右爲末，以酒糊爲丸，空心米飲下。

⑧又方 治赤白帶。

龜板塗酒炙二兩，黃蘗炒一兩，乾薑炒一錢，枳子二錢半。右爲末，酒糊爲丸，日二服，每服七十九。

⑨又方 治帶下脈數者。

枸杞根一斤，生地黄五兩，右二味，以水一斗，煮取五升，分三服。已上三方治帶，用龜板黃蘗地黃，蓋腎水真

陰虛者宜之。

⑩白藪丸 濟生方 治室女衝任虛寒，帶下純白。

椿根皮。右為末，粥糊為丸。服按此藥，性涼而燥，須炒用。一方加滑石一半。

⑤又方 治白帶因七情所傷脈數者。

黃連炒，側柏葉酒蒸，黃蘗炒，各半兩。白芍，香附子酢炒，白朮炒，各一兩。白芷燒存性，木香，各三錢。椿根皮二兩炒。右為末，飯粥為丸，米飲湯送下。已上五方，治帶俱用。椿皮，乃涼燥之劑，濕熱盛者宜之。後一方有黃連香附木香，故可治七情所傷。

⑥乳香散 治赤白帶下。

草果一枚去皮，入乳香一小塊，用麵餅裹，火炮焦黃，取出和麵用之。右為細末，每服二錢，陳皮飲調下，重者三錢。

⑦伏龍肝散 治赤白帶下，久患不瘥，尪悴乏力，六脈微濡。

伏龍肝炒令煙盡，屋梁上懸塵炒令煙盡，櫻欄燒赤存性。右並出火毒，等分研勻，入腦麝各少許，每服三錢，溫酒或淡酢湯下。患十年者，半月可愈。

⑧馬蹄丸 治白漏不絕。

白馬蹄，禹餘糧，各四兩。龍骨三兩，白殭蠶，鷓鴣魚骨，赤石脂，各二兩。右為細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服十九，空心酒送下，不止加三十九。

⑨白芷散 治赤白帶下。

白芷二兩，海螵蛸二箇煨，胎髮一箇煨。右為細末，空心溫酒調下二錢。

⑩牡蠣散 治帶下兼經水過多，或暴下血片，不限年月遠近。牡蠣，龍骨，赤石脂並煨，肉蓯蓉酒浸切焙，石斛，鷓鴣骨去甲，黃芪，各兩半。牛角腮灰，阿膠炒，

芥山藥 橘紅 乾生薑 白龍骨 木香 白朮 牛膝酒洗 枳殼麩炒 肉豆蔻 厚朴製各半兩 右爲細末，煉蜜和丸如梧桐子大，每服二十九，空心溫酒下。若心腹痛，白芷煎酒下。

⑤紫桂丸 補益血海，治衝任氣虛，經脈不調，腰痛腹痛，冷帶崩漏。

禹餘糧火煨，酢淬七次三兩 龍骨 艾葉酢炒 赤石脂 牡蠣煨 地榆各二兩 厚朴 當歸 牡丹皮

阿膠蛤粉炒成珠子 吳茱萸湯洗 香白芷 肉桂去粗皮各一兩 附子炮半兩 右爲末，麵糊爲丸，梧桐子大，每服三十九，濃煎酢湯下。

⑥固真丸 治白帶久下不止，臍腹冷痛，其寒捫之如冰，陰中亦然。目中溜火上壅，視物眊眊無所見。

齒皆惡熱，飲卽痛，須得黃連末擦之，其痛乃止。惟喜乾食，大惡湯飲。

白石脂燒赤，水飛研細曬乾 柴胡各一錢 白龍骨酒煮水飛曬乾二錢 當歸酒洗三錢 乾薑炮四錢 黃

蘖酒洗 白芍各五分 右爲細末，水煮稀糊，爲丸如雞頭大，每服三十九，空心宿食消盡，煎百沸湯放溫送下，無

令胃中停住，待少時以早膳壓之，是不令熱藥犯胃，忌生冷硬物與酒濕麵。按石脂龍骨之澀，以去脫也，蓋濕多滑

脫者宜之。

⑦茅花散 治婦人血崩不止，赤白帶下。

茅花一握 棕櫚樹皮三寸 嫩荷葉三張 甘草節二寸 右爲細末，空心酒調半匙服。

⑧苦棟丸 治婦人赤白帶。

苦棟碎酒浸 茴香炒 當歸各等分 右爲末，酒糊丸，每服三十五丸，空心溫酒下。如腰腿疼，四物湯四兩，加

羌活防風各一兩，煎湯送下。



鹿茸酒蒸焙二兩，白薇，狗脊燎毛製各一兩。右為細末，艾煎酢汁，打糯米糊丸如梧子大，每服五十九，空心溫酒送下。

③當歸煎 準繩下 治赤白帶下，腹內疼痛，不欲飲食，日漸羸瘦。續斷酒浸，各一兩。地榆半兩。右

當歸酒浸，赤芍藥，牡蠣火煨取粉，白芍藥，阿膠，熟地黃酒蒸焙，各一兩。

為末，酢糊丸如梧子大，每服五十九，空心米飲下。

④茯苓散 治婦人血傷，兼帶下，積久不止，面黃體瘦，漸成虛勞，腰脚沉重，胎氣多損。赤石脂，鰾魚骨

白茯苓，菖蒲，木香，熟地黃焙，訶黎勒皮，柏子仁研，杜仲炙，青橘皮去白焙，赤石脂，各一兩。右為細末，每服二錢，

去甲，五加皮剉，艾葉燒灰，秦芫，牛角鯁灰，兔絲子酒浸另搗，當歸焙，各一兩。

溫酒調下，糯米飲亦得。如有胎息，用鯉魚糯米粥下藥。

⑤卷柏丸 治婦人室女腹臍冷熱相攻，心腹絞痛，腰腿疼，赤白帶下，面色痿黃，四肢羸乏。當歸酒浸炒，

卷柏酢炙，鹿茸酢炙，桑寄生，艾葉酢炒，白石脂，赤石脂，代赭石各火煨酢淬七次。

芎藭，鼈甲酢炙，地榆各一兩。木香不見火，龍骨各半兩。乾薑炮七錢半，黃芪蜜炙，熟地黃洗，各一

兩半。右為細末，酢煮糯米糊，和丸如梧子大，每服七十九，空心米飲送下。

⑥艾煎丸 治婦人一切虛寒，胎前產後，赤白帶下，或成血瘕，久服此藥，自然融化。

伏道艾葉去塵土枝梗，先用大棗肉十二兩煮爛，同艾葉搗爛如泥，捻作薄餅，猛火焙乾，急碾為末。漢椒去目枝

梗及合口者，秤各五兩，以阿膠二兩米酢三升，同椒於砂瓶內煮極乾，取出焙乾燥為末。當歸酒浸，川芎，白

薇，附子大者炮去皮臍，白芍藥，卷柏取青葉，澤蘭葉去枝梗各焙乾，熟地黃淨洗漉去浮者，曬乾酒浸

藥，再入酒浸藥五七次，如糖煎香美方可用。亦焙乾秤各缺兩。右同為細末，與前艾末椒末拌勻，米酢煮糊和

白芍藥二兩，乾薑半兩。右各炒黃色，同爲末，空心米飲調下二錢，日二服。

㊟二豆散

治耳鳴心躁，腰脚疼重，腹內虛鳴，臍下虛冷，頻下白水，如泔渾濁。

白豆蔻，肉豆蔻，丁香，茯苓，巴戟，丁皮，蒼朮，黑附子煨，桂心，各一兩。人參，白朮，山藥，桔梗，茴香，粉草各半兩。右剉碎，每服三錢，水一盞半，生薑三片，紫蘇葉三片，同煎至七分，去渣，空心溫服。

㊟鶴頂丸

治室女經水初下，或浴冷水，或熱而扇，或當風及婦人陰陽過多，血水相連而下，并產後

帶下。

當歸七錢半酒浸。附子半兩炮去皮，乾薑炮，龍骨鹽泥煨，吳茱萸湯泡，赤石脂酢煨火淬，各一兩半。

牡蠣一兩三錢鹽泥煨，艾葉一兩酢煮。右爲細末，研勻，酢糊和丸如梧子大，以赤石脂末爲衣，每服五十九，空心用艾葉鹽湯或烏梅煎湯下。

㊟白聖丸

治婦人白帶久而不止，腰膝冷痛，日漸羸困。

白聖煨，禹餘糧，鼈甲，鰾骨各用酢淬炙，當歸酒浸，鵲巢灰，乾薑，附子炮，狗脊製，紫石英酢煨，淬七次，川芎，鹿茸酢炙，各一兩。香附酢煮二兩。右爲末，用酢煮糯米糊丸如梧子大，每服七十九，溫酒下。

㊟養氣活血丹

治勞傷衝任，赤白帶下。

大艾葉炒焦取五兩，乾薑炒末二兩半，附子，白芍藥，白朮，橘紅，川芎，當歸，人參，巴戟去心糯炒，五味子各二兩。右將乾薑艾二味，用酢二升，無灰酒二升，生薑自然汁二升，將乾薑艾末調於銀器內，用慢火熬成膏，將下附子等九味爲細末，入前膏內并炒熱，熟白麵二兩半和爲劑，杵千下，丸梧子大，每服五十九，溫

③地榆膏 治赤白帶下骨立者。

地榆一斤。右用水三升煎至一半，去渣再煎如稠餳，絞淨空心服三合，日二服。一方用地榆三兩，酢水煎服。按治帶用地榆寒澀之劑也，亦濕熱盛而滑脫者宜之。又方書云地榆本血分之藥，而其性寒，故凡血分有熱而妄行者能止之，非澀劑也。

④豆花散 治婦人白崩。

白扁豆花焙乾 右為末，炒米煮飲入燒鹽，空心服，數次即效。紫花勿用。

⑤調經補真湯

冬後一月微有地泥冰泮，其白帶再來，陰戶中寒，一服立止，大進飲食。

麻黃五分不去節，人參 白朮 當歸 黃芩 升麻根 甘草炙各五分 杏仁三枚 澤瀉 良薑各一錢。

黃芪七分 桂枝少許 乾薑炮 蒼朮各二分 柴胡 羌活各四分 防風 獨活 藜蘆各二分 白葵

花七朵去萼 右除黃芩麻黃外，都為粗末，先將水二盞煎麻黃一味，令沸，掠去沫，入餘藥同煎至二盞，再入生黃

芩煎至一盞，去渣稍熱服，空心宿食消盡，日高服之一，時許可食早膳。

⑥本事地黃丸

治婦人月經不調，每行數日不止，兼有白帶，漸漸瘦悴，飲食少味，累年無子。

熟地黃二兩 山茱萸 白朮 白芍藥微炒 乾薑 代赭石火煨酢淬各一兩 厚朴薑炙 白殭蠶各半

兩 右細末，煉蜜丸，桐子大，每服四五十九，空心酒下，日三服，此龐老方也。

⑦桂附湯 治白帶腥臭，多悲不樂大寒。

肉桂一錢 附子三錢 黃蘗 知母各五分 右為粗末，作一服，水二盞煎至一盞，食遠熱服。如少食常飽，有

時似腹脹，加白芍藥五分。如不思飲食，加五味子二十箇，如煩惱面上麻木如蟲行，乃胃中元氣極虛，加黃芪一

升同煮至酒盡爲度，炭火焙乾，同爲極細末，又將炒黃鹽以下九味細末之，共合一處拌勻，酒煮麵糊爲丸，桐子如大，每服二十九，空心宿食消盡，淡酢湯下，忌油膩冷物酒麵。

⑤溫經湯 治曾經半產，瘀血在少腹，脣口乾燥，帶下。

吳茱萸三兩，當歸，芎藭，芍藥，人參，桂枝，阿膠，牡丹皮，生薑，甘草，各二兩。半夏半升，麥門冬一升。右十二味，以水一斗，煮取三升，分溫三服。一方用肉桂不用桂枝。按此方，亦主婦人少腹寒，久不受胎，兼治崩中去血，或月水來過多，及至期不來。

⑥益母散 治帶下赤白，惡露下不止。

益母草開花時採。右搗爲細末，空心溫酒下二錢，日三服。

⑦香礬散 治帶下。

香附子不拘多少，極酸酢浸一宿，炒炭存性一兩。白礬二錢。右爲細末，每服二錢，米飲調服，空心神效。一法用

荷葉湯尤妙。

⑧毒瑀丸 治赤白帶下不止。

毒瑀，續斷，各一兩。安息香，麒麟竭，乳香，沒藥，各半兩。故錦灰七錢半。右爲細末，以蜜及安息香熬

和藥末丸如菉豆大，每服二十九，食前溫酒送下。

⑨白芍藥散 綱目 治赤白帶久不止。

白芍藥二兩，乾薑五錢。右各炒黃色爲末，米飲調下二錢，日二。

⑩神仙聚寶丹 治婦人血海虛寒，外乘風冷，搏結不散，積聚成塊，或成堅瘕，及血氣攻注，腹脅疼痛， 91

酒或米飲下。

㊟ 茱萸湯 治下焦虛冷，臍腹疼痛，帶下五色，月水崩漏，淋瀝不動。

吳茱萸湯泡，杜仲炒去絲，蛇牀子，五味子，丁香，各一兩。木香，丁香，各半兩。右剉如麻豆大，每用半兩，以生絹袋盛水三大碗煎數沸，乘熱熏下部，通手淋浴，早晚二次熏洗。

㊟ 坐藥龍鹽骨 治同上。

丁香，木香，川烏頭炮，各一錢半。全蠍五枚，龍骨，歸尾，茴香，炒黃鹽，酒防己，肉桂，紅豆，各二錢。延胡索五錢，厚朴三錢，良薑，木通，各一錢。枯礬半錢。右為末，煉蜜丸彈子大，綿裹，留繫在外，納陰戶內。

㊟ 勝陰丹 為上藥力小，再取三錢，內加行性熱藥。

三奈子，川烏頭，大椒，各五分。全蠍三箇，柴胡，升麻，枯白礬，羌活，各二錢。大蒜，破故紙與蒜同焙，各一錢。甘松三分，麝香少許。右為細末，同前法用製。

㊟ 回陽丹 治同上。

全蠍，升麻，甘松，各二分。大椒，三奈子，葶藶，枯礬，各五分。草烏頭，羌活，各三分。川烏頭，柴胡，各七分。大蒜，破故紙，各二錢。水蛭炒焦，蠱蟲，各三枚，去翅足炒。炒黃鹽一錢。右為極細末，依前法製。如指尖大，用絲裹納陰戶中，覺臍下煖為效。按炒黃鹽必用之藥，去之則不效。

㊟ 酒煮當歸丸 治癩痢白帶下，疰脚氣腰已下，如在冰雪中，以火焙炕，重厚絲衣蓋上，猶冷不任，面

白如枯魚肌，如刀削，小便不止，與白帶長流而不禁固，自不知覺，目青藍如菜色，睞眦無所見，身重

如山行步欹側，不能安地，腿膝枯細，大便秘結，口不能言，無力之極。食不下，心下痞煩，心懊憹，面停

④又方丹溪 治有孕白帶  
蒼朮三錢，山茱萸去核，白芍藥各二錢半。黃芩炒，白芷各二錢，樗皮根炒，黃連炒，黃蘗炒各一錢半，右爲末，糊丸，空心溫酒下五十九。

### 單方

婦人白帶，用酒及艾葉煮雞卵，日日食之。袖珍方。

五色帶下，白馬左蹄燒灰，酒服方寸匕，日三。外臺。

婦人帶下，羊脛一具，以酢洗淨，空心食之，不過三次，忌魚肉滑物，犯之卽死。外臺。

赤白帶下，常炙豬腎食之。張文仲方。

赤白帶下，白果蓮肉江米各五錢，胡椒一錢爲末，烏骨雞一隻，如常治淨，裝木瓜於腹，煮熟，空心食之。

女人白帶，椿根白皮滑石等分爲末，粥丸梧子大，每空腹白湯下一百丸。

白帶不止，槐花炒牡蠣煨等分爲末，每酒服三錢，取效。摘元方。

赤白帶下，銅錢四十文，酒四升，煮取二升，分三服。千金下同。

婦人帶下，水和雲母粉方寸匕服，立見神效。

婦人白帶，苦草煎湯服。本草。

婦人白帶，松香五兩，酒二升，煮乾，木臼杵細，酒糊丸如梧子大，每服百丸，溫酒下。摘元方。

五色帶下，飯帶煮汁，溫服一盞，日二服。千金。

赤白帶下，炒黃荊子爲末，酒調下二錢，或米湯亦可。丹溪。

小腹急脹，或虛鳴，嘔吐涎沫，頭旋眼花，腿膝重痛，面色痿黃，肢體浮腫，月候欲行，先若重病，或多或少，帶下赤白，崩漏不止，驚怖健忘，小便頻數，或白時見虛熱盜汗羸瘦，此藥不問胎前產後室女，並皆治之。常服，安心去邪，逐敗血，養新血，令有子。

木香另研，琥珀另研，當歸焙，沒藥，各一兩。滴乳二錢半研，麝香研，辰砂研，各一錢。右為末，糯米糊杵為丸，每一兩作十五丸，每一丸溫酒磨下，不拘時服。如胎息不順，腹內疼痛，一切產難，酒和童便磨下。如產後血運，敗血奔心，口噤舌強，或惡露未盡發，渴面浮，煎烏梅湯和童便磨下，如室女月候不調，溫酒磨下半丸。如產後血氣不調，童便磨下。

⑤又方丹溪 治赤白帶下，腰痛或小腹痛，有熱者。

樗皮二兩，延胡索，桃仁，側柏葉，川棟肉，茴香，當歸各半兩。香附八錢，官桂去粗皮，烏藥各三錢。麥皮麴一兩炒。右為末，酒糊為丸，每服五六十丸，神效。

⑥麒麟竭湯準繩 治婦人血傷，赤白帶下，小腹痛。

麒麟竭另研，黃蘗去粗皮炙，地榆各一兩。禹餘糧火煨酢淬七次，赤芍藥炒，各一兩半。熟地黃切炒，四兩。右剉碎，每服二錢，水一盞，煎至七分，去渣，不拘時服。一方為細末，粥飲調下二錢。一方用生乾地黃。

⑦白芷丸入門

治帶下，腸有敗膿，淋露不已，腥穢殊甚，遂至臍腹更增冷痛，此為敗膿血所致，須以

此排膿。

單葉紅蜀葵根二兩，白芷一兩，白芍藥，白枯礬各五錢。右為末，蠟丸梧子大，空心米飲下十五丸，俟膿盡，別以他藥補之，如無葵根，以蘇木節代之。

⑧當歸附子湯準繩 治臍下冷痛，赤白帶下。

婦人白帶白雞冠花腸草各等分，白芷心酒用三錢，亦可存月經。

下血崩，或五色漏帶，香附子去毛炒焦為末，極熱酒服二錢立愈。昏迷甚者三錢，米飲下。亦可加櫻灰。本事方。

赤白帶下，及血崩不止者，香附子赤芍藥等分為末，鹽一捻，水二盞煎一盞，食前溫服。聖惠下同。

婦人帶下，臍腹冷痛，面色痿黃，日漸虛困，用葵花一兩，陰乾為末，每空心溫酒服二錢匕，赤帶用赤葵，白帶用白葵。

赤白帶下，石菖蒲破故紙等分炒為末，每服二錢，更以菖蒲浸酒調服，日一。婦人良方。

赤白帶下，三葉酸草陰乾為末，空心溫酒服三錢。千金下同。

崩中赤白帶下，用墓頭回草一把，酒水各半盞，童尿半盞，新紅花一捻，煎七分，臥時溫服。日近者一服，久則三服愈，其效如神。

赤白帶下，蕎麥炒焦為末，雞子白和丸，梧子大，每服五十九，鹽湯下，日三服。

女人帶下，赤白薤白作羹食之。

赤白帶下，韭根搗汁和童尿露一宿，空心溫服取效。海上仙方。

又方，白扁豆炒為末，米飲調服二錢。

女人帶下，用韭子七升，酢煮干沸，焙研末，煉蜜丸，梧子大，每服三十九，空心溫酒下。

赤白帶下，槿根皮二兩切，以白酒一碗半煎一碗，空心服之。白帶用紅酒甚妙。纂要。

婦人赤帶下，懸鉤子根皮濃煮汁飲之。藏器。

崩中赤白，不問遠近，取槐枝燒灰，食前，酒下方寸匕，日二服。深師方。

婦人白帶，百草霜一兩，香金墨半兩，研末，每服三錢，豬肝一葉，批開入藥在內，紙裏煨熟細嚼，溫酒送之。永類方。

崩中白帶，用椒目末，又用白芷石灰炒去灰為末，茜草少許，粥丸服。丹溪下同。

又方，用生狗頭骨燒灰存性，或酒調服，或入藥服。



赤白帶下，檣子石菖蒲等分爲末，每日鹽酒溫服二錢。經驗方。

赤白帶下，桑耳切碎，酒煎服。圖經。

赤白漏下，礬石火鍊服之。良本草。

赤白帶下，禹餘糧火煨酢淬，乾薑等分。赤下乾薑錢半爲末，空心服二錢。勝金方。

赤白帶下，多年不止，石燕每日磨汁飲之，一枚用三日，以此爲準亦可爲末，水飛過，每日服之，半錢至一錢，米飲服，

至一月諸疾悉平。本草。

婦人白帶，多因七情內傷，或下元虛冷所致，沙參爲末，每服二錢，米飲調下。要訣。

婦人五色帶下，以麪作煎餅七箇，安於燒赤黃古磚上，以黃芩裏傅麪上，安布兩重，令患者坐之，令藥氣入腹熏之，

當有蟲出如蠶子，不過三五度瘥。

白帶沙淋，白雞冠花苦壺盧等分，燒存性，空心火酒服之。摘元方。

婦人白帶，白芷四兩，以石灰半斤，淹三宿，去灰切片炒研末，酒服二錢，日二服。集成。

赤白帶下，月水不來，用蛇牀子枯白礬等分爲末，酢麪糊丸彈子大，臙脂爲衣，綿裏納入陰戶，如熱極再換，日一次。

子和。

赤白帶下，苦參二兩，牡蠣粉一兩五錢爲末，以雄豬肚一箇，水三盃，煮爛搗泥，和丸梧子大，每服百丸，溫酒下。積德

赤白帶下，年深諸藥不能療者，用貫衆狀如刺蝟者一箇，全用不剉，只揉去毛及花萼，以好酢蘸濕，慢火炙令香熟，

候冷爲末，米飲空心每服二錢，甚效。婦人良方。

白帶白淫，風化石灰一兩，白茯苓三兩爲末，糊丸梧子大，每服二三十丸，空心米飲下。摘元方。

赤白帶下，夏枯草花開時，采陰乾爲末，每服二錢，米飲下。摘元方。

赤白帶下，夏枯草花開時，采陰乾爲末，每服二錢，米飲下。摘元方。

李杲十書曰：婦人赤白帶，三陰交刺入五分，灸三十壯。

又法：漏陰刺入五分，灸三十壯，穴在內踝下五分，微有動脈。

朱震亨心法曰：婦人得子，多變成白水淋漓而下，經久，身面虛腫，刺陰谷入二寸半。

又法：絕骨穴刺入二寸半。

又法：如喘滿，刺魚際穴，透太淵穴，左右共四十九呼，治肺經水氣極妙。

證治準繩曰：赤白帶，刺中極入二寸半，赤瀉，白補，白環俞一寸半，瀉六吸，補一吸。

又法：氣海中極，白環俞三穴不效，取陽交穴，補多瀉少，灸七壯，又取三陰交。

又法：下白帶不已，漸漸如蠱，取氣海穴六分，中極委中二穴各五分，赤帶如法。

又法：下白帶不已，漸漸如蠱，取曲骨承陰二穴各七分，中極六分，穴在兩旁柱骨下，赤帶如法。

又法：四花穴治赤白帶如神。

### 醫案

儒門事親曰：息城李左衛之妻，病白帶如水，窈漏中，綿綿不絕，穢臭之氣不可近，而黃食減，已三年矣。諸醫皆云：積冷起石，硫黃薑附之藥，重重燥補，污水轉多，常以禡日易數次，或用一藥以木炭十斤置藥在坩鍋中，墮泥封固，三日三夜，炭火不絕，燒令通赤，名曰火龍丹，服至數升，污水彌甚，灼艾燒針，三年之間，不可勝數。戴人斷之曰：「此帶濁水本熱，乘太陽經，其寒水不可勝如此也。夫水自高而趨下，宜先絕其上源。」乃涌痰水二三升，次日下污水十餘行，三遍汗出周身。至明日，病人云：「汚已不下矣。」次用寒涼之劑，服及半載，產一子。內經曰：「少腹冤熱，洩出白液，帶之為病，溶溶然若坐水中，故治帶下同治濕法，瀉利皆宜，逐水利小溲，勿以赤為熱，白為寒。」今代劉河間書。

又方。五靈脂半生半炒末之，酒調服。

崩中帶下，訶黎勒和蠟燒煙熏之，及煎湯熏洗。本草。

赤白帶下，不問老稚孕婦，悉可服。取馬齒莧搗汁三大合，和鷄子白二枚，先溫令熱，乃下莧汁，微溫頓服之，不過再

作即愈。海上方。

赤白帶下，以猪肝一葉，薄批搵著，訶子末炙之，再搵再炙，盡末半兩，空腹細嚼，陳米飲送下。本草。

女子白帶，陳冬瓜仁炒爲末，每空心米飲服五錢。救急易方。

### 鍼灸

甲乙經曰：婦人乳子下赤白，腰俞主之。

婦人下赤白，沃後陰中乾痛，惡合陰陽，少腹臙堅，小便閉，曲骨主之。一本作風骨。

婦人下赤白，裏急瘰癧，五樞主之。

女子下蒼汁，不禁赤瀝，陰中癢痛，少腹控眇，不可俯仰，下窳主之。刺腰尻交者，兩脾上以月死生爲瘡數，發鍼立已。

女子疝瘕，按之如以湯沃兩股中，少腹腫，陰挺出痛，經水來下，陰中腫或癢，漉青汁若葵羹，血閉無子，不嗜食，曲泉

主之。

千金方曰：月事不利，見赤白而有身，反敗陰寒，刺行間入六分，灸三壯。穴在足大趾間動脈應手。

赤白裏急瘰癧，刺五樞入一寸，灸五壯，穴在帶脈下三寸。

女人漏下赤白，月經不調，灸交信三十壯，穴在內踝上五寸。

女人漏下赤白，灸營池四穴三十壯，穴在內踝前後兩邊池中脈上，一名陰陽穴。一本是榮池。

女人漏下赤白四肢酸削，灸漏陰三十壯，穴在內踝下五分微動脈上。

用補中益氣，加茯苓半夏炮薑二十餘劑，脾氣漸復，飲食漸加，諸證頓愈。

證治準繩曰：雪翁妻年三十餘，十八胎九殤，八天會因事驚憂過甚，遂昏昏不省人事，口唇舌皆瘡，或至封喉，下部虛脫，白帶如注，如此四十餘日，或時少醒，至欲自縊，自悲不能堪醫。或投涼劑解其上，則下部疾愈甚，或投熱劑及以湯藥熏蒸其下，則熱運欲絕。四弟還脈之，始知爲亡陽證也，急以鹽煮大附子九錢爲君，制以薄荷防風，佐以薑桂芎歸之屬，水煎入井冰冷與之。未盡劑，鼾呼熟睡通宵，覺卽能識人。時止一嗣子二女，相抱痛哭，疎戚皆悲。執友趙憲長驚曰：「君何術也？」弟曰：「方書有之，假對假真對真耳。上乃假熱故以假冷之藥從之，下乃真冷故以真熱之藥反之，斯上下和而病解矣。」繼後主以女金丹錯綜以二三方，不但去其疾，且調治元氣。庚午生一子，壬申生一子。去年又患瘡疾，十三月亦主以養元氣，調生氣，待飲食大進，然後却以毒藥吐下塊物甚多，投以附子湯三錢而愈。不責效，且暮間，其用女金丹，卽勝金丸也，得之異人，倍加香附而視氣血之偏者，又加薑黃條芩倍川芎之屬，取效甚多。子念無子者，往往有之，翻思予得子之難，其苦何如？乃次第錄其方，并女金丹以濟人。

陶遵道外姑年七十，形瘦善啖，病白帶，食前薑湯吞大補丸五十九一二，次午膳後又臨臥時，各與小胃丹十五丸愈。

一婦人因產後虛寒，嘔惡不食，腹痛如割，時作寒熱，復出盜汗，瘦悴骨立，臍腹之左結成硬塊，其大如掌，冰冷，雖盛夏此處獨無汗，每塊微動，則痛不可忍，百藥治不效。夢中忽有人授以艾煎丸方，因服之，惡心寒熱盜汗輒止，盡一料遂平復，獨血塊如故，服至五六料，其塊自融化而出，如魚凍。

中言之詳矣。

頃頓丘一婦人，病帶下連綿不絕，白物或來已三年矣，命予脈之。診其兩手，脈俱滑大而有力量，得六七至，常上熱口乾眩暈，時嘔酢水，余知其實有寒痰在胃中，以瓜蒂散吐出冷痰二三升，皆酢水也。間如黃涎狀如爛膠。次以漿粥養其胃氣。又次用導水禹功以瀉其下，然後以淡劑滲泄之藥利其水道，不數日而愈。

丹溪心法曰：胡安人患白帶下，月經甚多，食少倦怠，面黃，經中有如血塊者，有如筋脈者，與參朮等補血氣，調脾胃。後諸證皆退，惟帶未止。以樗皮丸主之而愈。

薛氏醫案曰：一孀婦腹脹脅痛，內熱晡熱，月經不調，肢體痠癢，不時吐痰，或用清氣化痰之藥，喉間不利，帶下青黃，腹脅膨脹，又用行氣之劑，胃膈不利，肢體如癩，此乃鬱怒傷損肝脾，朝用歸脾湯以解脾鬱，生脾氣，夕用加味逍遙散以生肝血，清肝火，百餘劑而愈。

一婦人頭運吐痰，胃滿氣喘，得食稍緩，苦於白帶二十餘年矣，諸藥不應，此氣虛而痰飲也。痰飲愈而帶自愈。遂朝用六君子湯，夕用六味地黃丸，不一月而驗。

一婦人耳鳴胃痞，內熱口乾，喉中若有核，吞吐不利，月經不調，兼之帶下，余以為肝脾鬱結，用歸脾湯加半夏山梔升麻柴胡間以四七湯下白丸子而愈。

一婦人吞酸飽滿，食少便泄，月經不調，服清氣化痰丸，兩膝漸腫，寒熱往來，帶下黃白，面痿體倦，此脾胃俱虛，濕痰下注，用補中益氣，倍用參朮加茯苓半夏炮薑而愈。

一婦人帶下，四肢無力，余曰：四肢者土也，此脾胃虛弱，濕痰下注，以補中益氣，濟生歸脾二藥治之而愈。

一婦人帶下黃白，怒則胃膈不利，飲食少思，或用消導利氣之藥，痰喘胃滿大便下血，余曰：一此因脾氣虧損，不能攝血歸源。一用補中益氣加茯苓半夏炮薑四劑頓減，又用八珍加柴胡山梔而痊。

一婦人年餘六十，內熱口乾，勞則頭暈吐痰帶下，或用化痰行氣前證益甚，飲食益少，肢體或癩，服法風化痰之劑。

# 醫部彙考三百九十九

## 婦人諸乳疾門

### 宋寶漢卿瘡瘍全書

#### ○乳病證治

乳房屬陽明經乳頭屬厥陰經，此毒因驚憂鬱結，乳間成癰，初起二三日，即用鹿角散酒調服，外用金箍散蜜水調敷，若不能痊，急用荆防敗毒散，加苦葶子、天花粉，不散服內托散，加白芍、藥金、銀花。

外吹乳者，小兒吮乳吹風在內故也。內吹乳者，女人腹中有孕，其胎兒轉動吹風在外故也。煎藥中須用保胎之劑，以治乳發之藥同治之。

皂角散治乳癰及乳疹，用皂角一條燒灰，蛤粉三錢，乳香一錢末之，酒調下，以手揉乳令散，外用金箍散傅之，或內服復元通氣散已潰者，用人參、黃芪、貝母、白朮之類。

妳癰因女子十五六歲經脈將行，或一月二次，或過月不行，致生此疾，多生寡薄，氣體虛弱，宜服敗毒散，加地黃，再服黃礬丸，其毒自散，不致損命，每乳上只有一核可治，若串成三四箇，即難療也。治法逍遙調經湯，開鬱順氣解毒湯，加減用之。

圖書集成醫部全錄  
卷三百九十八  
彙考三百九十八  
婦人帶下門二

二四

結疼痛亦有不癢不痛腫鞭如石名曰吹妳若不急治腫甚成癰產後吹妳最宜急治不爾結癰逮至死者速服  
皂角散苦蕒散傳以天南星散以手揉之則散矣。

妬乳因兒未能飲餘乳畜結以致腫痛初不吮通之必致成癰若乳頭生瘡浸淫名妬乳宜赤龍皮湯天麻湯飛烏  
膏飛烏散傳以黃連胡粉散。

註乳盛或無子飲乳以致腫痛炒大麥芽煎服其乳即散若成瘡當從乳癰類治若皮膚浸淫成瘡當用本方。  
按大全妬乳者由新產後兒未能飲之及乳不洩或乳脹捏其汁不盡皆令乳汁畜結與血氣相搏即壯熱大渴  
引飲牽強掣痛手不得近是也初覺便知以手摺捏去汁更令旁人助吮引之不爾或作瘡有膿其熱盛必成癰  
也。輕則爲吹乳妬乳重則爲癰雖有專門不可不知。

乳癰乳巖經曰：「乳頭屬足厥陰肝經。乳房屬足陽明胃經。」若乳房忽壅腫痛結核色赤數日之外，焮痛脹潰，稠  
膿湧出膿盡而愈，此屬膽胃熱毒氣血壅滯，名曰乳癰爲易治。若初起內結小核，或如籠棋子，不赤不痛積之歲月  
漸大，巖巖崩破如熟石榴，或內潰深洞，血水滴瀝，此屬肝脾鬱怒氣血虧損，名曰乳巖爲難療。治法焮痛寒熱宜發  
表散邪腫焮痛甚宜疎肝清胃，或不作膿膿成不潰宜用托裏，或肌肉不生膿水清稀宜補脾胃，或膿出反痛惡寒  
發熱宜補氣血，或腫焮作痛晡熱內熱宜補陰血，或飲食少思時作嘔吐宜補胃氣，或飲食難化泄瀉腹痛宜補脾  
氣，或勞碌腫痛宜補氣血，怒氣腫痛宜養肝血，慎不可用剋伐之劑，復傷脾胃也。乳巖初思用益氣養榮湯加味逍  
遙，加味歸脾，可以內消，若用行氣破血之劑，則速其亡。

## 元張從政儒門事親



乳巖乃陰極陽衰，血無陽安能散？致血滲於心經，卽生此疾。若未破可療，已破卽難治。捻之內如山巖，故名之。早治得生，遲則內潰肉爛，見五臟而死。未破用蜀毒流氣飲，加紅花蘇木生地熟地青皮撫芎烏藥甘草小柴胡苦蕒仁。

### 陳自明婦人良方

#### ①乳病證治

婦人乳汁乃氣血所化，若元氣虛弱，則生子乳汁短少。初產乳房焮脹，此乳未通，若怒氣乳出，此肝經風熱，若累產無乳，此內亡津液。蓋乳汁資於衝任，若婦人疾在衝任，乳少而色黃者，則怯弱而多疾。

註前證若氣血虛弱而不能化生，宜壯脾胃，怒動肝膽而乳腫汁出，宜清肝火。夫乳汁乃氣血所化，在上爲乳，在下爲經，若屢產無乳，或大便澀滯，當滋化源。

按大全凡婦人乳汁或行或不行者，皆由氣血虛弱，經絡不調所致也。乳汁勿令投於地，蟲蟻食之，令乳無汁。若乳盈溢，可潑東壁上，佳。或有產後必有乳，若乳雖脹，而產後舉作者，此年少之人，初經產乳有風熱耳，須服清利之藥，則乳行。若累經產而無乳者，亡津液故也，須服滋益之藥以動之。若雖有乳，却又不甚多者，須服通經之藥以動之，仍以羹臠引之。蓋婦人之乳，資於衝脈與胃經通故也。有屢經產而乳汁常多者，亦婦人血氣不衰使然也。

產後乳汁自出，乃胃氣虛，宜服補藥止之。若乳多滿痛，用溫帛熨之，未產而乳自出，謂之乳泣，生子多不育。

註前證若氣血俱虛，用十全大補湯。肝經血熱，用加味逍遙散。肝經怒火，用四物參朮柴梔肝脾鬱怒，用加味歸脾湯。

按大全產後乳汁自出，以漏蘆散治之亦可。

○病因

乳鞭病多因厚味濕熱之痰，停畜膈間，與滯乳相搏而成。又有滯乳，因兒口氣吹噓而成。又有拗怒氣激滯而生者。煨石膏燒樺皮苦蕒子甘草節青皮，皆神效藥也。婦人此病若早治之，便可立消，有月經時，悉是輕病。五六十後，無月經時，不可作輕易看也。

李梴醫學入門

○總論

婦人之乳，與男子之腎同，皆性命根也。煩渴嘔吐者，膽胃風熱也，甚則毒氣上衝咽喉，妨碍寒熱者，肝邪也。此皆表證，宜不換金正氣散，加天花粉，能止渴嘔，定寒熱。咽膈有礙者，甘桔湯加生薑，或護心散。如潰後見此四證爲虛。治婦人乳疾，與男子微異者，女損肝胃，男損肝腎故也。婦人胎產後，亦有肝虛者。

○論證治法

乳房結核，乃飲食厚味，忿怒憂鬱，以致胃火上蒸，乳房汁化爲濁膿，肝經氣滯，乳頭竅塞不通，致令結核不散，痛不可忍。初起便宜用隔蒜灸法，切忌針刀。能飲者，一醉膏加芎歸各一分，一服兩服即效。不能飲者，苦蕒散。結核亦有氣血虛弱，略被外感內傷，以致痰涎凝滯，俱以古芷貝散爲主。血虛合四物湯，更加參朮柴胡升麻。氣虛合四君子湯，更加芎歸柴胡升麻。憂思傷脾者，歸脾湯加苦蕒根貝母白芷連翹甘草節。水酒各半煎服。有鬱火結核腫痛甚者，清肝解鬱湯。

吹乳因乳子膈有痰滯，口氣焮熱，含乳而睡，風熱吹入乳房，凝滯不散，作痛，初起須忍痛，揉令稍軟，吸取，竅通自可。

○治法

夫婦人有本生無乳者，不治。或因啼哭悲怒，鬱結氣滯閉塞，以致乳脈不行，用精豬肉清湯調和美食，於食後調益元散五七錢，連服三五服，更用木梳梳乳周回百餘遍，則乳汁自下也。

又一法用豬蹄湯調和美味服之，乳汁亦下。或用熟豬蹄四枚食之，亦效。

夫乳癰發痛者，亦生於心也，俗呼曰「吹乳」是也。吹者風也，風熱結薄於乳房之間，血脈凝注，久而不散，潰腐爲膿，也可用一法禁之。呪曰：「謹請東方護司族吹妳是灰妳子。」右用之時，當先問病人曰：「甚病？」病人答曰：「吹妳。」取此氣一口，但吹在兩手坎字文上，用大拇指緊捏定面北立一氣念七遍，吹在北方如此者三遍。若作法時，以左右二婦人，面病人立於病乳上痛揉一二百數，如此亦三次則愈。

朱震亨格致餘論

○乳癰論

乳房陽明之經，乳頭厥陰所屬，乳子之母，不知調養，怒忿所逆，鬱悶所遏，厚味所釀，以致厥陰之氣不行，故竅不得通，而汁不得出，陽明之血沸騰，故熱甚而化膿，亦有所乳之子，膈有滯痰，口氣掀熱，含乳而睡，熱氣所吹，遂生結核。於初起時，便須忍痛，揉令稍軟，吮令汁透，自可消散矣。失此不治，必成癰癤。治法：疏厥陰之滯，以青皮清陽明之熱，以細研石膏行汗濁之血，以生甘草之節消腫導毒，以苦葶子或加沒藥、青橘葉、皂角刺、金銀花當歸，或湯或散，或加減隨意消息，然須以少酒佐之。若加以艾火兩三壯於腫處，其效尤捷。彼庸工喜於自銜，便用針刀引惹抽痛，良可哀憫。若夫不得於夫，不得於舅姑，憂怒抑鬱，朝夕積累，脾氣消沮，肝氣橫逆，遂成隱核如大棋子，不痛不癢，數十

年使方爲瘡陷，名曰乳癰，以其瘡形嵌凹似巖穴也，不可治矣。若於始生之際，便能消釋病根，使心清神安，然後施

大抵乳房屬陽明胃經，乳頭屬厥陰肝經。若忿怒傷肝，或厚味積熱，以致氣不行，竅不通，乳不出，則結而爲腫，爲痛。陽明之血熱甚，則爲腐爲膿。若膿一成，卽針之以免遍潰諸囊之患。

夫乳之爲物，各有囊橐。若一有膿卽針之，否則遍潰諸囊矣。少壯者得以收斂，老弱者多致不救。乳巖乃七情所傷，肝經血氣枯槁之證，宜補氣血解鬱結藥治之。

大抵鬱悶則脾氣阻，肝氣逆，遂成隱核，不痛不癢，人多忽之，最難治療。若一有此，宜戒七情，遠厚味，解鬱結，更以養血氣之藥治之，庶可保全。否則不治，亦有二三載或五六載方潰陷下者，皆曰乳巖，蓋其形巖凸似巖穴也。最毒慎之，可保十中一二也。

## 陳實功外科正宗

### ○總論

夫乳病者，乳房陽明胃經所司，乳頭厥陰肝經所屬，乳子之母不能調養，以致胃汁濁而壅滯爲膿，又有憂鬱傷肝，肝氣滯而結腫，初起必煩渴嘔吐，寒熱交作，腫痛疹甚，宜牛蒡子湯主之。厚味飲食，暴怒肝火妄動，結腫者宜橘葉散散之。又憂鬱傷肝，思慮傷脾，積想在心，所願不得志者，致經絡痞懣聚結成核，初如豆大，漸如棋子，半年一年，二載三載，不疼不痒，漸漸而大，始生疼痛，痛則無解，日後腫如堆栗，或如覆碗，色紫氣穢，漸漸潰爛，深者如巖穴，高者若泛蓮，疼痛連心，出血作臭。其時五臟俱衰，四大不救，名曰乳巖。凡犯此者，百人百必死。如此證，知覺若早，只可用清肝解鬱湯，或益氣養榮湯。患者再加清心靜養，無掛無礙，服藥調理，只可苟延歲月。若中年已後，無夫之婦，得此死更速。故夫乃婦之天也。惟初生核時，急用艾灸核頂，待次日起泡挑破，用鉞針針入四分，甲冰蠅散條插入核內，糊紙封蓋，至十三日，其核自落，用玉紅膏生肌斂口，再當保養不發。結核不知疼痛，久而漸大，破後流污水，宜養血

消散，不散宜益元散，令薑湯或井水調，一日一服，至三五七次自解。重者，解毒湯頓服之。挾氣者，古芷貝散單青皮湯，外用漏蘆爲末，水調敷。又有乳汁不行，停乳作痛者，湧泉散。

乳癰乃結核久，內脹作痛，外腫堅硬，手不可近，謂之乳癰。未潰者，仍服苦蕒散，內托升麻湯，或復元通聖散加藜蘆。虛者，托裏消毒散，將潰兩乳間出黑頭瘡，項下作黑眼者，內托升麻湯。已潰寒熱者，內托十宣散。少食口乾者，補中益氣湯。晡熱內熱者，八物湯加五味子。胃虛嘔者，六君子湯加香附砂仁。胃寒嘔吐或瀉者，六君子湯加乾薑藿香。遇勞腫痛者，八物湯倍參芪歸朮。遇怒腫痛者，八物湯加山梔。

乳巖乃鬱怒有傷肝脾，結核如鼈棋子，大不痛不痒，五七年後，外腫紫黑，內漸潰爛，名曰乳巖，傷盡氣血方死。急用十六味流氣飲，及單青皮湯兼服。虛者，只用清肝解鬱湯，或十全大補湯，更加清心靜養，庶可苟延歲月。經年以後，必於乳下潰一穴，出膿。及中年無夫婦人，死尤速。故曰：「夫者妻之天。」惟初起不分屬何經絡，急用葱白寸許生半夏一枚搗爛，爲丸芡實大，以綿裹之，如患左塞右鼻，患右塞左鼻，一宿而消。乳懸乃產後瘀血上攻，忽兩乳伸長，細小如腸，直過小腹，痛不可忍，名曰乳懸，危證也。用川芎當歸各一斤，水煎濃湯，不時溫服。再用二斤，逐旋燒煙，安在病人面前桌子下，令病人曲身低頭，將口鼻及病乳常吸煙氣。未甚縮再用一料，則瘀血消而乳頭自復矣。若更不復舊，用蓖麻子搗爛貼頂上片時，收卽洗去。

### 薛己醫按

#### ○癰巖治法

乳癰乳巖，若因暴怒，或兒口氣所吹，腫痛者，疏肝行氣。欲痛發寒熱者，發散表邪。腫焮痛甚者，清肝消毒。未成膿者，疎肝行氣，不作膿或不潰，托裏爲主。潰而不斂，或膿清者，宜大補氣血。嘗見患者責效太速，或不戒七情及藥不分。

右水煎服。

①加味逍遙散 治證同上。

甘草炙，當歸炒，芍藥酒炒，茯苓，白朮炒，各一錢。柴胡，丹皮，山梔炒，各五分。右水煎服。

②甘桔湯 入門下同 治女人乳癰，咽膈有礙。

甘草一兩，桔梗五錢。右水煎服。

③解毒湯 一名黃連解毒湯，治女人乳房癰住不散。

黃連，黃芩，黃藥，山梔各二錢半。右水煎服。

④不換金正氣散 治女人乳病表證。

厚朴，陳皮，藿香，半夏，蒼朮，各一錢。甘草五分。右薑三片，棗二枚，水煎溫服。

⑤益元散 一名六一散，治女人乳腫不散。

滑石六兩，甘草一兩。右爲末，每三錢，入蜜少許，沸湯調服。

⑥補中益氣湯 治女人乳癰，食少口乾。

黃芪，人參，甘草各一錢。當歸，白朮，陳皮，柴胡，升麻，各五分。右水煎，已午未初時溫服。

⑦四君子湯 治女人氣虛，乳中結核，用此加減。

人參一錢，白朮，茯苓各二錢。甘草六分。右薑三片，棗二枚，水煎，不拘時服。本方加陳皮半夏，名六君子湯。

⑧八物湯 治女人乳癰，晡熱內熱。

人參，茯苓，白朮土炒，白芍藥，當歸，熟地各二錢。甘草炙，川芎，各一錢。右煎服。

⑨十全大補湯 治女人乳巖虛者。

清肝。

景岳全書

臣張介賓著

○乳病證治

乳癰乳巖，腫痛熱甚，熱毒有餘者，宜以連薤金貝煎先治之，甚妙。

產後乳自出，乃陽明胃氣之不固，當分有火無火而治之。無火而生不止，由氣虛也，宜八珍湯十全大補湯。若陽明血熱而溢者，宜保陰煎或四君子湯加梔子。若肝經怒火上衝，乳脹而溢者，宜加減一陰煎。若乳多脹痛而溢者，宜溫帛熨而散之。

孕婦乳病，名曰內吹，其因與產後同，惟用藥不可犯其胎耳。

初起紅赤腫痛，身微寒熱，無頭眩，無口乾，微疼者，順已成，痲腫發熱，疼痛有時，一囊結腫，不侵別囊者，輕。已潰膿黃而稠，腫消疼痛漸止，四邊作癢生肌者，順。潰後膿水自止，腫痛自消，新肉易生，膿口易合者，順。初起一乳通痞大痛，不紅，寒熱心煩，嘔吐不食者，逆。已成不熱不紅，堅韌如石，口乾不眠，胃痞食少者，逆。已潰不膿，正頭腐爛，腫勢愈高，疼痛愈盛，流血者，死。潰後肉色紫黑，痛苦連心，腕氣日深，形體日削者，死。初起發熱惡寒，頭眩體倦，六脈浮數，邪在表，宜散之。發熱無寒，惡心嘔吐，口乾作渴，胃膈不利者，宜清之。憂鬱傷肝，思慮傷脾，結腫堅韌，微痛者，宜疏肝行氣。已成，痲腫發熱，疼痛有時，已欲作膿者，宜托裏消毒。膿已成而脹痛者，宜急開之。如脾胃虛弱，更兼補托潰而不斂，膿水清稀，腫痛不消，疼痛不止，大補氣血，產後吹乳勢甚者，惟連薤金貝煎最妙。

方

水煎服。一方去連翹加川芎皂刺乳香沒藥治癰疽腫痛俱色慢不甚赤元氣虛弱或行攻伐不能潰散者宜用之未成者消已成者潰。又去腐生新之良劑也加減同前。但虛弱及已潰者去芷薤金銀花三味消毒之藥。

⑤內托十宣散 治女人乳癰已潰寒熱  
人參，黃芪，當歸，厚朴，桔梗，肉桂，川芎，防風，白芷，甘草，各等分。右為末，每三錢至五六錢，不飲酒者，木香磨湯調下，瘡愈服之尤佳。或加忍冬藤尤妙。如天熱去桂，加苦蕒根赤茯苓。

⑥湧泉散 治女人乳汁不通作痛  
瞿麥，麥冬，王不留行，龍骨，穿山甲，各等分。右為末，每一錢熱湯下，先食猪懸蹄羹，後服此藥，服後以梳刮左右乳房。

⑦又方 治女人乳脹痛及乳癰腫  
王不留行，白丁香，漏蘆，花粉，殭蠶，各等分。右為末，猪懸蹄羹汁下。

⑧益氣養榮湯外科正宗下同 治女人乳巖初患  
人參，茯苓，陳皮，貝母，香附，當歸，川芎，赤芍，熟地，白芍，各一錢。甘草，桔梗，各五分。白朮二錢。右薑三片，棗二枚，水二盃煎八分食遠服。

⑨冰蠅散 治女人乳中結核  
大田螺五枚，去殼線穿，日中曬乾。冰片一分，白砒一錢二分，麵裹煨熟。硃砂三分。右用曬乾螺肉，切片同煨熟，白砒碾為細末，加硃片再碾，小罐密收。凡用時先用艾灸核上七壯，次候灸瘡起泡，以小針挑破，將前藥一二釐，津唾調成餅，貼灸頂上，用綿紙以厚糊封貼核上，勿動泄氣。七日後四邊有裂縫，再七日其核自落，換搽玉紅膏，內服補藥，兼助完口。

內服補藥，兼助完口。



人參，白朮，茯苓，甘草，當歸，川芎，熟地，芍藥，肉桂，黃芪，各二分半。右薑棗煎服。

②復元通聖散 治女人乳癰未潰。

穿山甲，苦蕒根，各四錢。青皮，陳皮，各二錢。甘草三錢。右為末，酒調服。

③歸脾湯 治女人憂思傷脾，乳中結核，用此加減。

當歸，龍眼肉，棗仁，遠志，人參，黃芪，白朮，茯苓，各一錢。木香五分。甘草三分。右薑棗煎服。

④護心散 治女人乳病咽膈有礙者。

菉豆粉四錢，乳香二錢。右為末，甘草煎湯調服，時時細呷。

⑤一醉膏 治女人乳癰初起，神效。

苦蕒一箇去皮研爛，甘草五錢，沒藥二錢半。右用紅酒三椀，煎至一椀半，分兩次溫服。重者再進一服，以瘥為度。或加當歸白芷乳香亦妙。如要宣毒，加皂刺一分。

⑥古芷貝散 治女人吹乳及結核。

白芷，貝母，各等分。右為末，每一錢酒調頻服。

⑦清肝解鬱湯 治女人乳內結核，或腫潰不愈。

當歸，白朮，各一錢半。人參，柴胡，牡丹皮，陳皮，川芎，各八分。白茯苓，貝母，白芍藥，熟地，山

梔，各一錢。甘草五分。右水煎服。

⑧內托升麻湯 治女人兩乳間出黑頭瘡。

葛根，升麻，連翹，各一錢半。黃芪，當歸，炙甘草，各一錢。鼠黏子五分，肉桂三分，黃蘗二分。右水

二盞酒一盞同煎服。

二盞酒一盞同煎服。

⑤勝金丹 治婦人吹乳極效。

百齒霜，即木梳上髮垢。右一味，不拘多少，用無根水為丸如桐子大，每服三九，倒流水送下。食後令病人左乳者左臥，右乳者右臥，於溫處汗出愈。新汲水傾於房上接之，乃倒流水也。

⑥獨勝散 治婦人吹乳。

白丁香五錢，右搗羅為末，每服一錢匕，溫酒調下，服無時。

⑦皂角散 治婦人吹乳。

皂角燒灰，葛粉研細，熱酒一盃，調一字，頃間揉散即愈。一本是蛤粉治乳癰。

⑧丹溪方 楊孺人乳腫痛。

青皮，石膏煨，連翹，皂角刺炒，黃藥子，當歸頭，木通，各一錢。生甘草三分。作一貼，入好酒些少，同煎飲之，外用散堅解毒藥洗腫處。

⑨又方 義二孺人平時乳內有結核，不為痛，忽乳邊又有一腫核，頗痛。

黃芩，川芎，木通，陳皮，各四錢。人參二錢。大腹皮三錢。白芍藥，炙甘草，生甘草，當歸頭，各一錢。

分二貼煎服。

⑩又方

二孺人但經將行，而乳腫，先兩日發口乾而不渴，食少減，脈左弦帶數，右却平。

川芎，歸身，炒白芍，熟地，陳皮，白朮，茯苓。帶熱下與點丸三十粒。與點丸，即黃芩為末，粥丸是也。

⑪東垣方 婦人兩乳間出黑頭瘡，瘡頂陷下作黑眼子，其脈弦洪，按之細小。

升麻，連翹，葛根，各一錢五分。肉桂三分，黃芪，歸身，炙甘草，各一錢。鼠黏子五分，黃蘗二錢。右

作一服，水一盞，酒半盞，煎至一盞，二服愈。

⑤生肌玉紅膏 治證見上。

甘草一兩二錢，瓜兒血竭，輕粉各四兩。當歸身，白蠟各二兩。白芷五錢，紫草二錢，麻油一斤。右先用甘草當歸紫草白芷四味，入油內浸三日，大杓內慢火熬藥微枯色，細絹濾清，將油復入杓內，煎滾下整血竭化盡，次下白蠟微火亦化完，用茶鍾四枚，預頓水中，將膏分作四處，傾入鍾內，候片時方下，研極細輕粉，每鍾內投和一錢攪勻，候至一伏時取起，不得加減，致取不效。

⑥連薊金貝煎 景岳全書 治女人乳癰乳巖熱毒有餘之證。

金銀花，土貝母，蒲公英，夏枯草各三錢。紅藤七八錢。連薊一兩或五七錢。右用好酒二碗，煎一碗服，服後暖臥片時，若火盛煩渴，乳腫者，加天花粉。

⑦通和湯 寶鑑 治婦人乳癰疼痛不可忍者。

穿山甲炮，木通各一兩。自然銅五錢，酢淬七次。右為末，每服二錢，熱酒調下，食遠服之。

⑧丹溪方 綱目 下同 治乳癰。

青皮，苦蕒仁，橘葉，連薊，桃仁留尖，皂角刺，甘草節。水煎服，破加參芪。

⑨神效苦蕒散 治乳癰妳巖神效。

苦蕒一箇，去皮焙為末，子多者有力，生甘草，當歸酒浸焙，各五錢。乳香研，沒藥研，各二錢半。右為末，用無灰酒三升，以銀石器內慢火熬取一升，清汁分作三服，食後良久服，如有妳巖使服此藥，可杜絕病根。毒氣已成，能化膿為黃水，毒未成，即於二便中，通利。如疾甚，再合服，以退為度，立效。散與前方間服，神妙。但以苦蕒散方，減去當歸加紫色皂角刺一兩六錢是也。丹溪云：「妙捷，恐貧賤之家，未能辦集者，用單方內蒲公英方尤妙。」

⑩張氏橘皮湯 治乳癰未結即散，已結即潰，極痛不可忍者，極效。因小兒吹乳，變成此疾者，並皆治。

臙者，及夏月火令時，俱用茶湯同蜜調敷。如微熱微腫及大瘡已成欲作臙者，俱用葱湯同蜜調敷。如漫腫無頭，皮色不變，濕痰流毒，附骨癰疽，鶴膝風證等病，俱用葱酒煎調。如風熱惡毒所生，患必皮膚亢熱，紅色光亮，形狀遊走不定者，俱用蜜水調敷。如天泡火丹赤遊丹黃水漆瘡惡血攻注等證，俱用大藍根葉搗汁調敷，加蜜亦可。湯潑火燒皮膚破爛，麻油調敷。以上諸引理取寒熱溫涼製之，又在臨用之際，順合天時，洞窺病勢使引爲當也。

⑤下乳天漿散 治乳母元氣虛弱，乳汁微少，或痛，或生兒日久乳少。

川芎，當歸，白芍藥，熟地黃，天花粉，甘草，王不留行炒，麥冬，漏蘆，茯苓，穿山甲炒，通草，各一錢。用健豬前蹄一隻，煮蹄爛，取汁二碗，同藥煎至碗半，二次頓熱，食遠服之，以熱木梳梳其乳房，其汁如湧泉而來。

⑥木香餅 治一切氣滯結腫成核，或痛或閃肭，風寒所傷，並效。

木香五錢，生地黃二兩搗膏。右木香爲末，同地黃和勻，量患處大小，作餅置腫上，以熱熨斗熨之。堅而木痛者，間日熨之妙。

⑦加味四物湯 治產婦乳汁不通，如治他病，隨證加減，不必執此藥。

人參，歸身，川芎，赤芍，生地，桔梗，甘草，麥冬，白芷各一兩。水煎服。

⑧鯽魚湯 千金方下同 治同上。

鯽魚長七寸，豬肋半斤，漏蘆，石鍾乳各八兩。右四味切豬肋魚，不須洗，治清酒一斗二升，合煮魚熟，藥成絞去滓，適寒溫，分五服。其間相去須臾，一飲，令藥力相及爲佳，乳卽下。

⑨鍾乳湯 治婦人乳無汁。

⑤牛蒡子湯外科正宗 乳癰乳疽，結腫疼痛，勿論新久，但未成膿者服。

陳皮，牛蒡子，山梔，金銀花，甘草，黃芩，苦蕒仁，天花粉，連翹，角針，各一錢。柴胡，青皮，各五分。水二鍾煎八分，入酒一盃和均，食遠服。

⑥橘葉散 治婦人有孕，胎熱為內吹，有兒喫乳名外吹，致乳結成腫痛，寒熱交作，甚者惡心嘔吐，並服之。

柴胡，陳皮，川芎，山梔，青皮，石膏，黃芩，連翹，各一錢。甘草五分，橘葉二十箇。水二鍾煎八分，食遠服，滓再煎服。

⑦清肝解鬱湯 治一切憂鬱氣滯，乳結腫脹，不疼不癢，久漸作疼，或胃膈不利，肢體倦怠，面色痿黃，飲食減少。

陳皮，白芍，川芎，當歸，生地，半夏，香附，青皮，遠志，茯神，貝母，蘇葉，桔梗，各八分。甘草，山梔，木通，各四分。水二鍾薑三片煎八分，食遠服。

⑧鹿角散 治乳癰初起，結腫疼痛，憎寒發熱，但未成俱效。鹿角尖三寸，炭內燒紅存性碾末。每服三錢，食後熱酒一茶鍾調服，甚者再一服必消。

⑨回乳四物湯 治婦人無兒喫乳，致乳汁腫脹，堅韌疼痛難忍。

麥芽二兩炒為末，川芎，當歸，白芍藥，熟地，各二錢。水二鍾煎八分，食遠服。用脚布束緊兩乳，以手按揉其腫自然消散，甚者再用一服。

⑩如意金黃散 治癰疽發背諸般疔腫，跌撲損傷，濕痰流毒，大頭時腫，漆瘡火丹，風熱天泡，肌膚赤腫，乾濕脚氣，婦女乳癰。

天花粉十斤，黃芩，大黃，黃各五斤，白芷三斤，紫厚朴，陳皮，甘草，蒼朮，天南星，各二斤。以

鬼箭五兩。○單行鬼箭湯 治同上 右以水六升，煮取四升，每服八合，日三，亦可燒作灰，水服方寸匕，日三。

○甘草散 治同上

甘草一兩，通草三十銖，石鍾乳二十銖，雲母二兩五錢，屋上散草二把燒爲灰。右五味，治下篩，食後溫漏蘆湯服方寸匕，日三，乳下不止。

○竹皮大丸 仲景 治乳中虛嘔逆煩亂。

生竹茹，石膏各二分。桂枝，白薇，共一分。甘草七分。右爲細末，棗肉和丸彈子大，以飲服一九，日三夜二。若有熱者，倍加白薇。若煩喘者，加柏實一分。

○玉露散 良方 涼膈下乳汁。

桔梗，川芎，白芷各二錢。赤芍藥一錢半，人參，赤茯苓，甘草各一錢。當歸五分。右剉作一貼，水煎服。

○豬蹄粥 本草 治乳無汁。

豬蹄四隻，治如食法。右水二斗，煮取一斗，去蹄，入土瓜根通草漏蘆各三兩，剉，煮取六升，去滓，入葱豉及小米煮作稀粥食之。

○十六味流氣飲 瘡瘍全書 治女人乳巖，傷盡氣血欲死。

人參，當歸，黃芪，桔梗，防風，木香，甘草，枳殼，芍藥，川芎，肉桂，檳榔，白芷，厚朴，紫蘇，烏藥，木香，各等分。右水煎服。一方無檳榔肉桂，有皂刺，此表裏氣血藥也，非脈洪緩沉遲緊細者不用。

石鍾乳，硝石，白石脂，各六兩。通草十二銖，桔梗五錢切。右五味咬咀，以水五升，煮三沸，三上三下，去滓，內消石令烱，分服。一方無硝石，有滑石。

⑤又方 治同上。

石鍾乳四兩，甘草二兩，漏蘆三兩，通草，苦蕒根，各五兩。右五味咬咀，以水一斗，煮取三升，分三服。一云用苦蕒實一枚，一方無甘草。

⑥又方 治同上。

石鍾乳，通草，各一兩。漏蘆五錢，桂心，甘草，苦蕒根，各六銖。右六味，治下篩，酒服方寸匕，日三，最驗。

⑦漏蘆湯 治同上。

漏蘆，通草，各二兩。石鍾乳一兩，黍米一升。右四味咬咀，米宿漬搗，取汁三升，煮藥三沸，去滓作飲飲之，日三服。

⑧漏蘆散 治同上。

漏蘆五錢，石鍾乳，苦蕒根，各一兩。蟬蛸三合。右四味，治下篩，先食糖水，服方寸匕，日三。

⑨單行石膏湯 治同上。

石膏四兩研。右以水二升，煮三沸，稍稍服，一日令盡。

⑩麥門冬散 治同上。

麥門冬，通草，理石，石鍾乳，各等分。右四味治下篩，先食酒服方寸匕，日三服。

⑪又方 治同上。

麥門冬，通草，理石，石鍾乳，土瓜根，大棗，蟬蛸，各等分。右七味，治下篩，食畢，用酒服方寸匕，日三。

⑫又方 治同上。

女人乳巖用蒲公英草搗爛，患處神妙。綱目。

婦人乳腫馬尿塗之立愈。產寶。

又方。小豆、莽草等分，為末，苦酒和傅佳。梅師。

又方。治吹乳鼠黏，二錢，麝香少許，溫酒細吞下。袖珍方。

女人吹乳以胡椒七粒，同百齒霜和丸，熱酒下，得汗立愈。寶鑑。

又方。蛇皮一尺七寸，燒末，溫酒一盞服。產乳。

又方。鼠屎七粒，紅棗七枚，去核包屎，燒存性，入麝香少許，溫酒調服。集要方。

又方。用韭地中蚯蚓屎，研細，篩過，米酢調厚敷，乾則換三次，即愈。涼水調亦可。經驗方。

吹妳乳癰，五月五日，椶箬燒灰，酒服二錢，即散，累效。濟急仙方。

乳癰腐爛，靴內年久樺皮燒灰，酒服一錢，日一服。經驗。

乳癰初起，葱汁一升，頓服，即散。千金。

又方。大熟苦蕒一枚，熟搗，以白酒一斗，煮取四升，去滓，溫服一升，日三服。子母祕錄。

又方。用石膏煨紅，出火毒，研每服三錢，溫酒下，添酒盡醉，睡覺再進一服。經驗方。

又方。用丹參、白芷、芍藥各二兩，咬咀，以酢淹一夜，豬脂半斤，微火煎成膏，去滓，傅之。必效方。

乳癰不消，白麵半斤，炒黃，酢煮為糊塗之，即消。聖惠方。

乳婦氣脈壅塞，乳汁不行，及經絡凝滯，妳房脹痛，留畜作癰毒者，用葵菜子炒香，縮砂仁等分為末，熱酒服二錢。此藥滋氣脈，通營衛，行津液，極驗，乃上蔡張不愚方也。本草。



### 單方

婦人氣惱勞傷，或寒熱不調，乳內忽生腫痛，用椀一隻，內用粗燈草四根，十字排勻椀內，燈草頭各露寸許，再用平山粗紙裁成一寸五分闊紙條，用水濕紙，貼蓋椀內燈草上，紙與椀口相齊，將椀覆於腫乳上，留燈草頭在外，將艾大圓放椀足底內點火灸之。艾盡再添，灸至椀口流出水氣，內痛覺止方住。甚者，次日再灸一次，必消。外科正宗

女人乳癰初起，腫痛未成膿者，用蒲公英連根帶葉二兩搗爛，用好酒半斤同煎數沸，存滓敷腫上，用酒熱服，蓋睡一時許，再用連鬚葱白湯一茶鍾催之，但微汗而散此方。鄉村偏僻無藥之所，用之極妙，亦且簡便。

蒲公英在處田間路側，三四月開黃花似菊，味甘解毒散滯入陽明太陰經，洗淨細研，以忍冬藤濃煎湯，入少酒佐之，隨手便欲睡，睡覺已失之矣。丹溪

婦人吹乳，用豬牙皂角去皮蜜炙為末，酒服一錢。袖珍方

吹妳腫痛，半夏一箇煨研，酒服，立愈。一方以末隨左右啗鼻效。經驗方

婦人吹妳，水調麵煮糊欲熟，即投無灰酒一盞攪勻熱飲，令人徐徐按之，藥行即瘳。聖惠

又方，赤小豆酒研溫服，以滓傳之。鵝氏方

婦人乳毒，敗龜板一枚燒研，酒服四錢。小品方

婦人乳裂，秋月冷茄子裂開者陰乾，燒存性研末，水調塗。補遺方

婦人妬乳，酢和梁上塵塗之。千金

妬乳乳痛，丁香末水服方寸匕。梅師方

乳巖乳癰，用穿山甲炮研末，酒服方寸匕，日二服，外以油梳梳乳即通。單方

又方用水楊柳根生搗貼瘡其熱如火遂平

又方馬鞭草一握酒一碗生薑一塊搗汁服滓傳之。易簡方。

又方用川大黃粉草各一兩爲末好酒熬成膏收之以絹攤貼瘡上仰臥仍先以溫酒服一大匙明日取下惡物。經驗方。

乳癰堅鞭新萸著子半匙水服不得嚼破。外臺。

乳癰初腫扁竹根如殭蠶者同萱草根爲末蜜調敷之神效。永類方。

又方內消花卽玉簪花取根搗酒服以滓傳之。海上方。

女子妬乳生蔓菁根搗和鹽酢漿水煮汁洗之五六度良。又和雞子白封之亦效。食療本草。

乳癰腫毒龍舌草忍冬藤研爛蜜和傳之。多能鄙事。

產後乳汁不泄結毒者皂角刺蔓荊子各燒存性等分爲末每溫酒服二錢。袖珍方。

婦人乳巖因久積憂鬱乳房內有核如指頭大不痛不癢五七年成癰名乳巖不可治也。用青橘皮四錢水一盞半

煎一盞徐徐服之日一服。或用酒服。丹溪。

乳瘡腫痛用芝麻炒焦研末以燈窩油調塗卽愈。本草。

乳頭裂破臙脂蛤粉爲末傳之。得效方。

乳汁不通絲瓜連子燒存性研酒服三錢被覆取汗卽通。簡便方。

乳汁不行內服通乳藥外用木梳梳乳周迴白餘遍卽通。事親。

女人乳汁不出內結成腫名妬乳用蜂房燒灰研每服二錢水一小盞煎六分去滓溫服。濟衆方。

乳汁不通白殭蠶末二錢酒服少頃以芝麻茶一盞飲之梳頭木梳梳之數十徧妳汁如泉。經驗方。

妬乳乳癰，雞矢白炒研，酒服方寸匕，三服愈。產寶下同。

又方。葵莖及子爲末，酒服方寸匕，日二。肘後方。

又方。柳根皮搗火溫帛裹熨之，冷易一宿消。肘後方。

乳痛成癰，以益母草爲末，水調塗乳上，一宿自瘥。生搗爛用之亦得。綱目。

吹乳，用桑樹蛀屑飯搗成膏貼之。本草。

乳頭破裂，丁香末傅之。梅師方。

吹妳腫痛，取戶限下土，和雄雀糞，暖酒服方寸匕。本草。

又方。貝母末吹鼻中，大效。得效方。

又方。遠志焙研酒服二錢，以滓傅之。直指方。

又方。萱草根搗酒服，以滓封之。本草。

又方。葛蔓燒灰酒服二錢，三服效。易簡方。

乳癰腫大如椀，白薑石末和雞子清敷之，乾即易。外臺。

乳癰初腫，貝母末酒服二錢，仍令兒吮之，即通。直指方。

乳汁不下，乃氣脈壅塞也。又治經絡凝滯，乳內脹痛，邪畜成癰，服之自然內消。漏蘆二兩半，蛇退十條，炙焦苦蕒十

箇，燒存性爲末，每服二錢，溫酒調下良久，以熱羹湯投之，以通爲度。和劑。

乳癰堅韌，以罐盛酢，燒熱石投之，二次溫漬之，冷則更燒石投之，不過三次即愈。千金。

乳癰寒熱，蔓菁根併葉去土，不用水洗，以鹽和搗塗之，熱即換，不過三五次即瘥。冬月只用根。此方已救數十人，須

避風 兵部手集

甲乙經曰：妬乳，大淵主之。

乳癰，凄索寒熱，痛不可按，乳根主之。

大驚乳痛，梁丘主之。

乳癰有熱，三里主之。

乳癰，太衝及復溜主之。

神封膺窻主乳癰，寒熱短氣，臥不安。

太谿俠谿主乳癰腫潰。

乳癰驚痺脛腫，足跗不收，跟痛，刺下廉入三分，灸三壯，穴在上廉下三寸。

月水不利，見血而有身，則敗乳腫，刺臨泣入二分，灸三壯，穴在足小趾次趾間，去俠谿一寸半。

乳癰腫痛，諸藥不能止痛者，三里穴鍼入五分，其痛立止，如神。穴在膝下脣外廉兩筋間，舉足取之。

儒門事親曰：乳汁不下，針肩井二穴效。

醫學綱目曰：乳癰刺乳中穴，在乳下中，針入一分，沿皮向後一寸半，灸瀉之。

醫學入門曰：婦人乳癰等證，先以溫紙覆上，立候紙先乾處為瘡頭，記定，然後用獨蒜去兩頭，切中間三分厚，安瘡

頭上，用艾炷於蒜上灸之，每五炷，換蒜再灸。如瘡大有十數頭，作一處生者，以蒜搗爛攤患處，鋪艾灸，蒜敗再換。若

痛灸至不痛，不痛灸至痛，其瘡乃隨火而散，此拔引鬱毒從治之法，有回生之功。

### 醫案

又方。用穿山甲炮研末，酒服方寸匕，日二服，外以油梳梳乳即通。單驪方。

又方。死鼠燒作屑，酒服方寸匕，日三，立下，勿令知。千金下同。

又方。鯉魚頭燒為末，酒服三指撮。

又方。母猪蹄一具，粗切，以水二斗，熟煮得五六升汁飲之，不出更作。一方入酒煮之。

又方。豬蹄二枚，熟炙搥碎，通草八兩細切，以清酒一斗浸之，稍稍飲盡，不出更作。

又方。女人無乳或少，苦葶子青色大者一枚，熟搗，以白酒一斗，煮取四升，去滓溫服一升，日三。黃色小者，用二枚亦好。

又方。土瓜根治下篩，服半錢匕，日三。乳如流水不竭。

又方。芝麻炒研，入鹽少許食之。唐氏。

又方。女人無乳，石鍾乳漏蘆各二兩，治下篩，飲服方寸匕，即下。千金下同。

又方。女人乳少或無乳，石鍾乳通草各等分，為末，粥飲服方寸匕，日三，後可兼養兩兒。通草橫心者勿取，是羊桃根

色黃無益。

又方。前方二味，酒五升，漬一宿，明旦煮沸，去滓，服一升，日三。夏冷服，冬溫服。

婦人無乳，用羊肉六兩，獐肉八兩，鼠肉五兩，作臙啖之。崔氏。

婦人回乳，用男子裹脚布勒住，經宿即止。本草下同。

產婦無子，食乳乳不消，令人發熱惡寒，用大麥蘖二兩炒為末，每服五錢，白湯下，良甚。丹溪。

乳汁不下，用麥門冬末二錢，酒磨犀角汁一盞，調服。本草下同。

又方。用鯉魚作羹食之。

散四劑，更隔蒜灸之，腫少退。再服八珍湯，倍加香附、夏枯草、蒲公英，仍間服前散，月餘而消。亦有乳疽一證，其狀腫硬木悶，雖破而不潰，腫亦不消，尤當急服此散，及隔蒜灸。斯二證乃七情所傷，氣血所損，亦勞證也。宜戒怒節飲食，慎起居，否則不治。

一婦人患乳癰，氣血頗實，但瘡口不合，百法不應。余與神效苦蕒散四劑，少可，更與數劑，及豆豉餅灸之，甚服加減四物湯，腫勢愈大，胃脅背心相引而痛。余謂病後脾弱，怒復傷肝，用八珍加陳皮、黃芪、柴胡、山梔、白芷八劑稍愈。去白芷加青皮、木香、桔梗，又六劑而安。

一婦人左乳內腫如桃，不痛不赤，發熱漸瘦，此肝脾鬱怒也。用八珍湯加香附、遠志、青皮、柴胡百餘劑，又如故。洞見五內乃死，惟不得於夫者有之。婦人以夫爲天，失於所天，乃能生此，謂之巖者，以其如穴之嵌呀空洞，而外無所見，故名曰巖。患此者必經久淹延，惟此婦治之早，正消患於未形，餘者皆死。凡十餘人，又治一初嫁之婦，只以青皮、甘草與之安。

薛己醫按曰：一婦人內熱脅脹，兩乳不時作痛，口內不時辛辣，若臥而起急，則臍下牽痛，此帶脈爲患也。用小柴胡加青皮、黃連、山梔二劑而痊。

一婦人因怒，兩乳腫兼頭痛寒熱，此肝經氣證，用人參敗毒散二劑，表證已退，用小柴胡加芎歸、枳殼、桔梗四劑而愈。

一婦人久鬱，右乳內腫硬，此肝經血證也。用八珍加遠志、貝母、柴胡、青皮及隔蒜灸，兼神效苦蕒散，兩月餘而痊。

一婦人先熱渴，至夜尤甚，後兩乳忽腫，服敗毒藥，熱反熾，診之肝脈洪數，乃熱入血分，用加味小柴胡湯而愈。

一婦人因怒，左乳作痛，發熱，因表散太過，腫熱殊甚，用益氣養榮湯數劑，熱止膿成，因不卽針，益腫脹熱渴，針之，膿大泄，仍服前湯月餘而愈。

格致餘論曰：余族姪婦年十八時，曾得乳巖病，察其形脈稍實，但性急躁，伉儷自諾，所難者後姑耳。遂以本草單方青皮湯，間以加減四物湯，行其經絡之劑，兩月而安。

一婦人年六十，厚味鬱氣而形實多妬，夏無汗而性急，忽左乳結一小核，大如棊子，不痛，自覺神思不佳，不知食味將半月，以人參湯調青皮甘草末，入生薑汁細細呷，一日夜五六次，至五七日消矣。此乃妳巖之始，不早治，隱至五年十年已後發，不痛不癢，必於乳下潰一竅，如巖穴出膿，又或五七年十年，雖飲食兼神效苦薑散三十餘劑，膿潰而愈。

一婦人久鬱，左乳內結核如杏，三月不消，心脈澹，脾脈大，按之無力，此肝脾氣血虧損，以八珍加貝母遠志香附柴胡青皮桔梗五十餘劑而愈。

一婦人稟實性躁，懷抱久鬱，左乳內結一核，按之微痛，此皆氣血鬱滯，以連薤飲十餘劑少退，更以八珍加青皮香附桔梗貝母二十餘劑而愈。

一婦人右乳內結三核，年餘不消，朝寒暮熱，飲食不甘，此肝脾氣血虧損，內服益氣養榮湯，外以木香餅熨之，年餘血氣復而消。

一婦人乳內結核，年餘，晡熱少食，余謂此血氣不足，欲用益氣養榮湯，彼反服行氣之劑，潰出清膿而歿。又一婦乳內結核如栗，亦服前藥，大如覆碗，堅韌如石，出血水而歿。

一婦年踰二十，稟弱，乳內作痛，頭疼脈浮，與人參敗毒散倍加入參一劑，表證悉退，但飲食少思，日晡微熱，更以小柴胡湯合六君子湯，二劑熱退，食進，方以托裏藥加柴胡十餘劑，針出膿而愈。

一婦患此證，膿成畏針，病勢漸盛，乃強針之，膿出三椀許，脈數發渴，以大補藥三十餘劑而愈。丹溪云：「乳房爲陽明所經，乳頭爲厥陰所屬，厥陰者肝也，乃女子致命之地，宗筋之所，且各有囊橐，其始掀腫，雖盛受患，止於一二囊，若膿成不刺，攻潰諸囊矣。壯者猶可，弱者多致不救，所以必針而後愈也。」

自然有乳矣。乃與八珍湯倍加參朮少加肉桂二十餘服。乳遂生。後因勞役復竭。夫其初有乳再產而無其氣血。祇給一產耳。其衰可知。間有產後乳出不止。亦爲氣虛。宜補藥止之。其或斷乳。兒不吮。亦能作脹。則用麥蘖炒爲末。白湯調服以散之。若兒吮破乳頭成瘡。則用蒲公英末。或黃連膩粉散。搽之。若乳頭裂破。以丁香末或蛤粉。臙脂傳之。並效。

一產婦勞役。忽乳汁如湧。昏昧吐痰。此陽氣虛而厥也。灌以獨參湯而甦。更以十全大補湯數劑而安。若婦人氣血方盛。乳房作脹。或無兒飲。脹痛憎寒發熱。用麥芽二三兩炒熟。水煎服。立消。其耗散血氣如此。何脾胃虛弱。飲食不消。方中多用之。

一產婦素有肝火。患陰蝕疔瘡。內潰癢痛。食少熱渴。小水淋瀝。用加味道遙散。加味歸脾湯兼服。間以蘆薈丸。外以鶴虱草煎洗而愈。

一產婦因乳少服藥通之。致乳房腫脹。發熱作渴。余謂血氣虛。以玉露散補之而愈。

證治準繩曰。隆慶庚午。余自秋闈歸。則亡妹已病。蓋自七月乳腫痛不散。八月用火針取膿。醫以十全大補湯與之。外敷鐵箍散。不效。反加喘悶。九月產一女。潰勢益大。而乳房爛。盡延及胃脘。膿水稠粘。出膿幾六七升。略無斂勢。十一月始歸就醫。改用解毒和平中劑。外搽生肌散。龍骨寒水石等藥。膿出不止。流瀝所及。即腫泡潰膿。兩旁紫黑瘡口十數。胃前腋下皆腫潰。不可動側。其勢可畏。余謂產後毒氣乘虛而熾。宜多服黃芪解毒補血益氣生肌。而醫不敢用。十二月中旬後。益甚。瘡口廿餘。諸藥盡試不效。始用余藥。時膿穢粘滯。煎豬蹄湯沃之。頓爽。乃製一方。名黃芪托裏湯。黃芪之甘溫。以排膿益氣。生肌爲君。甘草補胃氣。解毒當歸身和血。生血爲臣。升麻葛根漏蘆爲足陽明本經藥。及連翹防風散結。疎經苦萸仁鼠黏子。解毒去腫。皂角刺引至潰處。白芷入陽明敗膿。長肌。又用川芎三分。及肉桂炒蘖爲引。每劑入酒一盞。煎送白玉霜丸。疎膿解毒。時膿水稠粘。方盛不可遽用收澀之藥。理宜追之以翠青錠子外搽。明日膿水頓稀。痛定穢解。始有向安之勢。至辛未新正。患處皆生新肉。有紫腫處。俱用葱熨法。隨手消散。



一婦人因怒，左乳作痛，胃脘不利，此屬肝脾氣滯，以方脈流氣飲，加木香青皮四劑而安。

一婦人患此，膿清腫硬，面黃少食，內熱晡熱，自汗盜汗，月經不行，此肝脾氣血俱虛也。用十全大補，加遠志貝母，及補中益氣各三十餘劑，外用葱熨法而消。

一婦人患此，膿成脹痛，余欲針之，使毒不侵展。不從，至數日，針出敗膿三四椀許，虛證蜂起，幾至危殆，用大補之劑，兩月餘始愈。

一婦人素弱多鬱，患時疫後，脾胃愈虛，飲食愈少，因怒右乳脅紅腫，應內作痛，或用炒麩皮熨之，內痛益而愈。

一婦患此未潰，亦與前藥三劑而消。良甫云：「如有乳癰，便服此藥，可杜絕病根。如毒已成，能化膿爲水，毒未成者，則從大小便中散之。」

郭氏妾，乃放出宮人，年四十，左乳內結一核，堅韌，按之微痛，脈弱，嬾言，此鬱結證也，名曰乳巖，須服解鬱結益血氣藥，百貼可保。郭謂不然，別服十宣散流氣飲，瘡反盛。逾二年，復請余視，其形如覆椀，腫韌如石，膿出如泔。余謂膿清脈大，寒熱發渴，治之無功，果破。

一婦人患乳癰，寒熱頭痛，與荆防敗毒散一劑，更與蒲公英一握，搗爛，入酒二三盞，再搗，取酒熱服，查熱悉處而消。丹溪云：「此草散熱毒，消腫核，又散滯氣，解金石毒之聖藥。」

一婦人患乳癰，愈後發熱，服養氣血藥不應，與八珍湯加炮薑四劑而止，仍以前湯加黃芪香附三十餘劑，氣血平復。

一婦人乳腫而不作膿，以益氣養榮湯，加香附青皮數劑而膿成，針之，旬日而愈。

一婦人右乳腫發熱，怠惰臥，無氣以動，至夜熱益甚，以補中益氣湯，兼逍遙散治之而痊。

一婦人兩乳內時常作痛，口內常絆，臥起若急，臍下牽痛，以小柴胡湯加青皮黃連山梔治之而痊。

一婦人產次子而無乳，服下乳藥，但作脹。余謂人乳皆氣血所化，今脹而無乳，是血氣竭而津液亡也。如補其氣血，

# 欽定古今圖書集成醫部全錄

## 醫部彙考四百

### 婦人前陰諸疾門

#### 漢張機金匱要略

##### ○前陰諸證

少陰脈滑而數者，陰中卽生瘡，陰中蝕瘡爛者，狼牙湯洗之。  
婦人臍腫如瓜，陰中疼引腰痛者，杏仁湯主之。  
婦人陰寒溫中坐藥，蛇牀子散主之。  
胃氣下泄，陰吹而正喧，此穀氣之實也，膏髮煎導之。

#### 晉王叔和脈經

##### ○脈證

少陰脈數則氣淋，陰中生瘡。  
婦人少陰脈弦者，白腸必挺核。

但近腋足少陽分尙未斂，乃加柴胡一錢，青皮三分，川芎倍之。膿水將淨者，卽用搜膿散搽之，元宵後遂全安。

外科正宗曰：一婦人因怒，左乳腫痛，寒熱交作，以人參敗毒散一劑，表證已退，又以牛蒡子湯二服，腫消漸漸而安。

一婦人憂思過度，久鬱成痛，左乳結核如桃，半年似痛非痛，欬嗽生痰，身發潮熱，診之脈微數而無力，此真氣雖弱，而邪火尙未之餘，如用藥合理，亦堪調治。先用逍遙散，加香附貝母十餘服，而欬嗽漸止，寒熱間作。又以八珍湯，加香附丹皮柴胡遠志十餘服，身熱去其八九。又以益氣養榮湯，加青皮木香，兩月餘其胃膈得利，噯氣得舒，飲食漸進，肌膚漸澤。外腫以阿魏化痞膏貼之，半年餘而消。

一婦人右乳疼痛，腫如覆碗，診之脈數有力，此有餘證欲作膿也。以托裏消毒散，數服而脹痛，卽針之，出膿碗許，又以十全大補湯，加香附十餘服而安。

一婦人暴怒，左乳結鞭疼痛，自服仙方活命飲，二服疼痛稍止，結腫不消，仍服清涼敗毒之劑，痛腫反作，形體日弱。余診之，脈浮數而無力，此屬真氣虛而邪氣實也，非補不可以益氣養榮湯四五服，其腫始高，寒熱亦退。又十餘服而膿潰，兼以十全大補湯兩月而痊，此非純補之功，其疾豈能得愈？

一婦人左乳結核三年方生腫痛，診之脈緊數而有力，此陽有餘而陰不足也。况結腫如石，皮肉紫色不澤，此乳巖證也，辭不治，後果歿。

又一婦左乳結腫，或小或大，或軟或硬，俱不爲痛，已半年餘，方發腫如覆碗，堅硬木，痛近乳頭，壘壘遍生疙瘡，時痛時痒。診之脈弦而數，腫皮慘黑不澤，此氣血已死，辭不可治。

不泄越故令腫也

婦人陰冷，因勞傷子臟，風冷客之，用五加皮、乾薑、丹參、蛇牀子、熟地、黃杜仲各三兩，鍾乳粉四兩，天門冬一兩，地骨皮二兩，酒十五升，漬二宿，每服一盞，空心食前飲之。

註：前證屬肝經，內有濕熱，外乘風冷所致。若小便澀滯，或小腹痞痛，用龍膽瀉肝湯。若內熱寒熱，或經候不調，用加味逍遙散。若寒熱體倦，飲食少思，用加味四君子。若鬱怒發熱，少寐懶食，用加味歸脾湯。

### 明薛己醫按

#### ○陰病證治

婦人陰中生瘡，乃七情鬱火，傷損肝脾，濕熱下注，其外證陰中出如蛇如菌，或如雞冠狀，或生蟲濕癢，或潰爛出水，或腫悶墜痛，其內證體倦內熱，經候不調，或飲食無味，晡熱發熱，或胷脅不利，小便痞脹，或赤白帶下，小水淋漓，其治法，腫痛者，四物湯加柴梔丹皮膽草，濕癢者，歸脾湯加柴梔丹皮，淋漓者，龍膽瀉肝湯加白朮丹皮，潰腐者，逍遙散加山梔川芎，腫悶墜痛者，補中益氣湯加山梔丹皮，佐以外治之法。

女子交接傷丈夫頭痛，當用補中益氣六味地黃，以滋化源爲主。

婦人小戶嫁痛，當從女人交接傷丈夫頭痛門，互相主治。

### 李梴醫學入門

#### ○陰病證治

陰中挺出一條尺許如蛇痛墜出水溺澀者，朝服補中益氣湯，晚服龍膽瀉肝湯，外塗藜蘆膏而收。

少陰脈浮而動，浮則爲虛，動則爲痛，婦人則脫下。

師曰：脈得浮緊，法當身軀疼痛，設不痛者，當射云何？因當射言，若腸中痛，腹中鳴，欬者，因失便，婦人得此脈者，法當陰吹。

師曰：寸口脈浮而弱，浮則爲虛，弱則無血，浮則短氣，弱則有熱，而自汗出。跌陽脈浮而濇，浮則氣滿，濇則有寒，喜噦吞酸，其氣不下，少腹則寒。少陰脈弱而微，微則少血，弱則生風，微弱相搏，陰中惡寒，胃氣下泄，吹而正喧。

### 宋陳自明婦人良方

#### ○陰病方論

婦人陰挺下脫，或因胞絡傷損，或因子臟虛冷，或因分娩用力所致。

註：前證當升補元氣爲主。若肝脾鬱結，氣虛下陷，用補中益氣湯。若肝火濕熱，小便濇滯，用龍膽瀉肝湯。

婦人陰癢爲三蟲在腸胃之間，因臟虛而蝕，陰中微則爲癢，甚則爲痛也。

註：前證屬肝經所化，當用龍膽瀉肝湯，逍遙散以主其內外。以桃仁研膏和雄黃末，或雞肝納陰中以制其蟲。

按：大全三蟲動作，發於陰內，其蟲作熱，微則爲癢，重則爲痛也。

婦人少陰脈數而滑者，陰中有瘡，名曰蠶，或痛或癢，如蟲行狀，膿水淋漓，亦有陰蝕幾盡，皆由心神煩鬱，脾胃虛弱，氣血流滯耳。內當補心養胃，外以藥傅洗乃可。

註：按前證乃肝脾鬱結之證，木旺生蟲耳，宜解鬱清肝。

婦人陰腫，因胞絡素虛，風邪客之，乘於陰部，血氣相搏故也。

註：前證若氣血虛弱，用補中益氣湯，舉而補之，肝經濕熱，用龍膽瀉肝湯，滲而清之。但陰腫及陰冷陰挺等證，仍當與陰癢方論參看。

# 張三錫醫學準繩六要

## ○陰病總論

婦人陰瘡，乃七情鬱火，傷損肝脾，濕熱下注，其外證有陰中舒出如蛇，俗呼陰挺，有翻突出如菌，俗呼陰菌，亦有如雞冠花，有生蟲腫痛濕癢，潰爛出水，脹悶脫墜者，其內證口乾內熱，體倦，經候不調，飲食無味，哺熱發熱，胃脘不利，脅脹小腹疼痛，赤白帶下，小水淋澀。治法：腫痛宜四物加柴胡山梔膽草丹皮濕癢者宜歸脾加山梔丹皮柴胡淋瀝者宜龍膽瀉肝湯加白朮丹皮潰爛者加味逍遙散腫墜宜補中益氣加山梔丹皮薛氏之法，確不可易。

## ○證治

婦人陰蝕瘡，濕熱客於肝經而然。陰戶生蟲，癢不可忍，入臟腑即死，令人發熱惡寒，與癆相似，用熟豬肝切長條，乘熱內陰中以取蟲，蟲聞腥俱出肝上，如此數次，內服瀉肝和血藥亦妙。

陰中癢亦是肝家濕熱瀉肝湯妙。瘦人燥癢屬陰虛，坎離爲主，外用蛇牀子煎湯洗之。蠶瘡同治，要分虛實耳。尺脈數，婦人陰中生瘡，下部蠶久之有蟲，用豬肝煮熟，切長條納陰中，引蟲出，乃上殺蟲藥。

陰茄，乃婦人陰中腫痛不可忍，有物如茄突出，即是男子之疝，但名痕聚耳，俱屬肝經濁氣平肝破氣爲主，與疝同治，外以枳實切碎炒熱，帛包熨之，冷再易，但是陰痛俱妙。

新室嫁孔痛，宜舒鬱和血，四物加香附紅花。

婦人陰冷肥盛者，多是濕痰下流所致，二朮二陳加風藥，外用坐藥妙。

## 明王肯堂證治準繩

陰中突出如菌如雞冠，四圍腫痛者，乃肝鬱脾虛下陷，先以補中益氣湯，加山梔茯苓車前子青皮以清肝火，兼升脾氣漸愈，更以歸脾湯加山梔茯苓川芎調理，外塗藜蘆膏。

陰戶突出，因勞力者，血虛四物湯加龍骨，氣虛補中益氣湯。

陰中生蟲，蟻如小蛆者，乃濕熱甚而心氣又鬱，氣血凝滯而生，宜藿香養胃湯，補心湯，古硫鯉丸，外用生艾汁調雄黃末，燒烟熏之，更用雄黃銳散納陰中。

陰中生細蟲，癢不可忍，食入臟腑即死，令人發寒熱與癆證相似。先以蛇牀子煎湯，洗淨拭乾，後用梓樹皮焙乾爲末，入枯礬四分之一，麝香少許敷之，立效。

陰腫痛極，便秘欲死者，枳橘熨，但腫痛者，四物湯加柴胡山梔牡丹皮龍膽草。如時常陰痛者，四物湯加藁本防風。濕癢出水又痛者，憂思過也，歸脾湯加柴胡山梔牡丹皮芍藥生甘草。

陰戶腫痛不閉者，逍遙散十全大補湯。腫消不閉者，補中益氣湯。腫墜者，加山梔牡丹皮。

陰戶腫痛不閉，寒熱溺澀，體倦少食者，補中益氣湯，加升麻柴胡至一錢，量入茯苓山梔。

陰戶不閉，小便淋瀝，腹中一物攻動脹痛者，逍遙散加柴胡山梔車前子。交接出血，乃房室有傷，肝脾虛不藏血，補中益氣湯，外用熟艾帛裹入陰中，或用亂髮青皮燒灰傅之。若出血過多，見雜證者，調補肝脾自愈。

○脈法

少陰脈浮而動，浮則爲虛，動則爲痛，或崩帶，或陰戶脫下。

少陰滑數，或爲氣淋，或陰中生瘡痛癢。

少陰微者，氣閉膀胱，女人見之陰中生瘡，大實易愈，虛瀉其亡。

少陰脈弦，則陰戶掣痛白腸疝。

胡山梔白芍丹皮間服。交出血者，肝虛有火不能藏血，四物湯加膽草、黃芩、山梔、柴胡。新交房事傷而腫痛者，珍珠散、豬脊髓調搽。又婦人久居寡室，淫火動而又鬱，鬱而又動，邪火久注，多致陰中作癢生蟲，此蟲食人內臟，陰中腐爛，攻刺疼痛，臭水淋漓，口乾發熱，形削不食，有此證者，非藥能愈，終歸於死。又名失合證也。

石室祕錄 臣陳士鐸著

○治法

女人陰內生蟲，乃濕熱也，用雞肝入藥末引之亦妙。終不若用蚯蚓三四條，葱數根，各火上炙乾為末，用蜜一椀，煮成膏，將藥搗於其中，納入陰戶，蟲盡死矣，自然隨溺而下。又婦人陰門邊生瘡，作癢作痛不止者，以此方煎水洗之立效。方用蛇牀子一兩，花椒三錢，白礬三錢，水十碗，煎五碗，乘熱熏之，溫則洗之，一次即止癢，二次即止痛，三日即全愈，分作五日洗之，每日止須洗一次，神效之極。

婦人羞隱之處，不便明言，然大約非寒則熱耳。今有一方，先用歸芍各三錢，川芎一錢，熟地五錢，甘草、柴胡、白芥子各一錢，黃芩、炮薑各三分，水煎服。服後較前平善，則是虛證也，隨用四物湯治之可也。未好則是熱病作祟，方中加梔子三錢，治之必奏效。

方

○補中益氣湯 醫按下同 治女人氣血虛弱陰腫。

陳皮五分，黃芪炒，人參，白朮炒，甘草炙，當歸各一錢。柴胡，升麻各三分。右薑棗水煎，空心午前服。



○陰病證治

婦人陰中生痔者凡九竅有肉突出，皆名爲痔。

婦人茄子疾，卽陰痔也。由心躁連綿，黃水易治，白水難愈。

良方云：婦人少陰脈數而滑者，陰中必生瘡，名曰蠶瘡，或痛或癢，如蟲行狀，淋露濃汁，陰蝕幾盡者，此皆由心神煩鬱，胃氣虛弱，致氣血留滯。按經云：「諸痛癢瘡，皆屬於心。」又云：「陽明主肌肉痛癢，皆屬於心。」治之故當補心養胃，外以熏洗坐導藥治之乃可。

婦人陰瘡連氣皆屬寒。經云：「太陽之勝，氣中乃瘍，隱曲不利，治以苦熱。」是也。

婦人陰瘡者，由三蟲或九蟲動作侵蝕所爲也。諸蟲在人腸胃之間，若臟腑調和，血氣充實，不能爲害。若勞傷經絡，腸胃虛損，則動作侵蝕於陰，輕者或癢或痛，重者生瘡。仲景云：「診其少陰之脈滑而數者，陰中生瘡也。」

明陳實功外科正宗

○總論

婦人陰瘡，乃七情鬱火，傷損肝脾，濕熱下注爲患，其形固多不一，總由邪火所化也。陰中有如挺出一條蛇形，尺許墜重流水，溺澀者，乃脾氣下陷，肝火從之，朝服補中益氣湯，晚服龍膽瀉肝湯，外塗雄黃藥蘆散，其患漸收。陰中突出如菌子，如雞冠，四邊腫痛者，乃肝鬱脾虛所致，先以補中益氣湯，加山梔、茯苓、青皮、清肝、補脾，兼升中氣，更以歸脾湯，加山梔、川芎、茯苓、神香、附陳皮調理。陰戶忽然腫突作痛，因勞傷血分，濕火下流，宜四物湯，加丹皮、澤瀉、瀉花粉、柴胡治之。陰中生蟲，髮如小蛆者，乃心氣鬱而邪火所化，宜四物加黃連、膽草、木通、石菖蒲，以通散心竅，鬱滯外以銀杏散納入陰中。陰器外生疙瘡，內生細蟲作癢不可忍者，此蟲食入臟腑卽死，令人多發寒熱，與癩瘡相似，有此證之婦人，畏羞都不肯說，因循日久，面黃肌瘦，身發寒熱，欬嗽生痰，往往不治者多矣。如有此證，急與逍遙散、香薷散。

滑石二錢，川芎，當歸，白芍，生地，山梔，黃連，連翹，膽草各一錢。銀柴胡，澤瀉，木通各六分。蘆薈五分，甘草三分，防風八分。右水二鍾，淡竹葉燈心各二十件煎八分，食前服。

③涼榮瀉火湯 治婦人懷抱憂鬱不清，致生內熱，小水澀滯，大便祕結，及陰中火鬱作痛，亦如澀淋，宜此瀉之。

川芎，當歸，白芍，生地，黃芩，黃連，山梔，木通，柴胡，茵陳，膽草，知母，麥門冬各一錢。甘草五分，大黃酒炒二錢。右水二鍾煎八分，空心服，便利去大黃。

④楊瘰湯 治證與銀杏散同。

苦參，威靈仙，蛇牀子，歸尾，狼毒各五分。鶴虱草一兩。右用河水十碗，煎數滾，濾清貯盆內，乘熱先熏，待溫後洗，臨洗和入公猪膽汁二三枚同洗，更妙。

⑤雄黃藜蘆散 治女人陰中突出如蛇，或似鷄冠菌樣者。

葱管藜蘆碾細如麪二錢，輕粉，雄黃並細研，鼈頭煨黃色各一錢。冰片二分。右各研極細末，和勻再研，磁罐收貯，先用芎歸湯煎洗，隨後搽藥早晚二次。

⑥芎歸湯 治證同上。

川芎，當歸，白芷，甘草，膽草各等分。右每用五錢煎湯，浴洗患上，隨後搽藥。

⑦內疎黃連湯 陰瘡應用之藥。

木香，黃連，山梔，當歸，黃芩，白芍藥，薄荷，檳榔，桔梗，連翹各一錢。甘草五分，大黃二錢。右水二茶鍾煎八分，食前服，臨服加蜜二匙亦可。

⑧透膿散 治同上。

①龍膽瀉肝湯 治女人陰中生瘡淋澀用此加減。

龍膽草酒拌炒黃，澤瀉各一錢，車前子炒，木通，生地黄酒拌，當歸酒拌，山梔仁炒，黃芩炒，甘草各五分。右水煎服。

②四物湯 治女人陰腫作痛用此加減。

當歸酒拌，芍藥炒，川芎各一錢，熟地黃三錢。右水煎服。

③逍遙散 治女人陰瘡潰爛用此加減。

甘草炙，當歸炒，白芍藥酒炒，白茯苓，白朮炒各一錢。柴胡酒炒五分。右水煎服。

④歸脾湯入門下同 治女人陰戶突出用此加減。

當歸，龍眼肉，棗仁，遠志，人參，黃芪，白朮，茯神各一錢。木香五分，甘草三分。右薑棗煎服。

⑤古硫鯉丸 治女人陰中生蟲。

大鯉魚一箇去頭皮，硫黃一兩。右將硫黃入鯉魚內，黃泥固濟，火煨烟盡為末，米糊丸梧子大，每二十九溫酒下。如下疳生蟲所下，如柿汁臭穢及心中疔痛悶絕虛煩甚者不治。

⑥雄黃銳散 治女人陰中生蟲用此納之。

雄黃別研，青箱子，苦參，黃連各二錢半，桃仁一錢。右為末，生艾搗汁和如小指尖大，綿裹納下部肛門內。

⑦銀杏散 外科正宗下同 治女人濕熱下注陰中作癢及內外生瘡。

杏仁去皮尖研，輕粉，水銀鉛製，雄黃各一錢。右各為細末，共和一處，每用五分，棗肉一枚，和丸，用絲綵包裹，留一綿條撚線在外，用搗癢湯煎洗，將藥安入陰內，留線在外，恐小便取出再入，一日一換，重者只四五枚，痊愈。

仍兼服後藥。

食茱萸，吳茱萸湯浸微炒，白蒺藜，青皮，桔梗水浸漉出慢火炒，舶上茴香淘去砂土焙，山茱萸肉微炒，各一兩。五味子淨，海藻洗焙，大腹皮酒洗曬，川棟子肉，延胡各一兩二錢半。右為末，酒糊為丸如梧子大，每服三十五丸，木通湯下。一方每服二錢，生地黃湯調，仍用金毛狗脊五倍子白礬水楊根魚腥草川黃連各一兩為散，分作四服，以有嘴瓦罐煎熟，預以銀錫作一長小筒，下透罐嘴，嘴上貫挺上先熏後洗立效。更服白薇散凌霄花少許煎。如下虛，加川烏炮去皮肉桂去粗皮各一兩。如腰腹痛甚，加桃仁去皮尖熬炒別研青皮去白。枳實去穰各一兩。真南木香七錢半服之。

③一捻金丸 服前藥未效，却用此丸。

延胡索，舶上藜香，吳茱萸炒，川棟子去核，青木香，各二兩。右為末，粳米飯糊丸如梧子大，每服三十五丸，空心，木通湯服。又用梅花腦子五分，鐵孕粉一錢，水調刷上。如陰畔生瘡，以涼血飲，每服三錢，加凌霄花少許煎，空心服見效。

④黃芩散 治婦人陰挺脫下。

黃芩，蝟皮炒微焦，當歸各半兩，赤芍一兩，牡蠣，竹皮，各二兩。狐莖一具，一作狐皮。右治下篩飲服方寸匕，日三，禁舉重房勞冷食。一方以酒服二錢妙。

⑤丹溪方 權小娘瘡後，右腿股生癩，破後筋吊疼，脈虛而瀉，詢之，小便時疼，患處亦相應，宜與生血導熱。

川芎，當歸頭，條芩，生地，赤芍，牛膝，黃蘗，甘草炙，各二分。青皮炒，檳榔，各五分。通草三分，桂皮一錢。右煎食前熱飲之。

⑥潔古方 治男子婦人陰部濕淫瘡。

黃芪四錢，穿山甲炒末一錢，川芎三錢，當歸二錢，皂角針一錢五分。右水二鍾煎一半，臨服入酒一杯亦好。

⑤八珍湯 治同上。

川芎，白芍，當歸，熟地黃，人參，白朮，茯苓，各一錢。甘草炙五分。右水二鍾，薑三片，棗三枚，煎八分，食前服。

⑥加減八味丸 治同上。

茯苓，山藥，丹皮，各四兩。山萸肉五兩，澤瀉蒸三兩，五味子炒三兩，肉桂六錢，熟地杵膏酒煮八兩。右共為末，煉蜜丸如梧子大，每服二錢，空心服，鹽湯送下。尋常酒服亦可。

⑦小柴胡湯 治同上。

柴胡二錢，黃芩炒一錢，人參，半夏，各七分。甘草炙五分。右薑水煎服。

⑧消風散 治同上。

當歸，生地，防風，蟬蛻，知母，苦參，胡麻，荆芥，蒼朮，牛蒡子，石膏，各一錢。甘草，木通，各五分。右水煎，食遠服。

⑨蘆薈丸 治同上。

胡黃連，黃連，蘆薈，白蕪荑，白雷丸，青皮，鶴蟲草，各一兩。麝香一錢，木香三錢。右為末，蒸餅糊丸如麻子大，每服一錢，空心清米湯下。

⑩加味逍遙散 治同上。

柴胡五分，甘草炙，當歸炒，芍藥酒炒，茯苓，白朮炒，各一錢。丹皮，山梔各隨宜。右水煎服。

⑪三棗丸 準繩下同

治陰中生一物，牽引腰腹脹痛，甚至不思飲食，皆因多服熱藥及煎燂，或犯非理。

雄黃散 治同上。

雄黃，川芎，辰砂，藜蘆，北細辛，當歸，川椒，各分兩隨宜。右為末，綿裹內陰中，又傅外瘡上，忌如常法。

補心湯 危氏方 治陰中生瘡，名曰匿瘡，或痛或癢，如蟲行狀，淋瀝膿水。

白茯苓，人參，前胡，半夏湯洗七次去滑。川芎，各三分。枳殼去穰麩炒，紫蘇，桔梗，甘草炙，橘皮，乾薑，各半兩。當歸一兩三錢，白芍藥二兩，熟地黃一兩半。右剉散，每服四錢水一盞半薑五片，棗一枚，同煎食前服。

又方 準繩下同 治同上。

五倍子，甘草，滑石，黃丹，各等分。右為末，先以甘草湯洗，然後傅之。

又方 治同上。

真平胃散，貫衆末。右每服二錢，煮熟豬肝拌藥，內陰戶，數日可安。

又方 治同上。

當歸散 治婦人陰中突出一物長五六寸名陰挺。

當歸，黃芩，各二兩。牡蠣一兩半，赤芍五錢，蝟皮一兩炙。右為末，每服二錢，食前，溫酒調下，滾湯亦可。如不應更以補中益氣湯，倍加升麻柴胡兼服之。

又方 治證同上。

當歸，穿山甲炙，蒲黃炒，各半兩。辰砂一錢，麝香少許。右為末，每服三錢，酒調下尤效。

又方 治證同上。

菖蒲散 治婦人陰戶腫痛，月水澀滯。

菖蒲，當歸，各一錢。秦芫七錢半，吳萸製五錢。右為末，每服三錢，空心葱湯調下，更以枳實炒熱，頻熨患處。

又方 治陰內膿水淋漓或癢痛。

文蛤研，乳香各五分。白礬一錢，銅綠少許，輕粉一字。右為極細末，洗淨搽之。

⑤當歸湯準繩 治婦人陰蝕瘡

當歸，川芎，芍藥，甘草各二兩。地榆三兩，右細切，以水五升，煮取三升，去查熏洗，日三夜二。一方用蛇牀子，不用川芎。

⑥藿香養胃湯危氏方 治陽明經虛不榮肌肉，陰中生瘡不愈。

藿香，白朮，白茯苓，神麴炒，烏藥，砂仁，薏苡仁，半夏麴，人參各半兩。華澄茄，甘草炙各三錢半。右剉散，每服四錢，水一盞半，薑五片，棗三枚，同煎，不拘時候。

⑦又方千金方 治陰瘡

蕪荑，芎藭，黃芩，甘草，礬石，雄黃，附子，白芷，黃連各六銖。右咬咀，取豬膏四兩，合煎，傅之。

⑧又方準繩下同 治婦人陰瘡與男子妬精瘡，大同小異。

黃丹，枯白礬，蕭蓄，藁本各一兩。白蛇皮一條，燒灰，硫黃半兩，荆芥，蛇牀子各半兩，研細。右細末，另以荆芥蛇牀子煎湯溫洗，軟帛拭乾，清油調塗，如瘡濕乾未搽之。

⑨又方 治疔瘡因月後便行房，致成湛濁，伏流陰道，疔瘡遂生，搔癢無時，先用胡椒葱白作湯，一日

兩三度淋洗，却服後藥。

赤石脂，龍骨，黑牽牛炒，菟絲子酒浸蒸，黃芪鹽水炙，沙苑蒺藜炒。右為末，蜜丸，梧桐子大，每服二十丸，燕窩蒸酒，澄上清者吞下。

⑩肘後方 療女人陰中生瘡。

杏仁，雄黃，礬石各二分，麝香二分半。右四味研細，傅之。

⑪黃芩湯 療婦人陰中生瘡。

白礬半兩，甘草半分生，大黃一分生。右爲細末，每用棗大，縣裏內陰中，日兩換。

⑤大黃散 治婦人陰癢。

大黃微炒，黃芩，黃芪炙，各一兩。赤芍藥，元參，丹參，山茱萸，蛇牀子，各半兩。右爲細末，食前溫酒調二錢服。

調二錢服。

⑥廣濟方 療婦人陰癢不止。

藜蘆二錢半，蚌蛇膽，雄黃，硫黃，朱砂，硝石，蕪荑，各半兩。右爲細末研停，以臘月豬脂和如膏，用故布作纏子，如指長一寸半，以藥塗上，內陰中，日一易之。易時宜用豬椒根三五兩水煮，稍熱洗乾拭內之效。

⑦千金方 療小戶嫁痛連日。

甘草，生薑，各三分。白芍藥，桂心，各二分。右細剉，以酒二升煮取三沸，去滓溫服，神良。

⑧珍珠散 外科正宗

青缸花五分，珍珠一錢，不論大小，以新白爲上，入豆腐內，煮數滾，研爲極細無聲，方用。真輕粉一兩。右三味，共研千轉，細如飛麵，方入罐收。如無青缸花，用頭刀錠花輕虛色翠者代之，終不及缸花爲妙。

⑨海螵蛸散 療婦人小戶嫁痛。

鷓鴣魚骨二枚。右一味，燒研細末，酒調方寸匕，日三服。

⑩單行太和湯 療婦人嫁痛。

大黃三兩。右一味切，以酒一升煮一沸，頓服。

⑪洗心散 治女人陰挺。

麻黃，當歸，生大黃，荊芥穗，赤芍藥，甘草，各一錢。白朮五分。右剉作一貼，入薄荷七葉，水煎服。

⑫洗心散 治女人陰挺。

麻黃，當歸，生大黃，荊芥穗，赤芍藥，甘草，各一錢。白朮五分。右剉作一貼，入薄荷七葉，水煎服。



升麻，白芷，黃連，木通，當歸，川芎，白朮，茯苓。右水煎服，更用搗腫湯浴洗。

②搗腫湯 治婦人陰戶生瘡或癢痛或膿水淋漓。

甘草，乾漆，各三錢。生地黃，黃芩，當歸，川芎，各二錢。鼈甲五錢炙。作一劑，用水數碗，煎數沸去粗，常

洗患處。

③洗搗散 大全 治陰蝕瘡。

甘草，乾漆，各一兩。黃芩，當歸，地黃，芍藥，各二兩。龜甲五兩。右細切，以水七升，煮取一半，去查，以綿

帛內湯中，用搗瘡處，良久即易，日二度。每搗湯可作十里許，即搗乾，捻取疔濕散，薄傅瘡上，使徧可經半日，又以湯

搗搗訖，如前傳藥。

④疔濕散 準繩下同 治證同上。

蝮蛇膽真者，青木香，石硫黃，鐵精粉，麝香，各四分。臨時入，緣麝辟蛇毒，若先相和，膽即無力。右各等分爲末，更

研細有患，取如三碁子大，和井華水，日再服訖，先令便利，即以單方內桃枝熏法，先熏下部訖，然後取藥如碁子

大，安竹管裏內，下部中，日再度，老少量減，其熏法，每日一度，不用再舊，用五月五日蝦蟆。

⑤蛇牀子散 濕熱陰中生瘡主藥。

蛇牀子仁，白粉少許，和令相得如棗大，絲裏內之，自然濕熱消散。

⑥狼牙湯 錄驗 治婦人陰蝕，其中爛傷，膿水淋漓臭穢。

狼牙三兩。右咬咀，以水四升，煮至五合，去查，內苦酒如雞子中黃，大沸湯一杯，消盡，夜適寒溫，以絲纏筋頭，大如

繭，濡湯以瀝瘡中，日四五度即瘥。

⑦麻黃湯 治婦人陰腫或瘡爛者。

麻黃，黃連，蛇牀子，各二兩。北艾葉一兩半。烏梅十箇。右剉細，以水一斗，煮取五升，去查，熱洗，避風冷。

⑤ 温中坐藥蛇牀子散 治婦人陰冷

蛇牀子，白粉少許。右爲末和勻，丸如棗大，綿裹內陰中，自然温矣。

⑥ 八味丸 治血弱不能榮養臟腑，津液枯澀，風寒客於子臟，以致陰冷。

熟地黄八兩，杵膏。山茱萸肉，乾山藥，各四兩。丹皮，茯苓，澤瀉，各三兩。肉桂，附子，各一兩。右爲末和地黃膏加煉蜜，丸桐子大，每服七八十九，空心食前滾湯下。按此丸果係肝脾腎虛，殊有神效。

### 單方

婦人陰挺出下脫，桂心，吳茱萸各一兩，戎鹽二兩，並熬令色變，搗羅爲末，以綿裹如指大，內陰中，日再易之，甚妙。一方用川椒不用桂心。準繩下同。

又方。川椒川烏頭，並生用白芨各半兩，搗羅爲末，綿裹一錢，內陰中，深三寸，腹中熱即止，來日再用之。一方無川椒，止用川烏頭白芨二味。

又方。蛇牀子五兩，烏梅二七枚，以水五升，煮取三升，去查稍熱洗之，每日夜二五度用。

又方。硫黃，鰂骨各半兩，搗羅爲末，傅之。

又方。鐵精粉研細，以羊脂調布裏炙，令熱熨之，以瘡爲度。

又方。弊帚頭燒爲灰，酒服方寸匕，食前服。

又方。用荊芥穗，臭椿樹皮，葢香葉煎湯熏洗，即入。

⑤膏髮煎 仲景 治婦人胃氣下泄，陰吹而正喧。

豬膏半斤，亂髮如雞子大三枚。右二味和膏中煎之，髮消藥成，分再服。

⑥集驗方 治女人傷丈夫四體沉重，嘔吸頭痛。

生地黃八兩，芍藥五兩，豉一升，葱白一斤，生薑四兩，甘草二兩。右六味以水七升，煮取二升半，分三

服，不得重作忌房事。

⑦桑白皮湯 療諸婦人傷丈夫，苦頭痛欲嘔悶。

桑皮半兩，乾薑一疊，桂心五寸，大棗二十枚。右四味切，以酒一斛，煮三四沸，去滓，分溫服，衣適厚薄，毋令

汗出。

⑧來復丹 治婦人與男子交接相傷，因而四肢沉重，頭痛昏運。

青皮去白，陳皮去白，五靈脂水澄去砂，曬乾各二兩。舶上硫黃透明者。太陰元精石研水飛。硝石同硫

黃為末，入瓷碟內，以微火炒，用柳箆攪，不可火太過，恐傷藥力，再研極細，名二氣末，各一兩。右用五靈脂青橘皮

為末，次入元精石末，及前二氣末拌勻，好酢打糊，為丸，豌豆大，每服三十九丸，空心米飲下。

⑨五加皮浸酒方 聖惠方 治婦人癯瘦陰冷。

五加皮，熟地黃，丹參，杜仲去粗皮，炙微黃，蛇牀子，乾薑各三兩。天冬一兩，鍾乳四兩，地骨皮二

兩。右細剉，以生絹袋盛，以酒一斗五升，漬二宿後，每煖服一大瓊，空心及晚食前服。一方用枸杞子，無地骨皮。

⑩又方 大全 治婦人陰冷。

遠志，乾薑生用，蓮花各半兩，蛇牀子，五味子各一兩。右搗羅為末，每用兼以免糞塗陰門，用綿裹一錢

內陰中，熱即為效。

⑪又方 治同上。

女子陰瘡硫黃末傅之瘥乃止肘後方

女人陰瘡如蟲咬癢痛者生搗桃葉綿裹納之日三四易。食療

婦人陰門邊生瘡作癢作痛不止者蛇牀子一兩花椒白礬各三錢水十碗煎五碗乘熱熏之溫則洗之一次即止

癢二次即止痛三次即全愈分作五日洗之每日止洗一次神效。石室神錄

婦人陰腫堅痛枳實半斤麩炒帛裹熨之冷即易。子母秘錄

婦人陰腫或生瘡枸杞根煎湯頻洗。永類方

婦人陰腫作癢蒜湯洗之效乃止。

女人陰腫甘菊苗搗爛煎湯先熏後洗得效方。

婦人陰痛青布裹鹽熨之。藥性論

又方礬石三分炒甘草末半分綿裹導之取瘥。百一

婦人陰痛絹盛蛇牀子蒸熱熨之。千金下同

又方牛膝五兩酒三升煮取一升半去滓分三服。

婦人陰挺鐵精粉一錢龍腦半錢研水調刷產門得效方。

女陰挺出茄根燒存性爲末油調在紙上捲筒安入內一日一上。乾坤生意

婦人陰癩硬如卵狀隨病之左右取穿山甲之左右邊五錢以砂炒焦黃爲末每服二錢酒下。摘元方

婦人陰脫作癢礬石燒研空心酒服方寸匕日三。千金翼方

又方用白芨川烏頭等分爲末絹裹一錢納陰中入三寸腹內熱即止日用一次。廣濟方

婦人陰脫煎羊脂頻塗之。廣利方

又方。用蓖麻子葉有九角者，好飛過白礬爲末，以紙片攤藥托入。

又方。先以淡竹根煎湯洗，仍用五倍子白礬爲末乾摻立效。

又方。用溫鹽水洗軟，却用五靈脂燒烟熏次用蓖麻子研爛塗上吸入，如入卽洗去。

婦人陰中生痔，用烏頭七箇燒存性，用小瓦罐盛醃酢淬之，乘熱熏候溫通手沃之良。

婦人茄子疾用茄皮白礬馬椿頭根，研碎澤蘭煮水熏洗，加入炒石灰少許妙。

又方用朴硝爲末，黃荆柴燒瀝調傅，或濃磨鐵漿水調傅。

又方。用生枳殼爲散，煎湯熏洗，却用綿帛包枳殼查，納入陰中，卽日漸消。

女人陰蝕，取東南桃枝五七枝，輕打頭使散，以絲纏之。又搗石硫黃爲末，將此絲纏桃枝撚轉之，令末少厚。又截一

竹筒，先內下部中，仍以所撚藥桃枝燒著熏之。

陰蝕蒲黃三升，水銀一兩，二味研勻，以粉傅上。

又方。肥猪肉十斤，水一石，煮水浸冷卽易，不過三兩度。

陰蝕欲盡，以蝦蟆兔屎等分爲末傅之良。

女人陰癢，炙猪肝納入，當有蟲出。肘後方下同。

婦人陰癢，用桃仁杵爛，絲裹塞之。

婦人陰腫作癢，羊肝納入引蟲。集簡方

婦人陰瘡，紫葳爲末，用鯉魚腦或膽調搽。摘元方下同。

婦人陰癢，牆頭爛茅，荆芥牙皂等分煎水，頻熏洗之。

又方。用蛇牀子一兩，白礬二錢，煎湯頻洗。集簡方

又方。用小薊煮湯，日洗三次。廣濟方

又方。黃連六分，牛膝甘草各四分，三味細切以水四升煮取二升洗日三四度瘥。又方。以熱艾緊裹一團，然後以絹裹內陰中。

女人交接陽道違理，及他物所傷，致血流漓不止，取釜底墨斷壺盧塗藥內之。

女童交接陽道違理，血出不止，燒髮並青布末爲粉塗之。

又方。割雞冠血塗之。

又方。以赤石脂末搽之。

又方。五倍子末搽亦良。

### 鍼灸

甲乙經曰：女子禁中瘥，腹熱痛，乳餘疾。缺三字，子門不端，少腹苦寒，陰瘡及痛，經閉不通，中極主之。

女子手脚拘攣，腹滿，疝，月水不通，乳餘疾，絕子，陰瘡，陰交主之。

腹滿疝積，乳餘疾，絕子，陰瘡，刺石門。

婦人陰中痛，少腹堅急痛，陰陵泉主之。

女子疝及少腹腫，溇泄，癢，遺溺，陰痛，面塵黑，目下眦痛，太衝主之。

婦人下赤白，沃後陰中乾痛，惡合陰陽，少腹膜堅，小便閉，曲骨主之。

女子下蒼汁，不禁赤瀝，陰中瘡痛，少腹控眇，不可俛仰，下窳主之。刺腰尻交者，兩腓上以月死生爲疢數，發鍼立已。

小腹脹滿，痛引陰中，月水至則腰脊痛，胞中瘦，子門有寒，引臏，髀水道主之。

女子絕子，陰挺出，不禁白瀝，上窳主之。

婦人陰中腫痛不可忍，艾葉五兩，防風三兩，大戟二兩，剉細，以水一斗，煮至五升，熱洗，日三次，切宜避風冷。準繩下同。

陰中腫痛，枳殼半斤，炒令熱，以故帛裹，熨冷，即換之，陰腫，鐵精粉傅上。

又方。小麥矸，硝白礬五倍子，葱白，煮水洗。

又方。陰腫，大馬鞭草，搗爛塗之。

陰腫不下，小戶嫁痛，冬青葉，小麥甘草等分，水煎洗。

婦人陰癢不可忍，杏仁燒作灰，乘熱綿裹，內陰中，日二易之。

產門蟲蛆痛癢不可忍，用杏仁去皮，燒存性，杵爛綿裹，納入陰中，取效。

又方。取鷄肝，炙熱，內陰中，如有蟲當盡下。

又方。取牛肝，截五寸，繩頭內陰中，半日，蟲入肝，出之。豬肝亦得。

陰中有蟲，癢且痛，目腫，身黃，欲得男子，漏血下白，少氣，思美食，用鯉魚長一尺，去頭肉，取骨搗末，熬黃黑，以豬脂和，以絹袋盛，如常法，內陰中，至痛處，即止，蟲當自出。

小戶嫁痛，牛膝五合，切，酒三升，煮至二升，分三服。

婦人陰痛，用青鹽炒熱，以布裹熨之。

婦人陰冷，蛇牀子一兩，吳茱萸一兩半，生搗羅爲末，煉蜜和，丸如酸棗大，以綿裹內陰中，下惡物爲度。

又方。用麝香合前二味，玉門寬冷，硫黃煎水頻洗之。心傳方。

女人陰冷，五味子四兩爲末，以口中玉泉爲丸，兔矢大，頻納陰中，取效。

婦人陰寒，十年無子者，用吳茱萸、川椒各一升，爲末，煉蜜丸，彈子大，綿裹納陰中，日再易之。但子宮煖，即有子也。經

心錄。

婦人陰冷，母丁香末，紗囊盛，如指大，納入陰中，病即已。本草衍義。

散日三服發散客熱。每塗藥一時久即乾，又再塗新濕藥，如此二日減三分之一，五日減二，自此二十日愈。既愈，乃問曰：「此病何緣至此？」曰：「中下焦畜風熱毒熱氣，若不出，當作腸癰內痔，仍須禁酒及發風物。」後不能禁酒，果患內痔。

醫學準繩六要曰：一婦陰中挺出一條五寸許，悶痛重墜，水出淋漓，小便澇滯，夕與龍膽瀉肝湯，分利濕熱，朝與補中益氣湯，升補脾氣，諸證漸愈。再與歸脾加山梔茯苓川芎黃蘗，間服調理而愈。有蟲亦用此法。有膿水腫痛，用補中益氣，倍升柴加茯苓炒梔子自效。

薛己醫按曰：一婦人陰中突出如菌，四圍腫痛，小便頻數，內熱晡熱，似癢似痛，小腹重墜，此肝脾鬱結之證。蓋肝家濕熱，作腫作痛，脾虛下陷則重墜，先以補中益氣湯，加山梔茯苓川芎調理，外以生豬脂和黎蘆末塗之，遂收。

一婦人陰中挺出五寸許，悶痛重墜，水出淋漓，小便澇滯，夕與龍膽瀉肝湯，分利濕熱，朝與補中益氣湯，升補脾氣，諸證漸愈。再與歸脾湯加山梔茯苓川芎黃蘗，間服調理而愈。後因勞役或怒氣，下部濕癢，小水不利，仍用前藥即愈。

一婦人陰中腐潰，膿水淋漓，腫痛寒熱，小便赤澇，內熱作渴，肢體倦怠，胷脅不利，飲食少思，余以爲肝脾虧損，用補中益氣湯，內柴胡升麻各用一錢，加茯苓一錢，山梔二錢，數劑少愈。又與歸脾湯，加山梔川芎茯苓三十餘劑，諸證悉退。惟內熱尚在，再與逍遙散，倍用山梔而愈。

一婦人素性急，陰內痛，小便赤澇，怒而益甚，或發熱，或寒熱，此肝經濕熱所致，用芎歸炒梔柴胡荊芥丹皮澤瀉炒芍車前炒連生甘草，數劑漸愈。乃去黃連澤瀉，又數劑全愈。

一婦人陰內膿水淋漓，或癢或痛，狀似蟲行，診之少陰脈滑數，此陰中有瘡也，名曰蠶，由心神煩鬱，胃氣虛弱，氣血凝滯所致。與升麻白芷黃連木迪當歸川芎白朮茯苓柴胡煎服，用搗腫湯熏洗，史搽蒲黃水銀兩月餘而愈。或有



婦人陰挺出，四肢淫灑，身悶，照海主之。

女子月水不利，或暴閉塞，腹脹滿癰，淫灑身熱，腹中絞痛，癩疝陰腫，氣衝，鍼上入三寸，氣至瀉之。

女子不字，陰暴出，經水漏然，谷主之。

女子疝瘕，按之如以湯沃兩股中，少腹腫，陰挺出痛，經水來下，陰中腫或癢，漉青汁若葵羹，血閉無子，不嗜食，曲泉主之。

女子陰中寒，歸來主之。

月事不利，見血而身反敗，行間主之。

千金方曰：月事不利，見赤白而有身反敗，陰寒，刺行間入六分，灸三壯，穴在足大趾間動應手。

水原穴照海穴，主不字，陰暴出，淋漏，月水不來而多，悶，心下痛。

照海主陰挺，下血，陰中腫，或癢，漉清汁若葵汁。

女子不字，陰暴出，經漏，刺然谷入三分，灸三壯，穴在足內踝前起大骨下陷中。

赤白沃陰中，乾痛，惡合陰陽，小腹臙堅，小便閉，刺屈骨入一寸半，灸三壯，穴在中極下一寸。

醫學綱目曰：女子陰中痛，取大敦。

### 醫案

瑯嬛記曰：一婦人病陰中癢，不敢告人，苦甚，平日奉觀世音像甚謹，正病時，見一尼持藥一函至，曰：「煎此洗之，即愈矣。」尼忽不見，啓視之，乃蛇牀子、吳茱萸、苦參也。

醫學綱目曰：一婦人患臍下腹上連二陰，遍滿生濕瘡，狀如馬刀，他虛並無，熱癢而痛，大小便澀，出黃汁，食亦減，身面浮腫，醫作惡瘡，用鱧鯊魚松脂黃丹之類塗膏上，愈熱痛甚，治不對證故也。細問之，此人嗜酒貪啗，喜魚蟹發。

而藥復傷脾所致也。先用六君加山梔柴胡，脾胃健而諸證愈。又用加味逍遙散而形氣復。

一婦人陰腫下墜，悶痛出水，胃腹不利，小便頻數，內熱晡熱，口苦耳鳴，此肝脾火證，用小柴胡加車前膽草芥朮升麻二劑而小愈。又用加味逍遙，加升麻數劑漸愈。乃以加味歸脾，加升麻柴胡，并補中益氣，加山梔數劑頓愈。仍用加味逍遙，加味歸脾二藥調理，全愈。

一婦人患前證熱痛，或用寒涼敗毒藥，飲食不入，時欲作嘔，小腹重墜，余謂此脾胃復損，元氣下陷，先用補中益氣，加炮薑二劑，重墜頓愈。又加茯苓半夏二十餘劑而愈。乃以歸脾湯少加柴胡升麻，并六味地黃丸而安。

一婦人每交接出血作痛，此肝火動脾而不能攝血，用補中益氣濟生，歸脾二湯而愈。若出血過多，但用前藥調補肝脾。

外科正宗曰：一婦人肝經風濕，下流陰器，浮腫癢甚，致抓出血，不痛以消風散加苦參膽草澤瀉木通山梔，外以蛇牀子湯熏洗，搽擦銀杏散，十餘日癢止腫消而愈。

一婦人孀居十餘載，陰器作癢生蟲，含忍不說，後陰器蝕爛，已蝕內臟，人形消瘦，發熱作渴，脈浮洪數，方請醫治。詢問陰癢痛日久，陰器黑腐，小水不禁，內臟已壞，不可用藥，彼苦求治。予曰：「癢者蟲也，痛者損也。」先用鯽魚數枚，以香料摻炙，魚熟以絲綿包裹，納入陰中，夾之良久，取出紅蟲長者一寸，短者五六分，細如絲綿，約有二十餘條，置溫水中，搖擺片時方死。彼家懼悅，以為可治。予曰：「非也。再取再有，生化無窮。」強投養血清肝藥，終至不痊而死。一婦人無辜發熱月餘，忽陰中突出一物如雞冠一片，此肝鬱脾虛所致，以補中益氣湯加青皮山梔柴胡黃芩，外以甘草白芷蒼朮紫蘇煎湯，每日熏洗十餘日，其患漸消，仍用煎湯，倍參朮，服月餘而安。一婦人陰中作癢，遇痛則心煩躁，作渴不睡，此思慮太過，致心腎不交，以四物湯加龍膽草山梔黃連知母，外以銀杏散納入陰中，二日，其癢漸止。又朝以八味丸，午用歸脾湯，加柴胡茵陳，月餘而愈。

胞絡虛，風邪乘陰，血氣相搏，令氣否澀，致陰腫痛，當以菖蒲散治之，更以枳實炒熱帛裹熨之，冷則再炒。或有子虛，冷氣下衝，致陰脫出，謂之下脫，或因產努力而脫者，以當歸散治之，久不愈者，以補中益氣湯，倍加升麻柴胡升舉之。

一婦人胃膈不利，內熱作渴，飲食不甘，肢體倦怠，陰中悶癢，小便赤澀，此鬱怒傷肝脾所致，用歸脾湯加山梔而愈。復因怒患處，并小腹脹痛，用小柴胡加山梔芍歸芍藥。痛止用逍遙散，加山梔而愈。又因勞役患處腫脹，小便仍澀，用補中益氣加山梔茯苓丹皮而痊。

一婦人陰內痛癢，不時出水，食少體倦，此肝脾氣虛，濕熱下注，用歸脾湯加丹皮山梔芍藥柴胡甘草主之而安。一婦人陰內癢痛內熱倦怠，飲食少思，此肝脾鬱怒，元氣虧損濕熱所致，用參芪歸朮陳皮柴胡炒梔車前升麻芍藥丹皮茯苓而痊。若陰中有蟲癢痛，亦屬肝木，以桃仁雄黃研納陰中以殺之，仍用清肝解鬱之藥，有以雞肝納之者，乃取蟲之法也。

一婦人陰中腫悶，小便澀滯，兩脅作腫，內熱晡熱，月經不調，時或寒熱，此因肝脾鬱怒，元氣下陷，濕熱壅滯，朝用歸脾湯，加柴胡升麻解鬱結，補脾氣，升元氣，夕用加味逍遙散，清肝火，生肝血，除濕熱，各數劑，諸證悉愈。又用四君芍歸丹皮，調補肝脾，而經水如期。

一婦人陰中寒冷，小便黃澀，內熱寒熱，口苦脅脹，此因肝經濕熱，用龍膽湯祛利濕熱，用加味逍遙散調補血氣而安。

一婦人所患同前，更寒熱嘔吐，兩股腫痛，先用小柴胡加山梔一劑，寒熱嘔吐頓止，次用龍膽瀉肝湯一劑，腫痛頓消。

一婦人陰中寒冷，小便澄清，腹中亦冷，飲食少思，大便不實，下元虛寒，治以八味丸九劑，飲食漸加，大便漸實，又月

餘諸證悉退。

或時獨笑，或時悲泣，者是也。其脈伏遲，或爲鳥啄，皆鬼邪爲病也。又脈來綿綿，不知度數者，顏色不變，亦此候也。昔戴人治效，已載於書，信不誣矣。且寡婦尼僧，夜夢交通，邪氣交感，久作癥瘕，或成鬼胎，以茯神散桃仁丸治之。

## 景岳全書

臣張介賓著

### 論證治

人稟五行正氣以生，氣正則正，氣邪則邪，氣強則神旺，氣衰則鬼生。如刺法論曰：「神失守位，則邪鬼外干。」卽此類也。然婦人之夢與邪交，其證有二：一則由慾念邪思，牽擾意志而爲夢者，此鬼生於心而無外干也；一則由稟賦非純，邪得以入，故妖魅敢於相犯，此邪之自外至者，亦有之矣。病因有內外，則證亦有不同。病由內生者，外無形迹，不過於夢寐間常有所遇，以致遺失及爲恍惚帶濁等證，亦如男子之夢遺，其機一也。但在女子多不肯言耳。至若外有邪犯者，其證則異，或言笑不常，如有對晤，或喜幽寂不欲見人，或無故悲泣而面色不變，或面帶桃花，其脈息則乍疎乍數，三五不調，或伏沉，或促結，或絃細，或代易不常，是皆妖邪之候。凡此二者，若失於調理，久之不愈，則精血日敗，真陰日損，乃致潮熱發熱，神疲體倦，飲食日減，經水日枯，肌肉消削，漸成勞損，脈見緊數，多致不救矣。凡治此者，所因雖有不同，而傷精敗血，其病則一。故凡病生於心者，當先以靜心爲主，然後因其病而藥之。神動者安其神，定其志，精滑者固其精，養其陰，尤當以培補脾腎，要約門戶，以助生氣爲主。若爲妖魅所侵，則內當調補正氣，如歸神湯之類，外宜速灸鬼哭穴，以驅邪氣，則自當漸愈。

## 方

○茯神散 大全下同

治婦人風虛與鬼交通，妄有所見，語言雜亂。

一婦人陰器半邊腫痛，身發寒熱，口乾便秘，脈實有力，以內疎黃連湯一劑，大便通利，口乾乃止，惟腫痛尤甚。此濕毒結聚欲爲膿也。以四物湯加角針澤瀉二劑，膿熟脹痛，又以透膿散一服，出臭膿鍾許，疼痛頓止。以八珍湯加丹皮澤瀉十餘劑而安。

一婦人陰器腫痛，小水澀滯，遇晚寒熱交作，此肝經濕熱爲患，以龍膽瀉肝湯二服，小水通利，又以四物湯兼小柴胡加天花粉木通炒山梔服之而愈。

## 婦人夢與鬼交門

宋陳自明婦人良方

### ○論證脈

人稟五行秀氣而生，承五臟神氣而養，若調理失節，血氣虛衰，則鬼邪干其正，隱避而不欲見人，時獨言笑，或時悲泣，是其候也。脈息遲伏，或如鳥啄，或綿綿而來，不知度數，面顏不變，亦其候也。

註前證多由七情虧損心血，神無所護而然也。宜用安神定志等藥，則正氣復而神自安。若脈乍大乍小，乍短乍長，亦爲鬼祟也，宜灸鬼哭穴。

按大全陰陽調和，臟腑強盛，邪鬼安得而干之？

## 明方賢奇效良方

### ○總論證治

人有五臟，中有七神，稟五行秀氣而生，皆承神氣，所以保養，若陰陽調和，則臟腑強盛，鬼魅不能傷之。若攝護失節，

雄黃油煎七日，雌黃，硃砂光瑩者，慈石，曾青各一兩。金牙石六錢。右各研細，將雄雌二黃硃砂，酢浸三日，曾青用好酒於銅器中浸，紙封曝百日，急用，七日亦得。如天陰用火焙乾六味同研勻，用砂盒盛令藥滿，得三分許，以此準盒子大小，先以赤石脂末固縫，外用六一泥固濟訖，須候透乾以晴明六合吉日合，別用泥作三箇柱子，高五寸，令平穩如鼎足狀，安盒子，下置炭火三升，逐旋添炭，常令及五斤，只在盒底，不得過口，煨五日爲度，放冷水中浸盒子候泥透，剝去泥，將盒輕手取開，其藥精英五色，盡在蓋上，亦有三色者，純白爲上，研細，棗肉丸如粟米大，每服一九，米飲服之，口噤牙緊，幹前兩齒灌下卽甦。

⑨六一泥法

礬石黃泥裹，火燒一伏時，研細。蚯蚓糞，鹼土，黃礬遠看如金絲色精明，其色本綠，以黃泥裹，火燒通赤如血，取出研細。鹽各一兩，黃泥一斤。同爲末，以紙一處搗和成泥。

⑩蘇合香丸 治證同上。

白朮，青木香，烏犀角屑，香附子炒去毛，硃砂研水飛，訶梨勒煨取皮，白檀香，丁香，安息香另末，無灰酒一升熬膏，沉香，麝香研，萹荑各二兩，龍腦研，蘇合香油入安息膏內，薰陸香別研各一兩。右爲細末，入研藥勻，用安息香膏并煉白蜜和劑，每服旋丸如桐子大，早朝取井華水溫冷，任意化服四九，老人小兒化服一九，溫酒化服亦得，並空心服之，用蠟紙裹一九如彈子大，緋絹袋當心帶之一切邪神不敢近。

⑪妙香散 治女人心氣不足，精神恍惚，夜夢顛倒，與鬼交通，言語錯亂，宜先服補氣養血，鎮心安神，然後以上數方，隨宜用之。

木香煨二錢半，山藥薑汁炙，茯苓，茯神，遠志炒，黃芪各一兩。辰砂三錢另研，人參，桔梗，甘草炙，各半兩。麝香一錢另研。右爲細末，每服二錢，不拘時，溫酒調下。

茯神一兩半，人參，菖蒲各一兩。赤小豆半兩。右咬咀，每服三大錢，水一錢，煎六分，去滓，食前溫服。一方加

茯苓一兩。

①桃仁丸 治婦人與鬼魅交通。

辰砂，檳榔，當歸，桃仁各七錢半。麝香，阿魏麪裹煨，沉香各半兩。水銀二錢半，棗肉研令星盡。右為細末，煉蜜丸如梧桐子大，空心桃仁湯吞下十九。

②辟瘟丹 準繩下同 治證同前。

虎頭骨半兩，硃砂，雄黃，雌黃，鬼臼，皂莢，蕪荑仁，鬼箭，藜蘆各一兩。右件生為末，煉蜜丸如彈子大，囊盛一丸，繫女人右臂上，及用一丸當病人戶前燒之一切邪鬼不敢近。

③殺鬼雄黃散 治婦人與鬼交通。

雄黃，丹砂，雌黃各一兩，俱細研。羚羊角屑，蕪荑，虎頭骨，石菖蒲，鬼臼，鬼箭，蒼朮，白頭翁，石長生，馬懸蹄，猪糞各半兩。右為細末，以羊脂蜜蠟和搗為丸，如彈子大，每用一丸當患人前燒之。

④別離散 治婦人風虛與鬼交通，悲思喜怒，心神不定。

楊柳樹上寄生，白朮各一兩。桂心，茵芋，天雄炮去皮臍，薊根，菖蒲九節者，細辛，附子炮去皮臍，乾薑炮各半兩。右為細末，每服一錢，食前溫酒調下。

⑤朱砂散 治婦人風虛與鬼交通，悲笑無恆，言語錯亂，心神恍惚，睡臥不甯。

朱砂細研水飛過，鐵粉研各一兩。雄黃研，龍骨各半兩。蛇蛻一尺燒，虎睛一對炙，牛黃，麝香各二錢半。右同研極細，每服一錢，以桃符湯調下，不計時候。

⑥又方 治婦人與鬼交通。

雄黃，人參，防風各一兩。五味子一合。右搗篩，清且以井華水服方寸匕，三服瘥。

# 明樓英醫學綱目

## ○交腸論證治

婦人小便中出大糞名交腸服五苓散效。如未盡愈，可用舊幘頭燒灰酒調服之。

## 方

○五苓散 治女人交腸。

澤瀉二錢半，赤茯苓，白朮，豬苓各一錢半。肉桂五分。右爲末，每二錢白湯調下。或剉作一貼，水煎服。

○補中益氣湯 治女人交腸兼用此湯。

陳皮五分，黃芪炒，人參，白朮炒，甘草炙，當歸各一錢。柴胡，升麻各三錢。右薑棗水煎，空心午前服。

服。

○四物湯 治女人尿出後竅，六脈沉澀，用此加減。

熟地黃三錢，芍藥，當歸，川芎各一錢。右水煎服。

## 醫案

朱震亨心法曰：一婦人性嗜酒，常痛飲不醉，忽糟粕出前竅，溲尿出後竅，六脈皆沉澀，與四物湯加海金沙木香檳榔木通桃仁服之而愈。此人酒多氣升不降，陽極虛，又酒濕積久生熱煎熬其血陰亦大虛，陰陽俱盡而暫時活者。



### 單方

女人與邪物交通，獨言笑，悲思恍惚，用雄黃末一兩，以松脂二兩鎔和，虎爪攪令如彈丸，夜內火籠中燒之，令女人踞坐其上，以被自蒙，唯出頭目未瘥再作，不過三劑自斷也。準繩下同。

又方。以安息香和臭黃合爲丸，燒熏丹田穴，永斷。

婦人夢與鬼交，鹿角爲末，三指撮和，清酒服，卽出鬼精。兼治漏下不斷。

婦人爲妖所魅，迷惑不肯言狀，以水服鹿角屑方寸匕，卽言實也。


### 鍼灸

證治準繩曰：婦人夢與鬼交，脈來乍大乍小，乍短乍長，宜灸鬼哭穴，以患人兩手大拇指相並，用線緊繫，當合縫處，半肉半甲間，灼灸七壯。若果是邪祟病者，卽乞求免灸云：『我自去矣。』

景岳全書曰：女人夢與鬼交，灸鬼哭穴，其穴以兩手大指相並縛定，用艾炷於爪甲角騎縫灸之，務令兩甲連肉四處著火方效。或七壯，或二七壯，兩足大指，亦名足鬼眼。

### 醫案

儒門事親曰：一婦年三十四歲，夜夢與鬼神交，驚怕異常，及見神堂鬼府，舟楫橋梁，如此一十五年，竟不娠孕，巫祈覲禱，無所不至，鑽肌灸肉，孔穴萬千，黃瘦發熱，引飲中滿，脚腫，診其兩手寸脈皆沉而伏，知胃中有痰實也，此其陽火盛於上，陰水盛於下，鬼神者陰之靈，神堂者陰之所，舟楫橋梁水之用，兩手寸脈皆沉而伏，知胃中有痰實也。凡三涌三泄三汗，不旬日而無夢，一月而有孕。



以其形實，酒中穀氣尚存故也。三月後必死。果然。

薛己醫按曰：一婦人病愈後，小便出尿，此陰陽失於傳送，名大小腸交也。先用五苓散二劑而愈，又用補中益氣而安。

寓意草曰：姜宜人得奇證，簡本草經疏治交腸用五苓之說以爲神祕。余見辨之曰：「交腸一證，大小二便易位而出，若交易然，古用五苓散治之，專爲通前陰而設也。若此證閉在後陰，二便俱從前陰而出，擬之交腸，誠有似是實非者。况交腸乃暴病驟然而氣亂於中，此證乃久病以漸而血枯於內，有毫釐千里之不同，安得擬之原夫疾之所始，始於憂思結而傷脾，脾統血者也，脾傷則不能統攝而錯出下行，有若崩漏，實名脫營，脫營病宜大補急，固迺誤認爲崩漏，以涼血清火爲治，則脫出轉多，不思天癸已盡，潮汛已絕，萬無是病。其年高氣弱，無血以實漏卮者，毫不念也。於是胞門子戶之血日漸消亡，勢不得不借資不仰給矣。借資於大腸，轉將大腸之血運輸而滲入胞囊，久之大腸之血亦盡，而大腸之氣附血而行者，孤而無主，爲拳爲塊，奔騰渙散，與林木池魚之殃禍同矣。又如救荒者，剝鄰國爲立盡之墟，所不顧矣。猶未也，仰給於胃脘，轉將胃脘之血吸引而滲入胞囊，久之胃脘之血亦盡，下脫之血始無源自止。夫胃脘之血所以榮週身而灌百脈者，今迺暗歸烏有，則苞稂失潤而黍離足憂，血盡而止，較之血存而脫又倍遠矣。故血盡然後氣亂，氣亂然後水穀舍故趨新舍寬趨隘，江漢兩渠併歸一路，身中爲之大亂，勢必大腸之故道復通，迺可撥亂返治，與五苓一方全無干涉。又况水穀由胃入腸，另有幽門沁別清濁，今以滲血之故，釀爲穀道，是幽門闢爲坦徑矣，尚可用五苓再闢之乎？又况五苓之劫陰爲亡血家所深戒乎？今之見一病，輒有一藥橫於胷中，與夫執成方奉爲靈祕者，大率皆誤人者也。若宜人病之病余三指纔下，便問曰：「病中多哭泣，否？」婢媼曰：「一時時泣下。」乃知臟燥者多泣，大腸方廢而不用也。交腸云乎哉！今大腸之脈，纍纍而現於指，可虞之時，其來春棗葉生乎？一棗葉生而言果驗。

